

વર્તુળ

વિભાગ 1 : અગત્યના મુદ્દાઓ

- વર્તુળ : સમતલમાં નિશ્ચિત બિંદુથી અચળ અંતરે આવેલાં તમામ બિંદુઓના ગણને વર્તુળ કહે છે. નિશ્ચિત બિંદુને વર્તુળનું કેન્દ્ર અને અચળ અંતરને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહે છે.

વર્તુળનું કાર્તેઝિય સમીકરણ : (h, k) કેન્દ્ર અને r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

- વર્તુળનું પ્રમાણિત સમીકરણ : ઊગમબિંદુ કેન્દ્ર અને r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = r^2$ છે. તેને વર્તુળનું પ્રમાણિત સમીકરણ કહે છે.
- એકમ વર્તુળનું સમીકરણ : ઊગમબિંદુ કેન્દ્ર અને 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળને એકમ વર્તુળ કહે છે. તેનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = 1$ છે.

- R^2 માં દ્વિઘાત સમીકરણ વર્તુળ દર્શાવે તે માટેની શરતો : વર્તુળનું સમીકરણ $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ દ્વિઘાત સમીકરણ છે.

સમીકરણમાં x^2 અને y^2 ના સહગુણકો સમાન અને શૂન્યેતર છે. સમીકરણમાં xy નો સહગુણક શૂન્ય છે તથા $g^2 + f^2 - ac > 0$.

- વર્તુળનું વ્યાપક સમીકરણ અને શરત : જો $g^2 + f^2 - c > 0$ હોય, તો $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ વર્તુળ દર્શાવે છે. તેને વર્તુળનું વ્યાપક સમીકરણ કહે છે. તેનું કેન્દ્ર $(-g, -f)$ તથા ત્રિજ્યા $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$.

- વર્તુળ X -અક્ષને સ્પર્શ ત્યારે :

$$\text{ત્રિજ્યા} = |\text{કેન્દ્રનો } y\text{-યામ}| = |k|$$

$$\therefore r = |k| \quad \text{આથી, } k = \pm r$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = (h, \pm r)$$

$$\therefore X\text{-અક્ષને સ્પર્શતા વર્તુળનું સમીકરણ}$$

$$(x - h)^2 + (y \pm r)^2 = r^2$$

- વર્તુળ Y -અક્ષને સ્પર્શ તો :

$$\text{ત્રિજ્યા} = |\text{કેન્દ્રનો } x\text{-યામ}| = |h|$$


$$\therefore r = |h| \quad \text{આથી, } h = \pm r$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = (\pm r, k)$$


$$\therefore Y\text{-અક્ષને સ્પર્શતા વર્તુળનું સમીકરણ}$$

$$(x \pm r)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

- વર્તુળ બંને અક્ષોને સ્પર્શે તો :



આકૃતિ 9.1



આકૃતિ 9.2

$$\text{ત્રિજ્યા} = |\text{કેન્દ્રનો } x\text{-યામ}| = |\text{કેન્દ્રનો } y\text{-યામ}|$$

$$\therefore r = |h| = |k|$$


$$\therefore h = \pm r, k = \pm r$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = (r, \pm r) \text{ } (-r, \pm r)$$

$$\text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = r$$

$\therefore$ બંને અક્ષોને સ્પર્શતા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(x+r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2 \quad \text{અથવા} \quad (x-r)^2 + (y \pm r)^2 = r^2$$



આકૃતિ 9.3

(i) વર્તુળ X-અક્ષને ઊગમબિંદુએ સ્પર્શે, તો કેન્દ્ર = $(0, \pm r)$

(ii) વર્તુળ Y-અક્ષને ઊગમબિંદુએ સ્પર્શે, તો કેન્દ્ર = $(\pm r, 0)$

- વ્યાસાંત બિંદુવાળા વર્તુળનું સમીકરણ : $A(x_1, y_1)$ અને $B(x_2, y_2)$ વ્યાસાંત બિંદુવાળા વર્તુળનું સમીકરણ $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ છે.

વર્તુળનાં પ્રચલ સમીકરણો : (h, k) કેન્દ્ર અને r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનાં પ્રચલ સમીકરણો $x = h + r \cos \theta$ અને $y = k + r \sin \theta$ છે કે જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi]$ છે.

એકમ વર્તુળનાં પ્રચલ સમીકરણો $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi]$

એકમ વર્તુળનાં પ્રચલ સમીકરણો $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ છે, જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi]$

જીવાની લંબાઈ : વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ની X-અક્ષ પર કપાતી જીવાની લંબાઈ $= 2\sqrt{g^2 - c}$ ($g^2 > c$)

વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ની Y-અક્ષ પર કપાતી જીવાની લંબાઈ $= 2\sqrt{f^2 - c}$ ($f^2 > c$)

સ્પર્શકની લંબાઈ : વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ ની બહારના બિંદુ $P(x_1, y_1)$ માંથી વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ ને દોરેલા

$$\text{સ્પર્શકની લંબાઈ} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - r^2}$$

વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ની બહારના બિંદુ $P(x_1, y_1)$ માંથી વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ

$$= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

- વર્તુળનાં સ્પર્શકનાં સમીકરણો : વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ પરના બિંદુ $P(x_1, y_1)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $xx_1 + yy_1 = r^2$ છે.

વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ પરના $P(x_1, y_1)$ આગળ દોરેલા સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0 \text{ છે.}$$

બિંદુનું વર્તુળને સાપેક્ષ સ્થાન : બિંદુ $P(x_1, y_1)$ ના વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ ના સાપેક્ષ સ્થાન માટે,

$$x_1^2 + y_1^2 - r^2 = 0 \Leftrightarrow \text{બિંદુ } P \text{ વર્તુળનું બિંદુ છે.}$$

$$x_1^2 + y_1^2 - r^2 > 0 \Leftrightarrow \text{બિંદુ } P \text{ વર્તુળની બહારનું બિંદુ છે.}$$

$$x_1^2 + y_1^2 - r^2 < 0 \Leftrightarrow \text{બિંદુ } P \text{ વર્તુળની અંદરનું બિંદુ છે.}$$

બિંદુ $P(x_1, y_1)$ ની વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ને સાપેક્ષ સ્થાન માટે,

$$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0 \Leftrightarrow P \text{ વર્તુળ પરનું બિંદુ છે.}$$

$$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0 \Leftrightarrow P \text{ વર્તુળની બહારનું બિંદુ છે.}$$

$$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0 \Leftrightarrow P \text{ વર્તુળની અંદરનું બિંદુ છે.}$$

● સામાન્ય જીવાનું સમીકરણ :

$$\text{વર્તુળો } S_1 : x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0 \text{ અને}$$

$$S_2 : x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0 \text{ ની સામાન્ય જીવાને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ } S_1 - S_2 = 0$$

અર્થાત્,

$$S_1 - S_2 = 2x(g_1 - g_2) + 2y(f_1 - f_2) + c_1 - c_2 = 0$$

$$\text{વર્તુળ } x^2 + y^2 = r^2 \text{ ની કોઈ જીવાનું મધ્યબિંદુ } M(x_1, y_1) \text{ હોય, તો જીવાનું સમીકરણ } xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$$

● બે વર્તુળોના સામાન્ય સ્પર્શકની સંખ્યા :

બે વર્તુળો પરસ્પર અંદરથી સ્પર્શે, તો સામાન્ય સ્પર્શક એક જ મળે.

બે વર્તુળો એકબીજાને છેદે, તો સામાન્ય સ્પર્શકની સંખ્યા બે મળે.

બે વર્તુળો બહારથી સ્પર્શે, તો સામાન્ય સ્પર્શકની સંખ્યા ત્રણ મળે.

બે વર્તુળો એકબીજાને ન છેદે, તો સામાન્ય સ્પર્શકની સંખ્યા ચાર મળે.

● રેખા અને વર્તુળનો છેદગણ : જો રેખા $ax + by + c = 0$, $a^2 + b^2 \neq 0$ અને વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ આપેલ હોય, ત્યારે જો

$$r^2 > \frac{c^2}{a^2 + b^2} \Leftrightarrow \text{રેખા વર્તુળને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે.}$$


$$r^2 < \frac{c^2}{a^2 + b^2} \Leftrightarrow \text{રેખા વર્તુળને છેદશે નહિ.}$$

$$r^2 = \frac{c^2}{a^2 + b^2} \Leftrightarrow \text{રેખા વર્તુળને સ્પર્શે છે.}$$


● સમતલમાં બે વર્તુળો વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ

$$\text{જો } AB = r_1 + r_2$$

જે બંને વર્તુળો પરસ્પર બહારથી સ્પર્શે છે.




આકૃતિ 9.4




$$\text{જો } AB = |r_1 - r_2|$$

તો બંને વર્તુળો પરસ્પર અંદરથી સ્પર્શે છે.




$$\text{જો } |r_1 - r_2| < AB < r_1 + r_2$$

તો બંને વર્તુળો બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે.



$$\text{જો } AB > r_1 + r_2$$

તો બંને વર્તુળો પરસ્પર છેદતાં કે સ્પર્શતા નથી.



$$AB < |r_1 - r_2|$$

એક વર્તુળ બીજા વર્તુળની અંદર હોય.

આકૃતિ 9.5

- રેખા $y = mx + c$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 = r^2$ ને સ્પર્શે તે માટેની શરત $c^2 = r^2(1 + m^2)$ છે અને સ્પર્શબિંદુના

$$\text{યામ } \left(\frac{-mr^2}{c}, \frac{r^2}{c} \right) \text{ છે. (જ્યાં } c \neq 0 \text{)}$$

- વર્તુળનાં કેન્દ્રો $C_1(x_1, y_1), C_2(x_2, y_2)$ તથા ત્રિજ્યાઓ r_1 અને r_2 હોય, ત્યારે જો

$$\text{બે વર્તુળો બહારથી સ્પર્શે, તો સ્પર્શબિંદુના યામ } \left(\frac{r_1 x_2 + r_2 x_1}{r_1 + r_2}, \frac{r_1 y_2 + r_2 y_1}{r_1 + r_2} \right)$$

$$\text{બે વર્તુળો અંદરથી સ્પર્શે, તો સ્પર્શબિંદુના યામ } \left(\frac{r_1 x_2 - r_2 x_1}{r_1 - r_2}, \frac{r_1 y_2 - r_2 y_1}{r_1 - r_2} \right)$$

પરવલય


- પરવલય : કોઈ નિશ્ચિત રેખા પર ન હોય તેવા નિશ્ચિત બિંદુથી અંતર અને નિશ્ચિત રેખાથી લંબઅંતર સમાન હોય તેવા સમતલનાં તમામ બિંદુઓના ગણને પરવલય કહે છે.

- પરવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ : X-અક્ષ મુખ્ય અક્ષ હોય તેવા પરવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ $y^2 = 4ax, a > 0$.

$$\text{મુખ્ય અક્ષ Y-અક્ષ તેવા પરવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ } x^2 = 4by, b > 0.$$

- પરવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $e = 1$ છે.
- પરવલયની નાભિમાંથી પસાર થતી અને નિયામિકાને લંબ હોય તે રેખાને પરવલયનો અક્ષ કહે છે.
- પરવલય અને તેના અક્ષનું છેદબિંદુ પરવલયનું શિરોબિંદુ કહેવાય છે.

- પરવલયનાં કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતાં રેખાખંડને પરવલયની જીવા કહે છે.
- પરવલયની નાભિમાંથી પસાર થતી જીવાને પરવલયની નાભિજીવા કહે છે.
- પરવલયના અક્ષને લંબ હોય તેવી અને પરવલયની નાભિમાંથી પસાર થતી પરવલયની જીવાને પરવલયનો નાભિલંબ કહે છે. (પરવલયના અક્ષને લંબ હોય તેવી નાભિજીવાને પરવલયનો નાભિલંબ કહે છે.)

ક્રમ	પરવલયનું પ્રમાણિત સમીકરણ	$y^2 = 4ax$	$x^2 = 4by$
1.	અક્ષ	X-અક્ષ	Y-અક્ષ
2.	નાભિ	$S(a, 0)$	$S(0, b)$
3.	ઉત્કેન્દ્રતા	$e = 1$	$e = 1$
4.	શિરોબિંદુ	$(0, 0)$	$(0, 0)$
5.	નિયામિકા	$x = -a$	$y = -b$
6.	નાભિલંબની લંબાઈ	$4 a $	$4 b $
7.	નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ	$(a, \pm 2a)$	$(\pm 2b, b)$
8.	સંમિતતા	X-અક્ષ પ્રત્યે	Y-અક્ષ પ્રત્યે
9.	પ્રચલ સમીકરણો	$x = at^2, y = 2at, t \in R$	$x = 2bt, y = bt^2, t \in R$
10.	પ્રચલ બિંદુ (t-બિંદુ)	$(at^2, 2at), t \in R$	$(2bt, bt^2), t \in R$
11.	આકૃતિ		

12.	(x_1, y_1) બિંદુએ સ્પર્શકનું સમીકરણ	$yy_1 = 2a(x + x_1)$	$xx_1 = 2b(y + y_1)$
13.	t બિંદુ એ સ્પર્શકનું સમીકરણ	$x - ty + at^2 = 0$	$y - tx + bt^2 = 0$
14.	m ઢાળવાળા સ્પર્શકના સ્પર્શબિંદુના યામ	$\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$	$\left(\frac{2b}{m}, \frac{b}{m^2}\right)$
15.	(x_1, y_1) બિંદુએ અભિલંબનું સમીકરણ	$y - y_1 = \frac{-y_1}{2a}(x - x_1)$	$y - y_1 = \frac{-2b}{x_1}(x - x_1)$
16.	m ઢાળવાળા અભિલંબનું સમીકરણ	$y = mx - 2am - am^3$	$x = my - 2bm - bm^3$
17.	અભિલંબના લંબપાદના યામ	$(am^2, -2am)$	$(-2bm, bm^2)$
18.	t બિંદુ આગળ અભિલંબનું સમીકરણ	$y = -tx + 2at + at^3$	$x = bt^3 + 2bt - yt$

- પરવલયનો નાભિલંબ એ પરવલયની સૌથી નાનામાં નાની નાભિજવા છે.
- પરવલયની નાભિજવાનાં અંત્યબિંદુઓએ દોરેલા સ્પર્શકો નિયામિકા પર કાટખૂણે છેદે છે.
- $P(at_1^2, 2at_1)$ અને $Q(at_2^2, 2at_2)$ એ પરવલય પરનાં બે ભિન્ન બિંદુઓ હોય, તો $\overline{PQ}$ ને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ $y(t_1 + t_2) = 2(x + at_1t_2)$.
- પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિજવાનું એક અંત્યબિંદુ $P(at^2, 2at)$ હોય, તો બીજા અંત્યબિંદુ Q ના યામ $\left(\frac{a}{t^2}, \frac{-2a}{t}\right)$ થાય તથા નાભિજવાની લંબાઈ $PQ = \left|a\right|\left(t + \frac{1}{t}\right)^2$.
- પરવલય $y^2 = 4ax$ ની બહારના બિંદુ $P(x_1, y_1)$ માંથી પરવલયને દોરેલા સ્પર્શકો $\overleftrightarrow{PA}$ અને $\overleftrightarrow{PB}$ હોય તથા જવા $\overline{AB}$ સાથે ΔPAB બને, તો

$$\Delta PAB \text{ નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{\sqrt{(y_1^2 - 4ax_1)^3}}{2a}. \text{ જવા } \overline{AB} \text{ ની લંબાઈ} = \frac{\sqrt{(y_1^2 - 4ax_1)(y_1^2 + 4a^2)}}{a}$$
- રેખા $px + qy + r = 0$ એ પરવલય $y^2 = 4ax$ નો અભિલંબ બને તેની શરત $ap(p^2 + 2q^2) = q$
- પરવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓએ દોરેલા અભિલંબો પરવલયના અક્ષ પર કાટખૂણે છેદે છે.
- પરવલયના અર્ધનાભિલંબની લંબાઈ એ પરવલયની નાભિજવાના નાભિથી બનતા રેખાખંડોની લંબાઈઓનો સ્વરિત મધ્યક છે.

પરવલયના ગુણધર્મો


- $P(t_1)$ અને $Q(t_2)$ પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનાં બિંદુઓ છે. જો $\overline{PQ}$ નાભિજવા હોય, તો $t_1t_2 = -1$
- જો પરવલય $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) ની નાભિ S હોય અને $\overline{PQ}$ નાભિજવા હોય, તો $\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$.
- પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિ S છે અને P પરવલય પરનું કોઈ પણ બિંદુ છે. ધારો કે $\overrightarrow{PQ}$ પરવલયના અક્ષને સમાંતર છે. $\angle SPQ$ નો દ્વિભાજક પરવલયના અક્ષને બિંદુ G માં છેદે, તો $\overline{SP} \cong \overline{SG}$.
- રેખા $y = mx + c$ એ પરવલય $y^2 = 4ax$ નો સ્પર્શક બને તે માટેની શરત $c = \frac{a}{m}$ છે. સ્પર્શબિંદુના યામ $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ છે.
- $y^2 = 4ax$ તથા $x^2 = 4by$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $\frac{1}{a^3}x + b^3y + (ab)^{\frac{2}{3}} = 0$

ઉપવલય


- ઉપવલય : સમતલમાં નિશ્ચિત બિંદુ અને તે સમતલની તે બિંદુમાંથી પસાર ન થતી હોય, તેવી નિશ્ચિત રેખાથી જે બિંદુઓના લંબઅંતરનો ગુણોત્તર e અચળ હોય અને આ ગુણોત્તર 1 કરતા નાનો હોય, તેવાં બિંદુઓના

ગણને ઉપવલય કહે છે. આ ગુણોત્તર e ને ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા કહે છે.

અહીં, નિશ્ચિત બિંદુને ઉપવલયની નાભિ અને નિશ્ચિત રેખાને ઉપવલયની નિયામિકા કહે છે.



- જો નિશ્ચિત બિંદુ S અને નિશ્ચિત રેખા Lની મદદથી ઉપવલયની રચના થાય, તો સમતલમાં નિશ્ચિત બિંદુ S' અને નિશ્ચિત રેખા L' મળે જ કે જેથી, S' અને L' પણ તે જ ઉપવલયની રચના કરે. આમ, ઉપવલયને બે નાભિ અને બે નિયામિકા હોય છે.



- ઉપવલયના કોઈ પણ બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડને ઉપવલયની જવા કહે છે.
- નાભિમાંથી પસાર થતી ઉપવલયની જવાને ઉપવલયની નાભિજવા કહે છે.
- નાભિમાંથી પસાર થતી અને નિયામિકાને લંબ હોય તેવી રેખાને ઉપવલયનો અક્ષ (પ્રધાન અક્ષ) કહે છે.
- પ્રધાન અક્ષના ઉપવલય સાથેનાં છેદબિંદુઓ અંત્યબિંદુ હોય, તે રેખાખંડની લંબદ્વિભાજક રેખાને ઉપવલયનો ગૌણ અક્ષ કહે છે.
- ઉપવલયના પ્રધાન અક્ષને લંબ નાભિજવાને ઉપવલયનો નાભિલંબ કહે છે.
- ઉપવલયના બંને અક્ષોના છેદબિંદુને ઉપવલયનું કેન્દ્ર કહે છે.
- ઉપવલયના અક્ષો સાથેનાં છેદબિંદુઓને ઉપવલયનાં શિરોબિંદુઓ કહે છે.
- પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ હોય અને કેન્દ્ર (0,0) તથા પ્રધાન અક્ષ પરના ઉપવલયનાં શિરોબિંદુઓ A(a, 0) અને

A'(-a, 0) હોય, તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1-e^2)} = 1$ છે. ($e < 1$)


$\therefore a^2(1-e^2)=b^2$ લેતાં $a > b$ થાય અને ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ થાય.

- પ્રધાન અક્ષ Y-અક્ષ હોય અને કેન્દ્ર $(0,0)$ તથા પ્રધાન અક્ષ પરના ઉપવલયનાં શિરોબિંદુઓ $B(0,b)$ અને

$B'(0, -b)$ હોય તેવા ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{b^2(1-e^2)} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે. (જ્યાં $(e < 1)$)

$\therefore b^2(1-e^2)=a^2$ લેતાં $a < b$ થાય અને ઉપવલયનું સમીકરણ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ થાય.

- ઉપવલય : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ જ્યાં $a > b$ માટે :



આકૃતિ 9.8

- (1) $b^2 = a^2(1-e^2)$
- (2) ઉપવલયનું કેન્દ્ર $(0,0)$ છે.
- (3) ઉપવલયની નાભિઓ $S(ae, 0)$ અને $S'(-ae, 0)$ છે.
- (4) ઉપવલયની નાભિઓ $S(ae, 0)$ અને $S'(-ae, 0)$ વચ્ચેનું અંતર $SS' = 2ae$ છે.
- (5) ઉપવલયની નિયામિકાનાં સમીકરણ $x = \frac{a}{e}$ અને $x = -\frac{a}{e}$ છે.
- (6) ઉપવલયની નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર $\frac{2a}{e}$ છે.
- (7) ઉપવલયનાં શિરોબિંદુઓ $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$, $B(0, b)$ અને $B'(0, -b)$ છે.
- (8) ઉપવલયનો પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ છે અને પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ $2a$ છે.
- (9) ઉપવલયનો ગૌણ અક્ષ Y-અક્ષ છે અને ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $2b$ છે.
- (10) અર્ધ પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ a અને અર્ધ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ b છે.
- (11) ઉપવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $\frac{2b^2}{a}$ છે.

(12) ઉપવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ $L\left(ae, \frac{b^2}{a}\right)$, $L'\left(ae, \frac{-b^2}{a}\right)$, $M\left(-ae, \frac{b^2}{a}\right)$ અને $M'\left(-ae, \frac{-b^2}{a}\right)$ છે.

(13) ઉપવલય બંને અક્ષ પ્રત્યે સંમિત છે.

ઉપવલય કેન્દ્રિય વક્ર છે એટલે કે ઊગમબિંદુ પ્રત્યે સંમિત છે. જો (x, y) વક્રનું બિંદુ હોય, ત્યારે $(x, -y)$, $(-x, y)$, $(-x, -y)$ પણ વક્રનું બિંદુ હોય, તો વક્ર ઊગમબિંદુ પ્રત્યે સંમિત છે તેમ કહેવાય.

(14) જો P એ ઉપવલયનું બિંદુ હોય, તો $\frac{SP}{PM} = e$

જ્યાં $SP = P$ નું S થી લંબઅંતર અને $PM = P$ નું નિયામિકાથી લંબઅંતર. જ્યાં $e < 1$

(15) ઉપવલયનાં પ્રચલ સમીકરણો

$$x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, \theta \in (-\pi, \pi] \text{ છે.}$$


(16) ઉપવલયનું θ - બિંદુ, $P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ છે.

(17) જો $P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ એ ઉપવલયનું બિંદુ હોય, તો $SP = a(1 - e \cos \theta)$, $S'P = a(1 + e \cos \theta)$

જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi]$

(18) જો P એ ઉપવલય પરનું બિંદુ હોય, તો $SP + S'P = 2a$

● ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ જ્યાં $b > a$ માટે.



આકૃતિ 9.9

(1) $a^2 = b^2 (1 - e^2)$

(2) ઉપવલયનું કેન્દ્ર $(0,0)$ છે.

(3) ઉપવલયની નાભિઓ $S(0, be)$ અને $S'(0, -be)$ છે.


(4) ઉપવલયની નાભિઓ $S(0, be)$ અને $S'(0, -be)$ વચ્ચેનું અંતર $SS' = 2be$ છે.

(5) ઉપવલયની નિયામિકાનાં સમીકરણ $y = \frac{b}{e}$ અને $y = \frac{-b}{e}$ છે.

(6) ઉપવલયની નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર $\frac{2b}{e}$ છે.

- (7) ઉપવલયનાં શિરોબિંદુઓ $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$, $B(0, b)$ અને $B'(0, -b)$ છે.
- (8) ઉપવલયનો પ્રધાન અક્ષ Y-અક્ષ છે અને પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ $2b$ છે.
- (9) ઉપવલયનો ગૌણ અક્ષ X-અક્ષ છે અને ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $2a$ છે.
- (10) અર્ધ પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ b અને અર્ધ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ a છે.
- (11) ઉપવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $\frac{2a^2}{b}$ છે.
- (12) ઉપવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ $L\left(\frac{a^2}{b}, be\right)$, $L'\left(\frac{-a^2}{b}, be\right)$, $M\left(\frac{a^2}{b}, -be\right)$ અને $M'\left(\frac{-a^2}{b}, -be\right)$ છે.
- (13) ઉપવલય બંને અક્ષ પ્રત્યે સંમિત છે. ઉપવલય કેન્દ્રિય વક્ર છે એટલે કે ઊગમબિંદુ પ્રત્યે સંમિત છે.
- (14) ઉપવલયનાં પ્રયલ સમીકરણો $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, $\theta \in (-\pi, \pi]$ છે.
- (15) જો P એ ઉપવલયનું બિંદુનું હોય, તો $\frac{SP}{PM} = e$ જ્યાં $SP = P$ નું S થી અંતર અને $PM = P$ નું નિયામિકાથી લંબઅંતર.
- (16) જો ઉપવલયનું θ - બિંદુ $P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ છે.
- (17) જો $P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ એ ઉપવલયનું બિંદુ હોય, તો
 $SP = b(1 - e \cos \theta)$, $S'P = b(1 + e \cos \theta)$ જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi]$.
- (18) જો P એ ઉપવલય પરનું બિંદુ હોય, તો $SP + S'P = 2b$.

● $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$



આકૃતિ 9.10

- (1) ઉપવલયની નાભિ S અને પ્રધાન અક્ષનાં અંત્યબિંદુઓ A અને A' હોય, તો $AS \cdot A'S = b^2$.
- (2) ઉપવલયની નાભિથી તેના ગૌણ અક્ષનાં અંત્યબિંદુઓ સુધીનું અંતર તેના અર્ધ-પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ જેટલું હોય છે. ગૌણ અક્ષ પર આવેલ શિરોબિંદુ $B(0, b)$ છે. તે જ રીતે $B'(0, -b)$ આથી, $SB' = S'B = a$
- (3) નાભિ S અને S' માંથી ઉપવલય પરના બિંદુ P આગળના સ્પર્શકોને દોરેલ લંબના પાદ અનુક્રમે L અને L' હોય, તો $SL \cdot S'L' = b^2$.
- (4) ઉપવલયના કોઈ બિંદુ P આગળ સ્પર્શકને લંબરેખા એ $\angle SPS'$ નો દ્વિભાજક છે.

અતિવલય


જે બિંદુઓના એક નિશ્ચિત બિંદુથી અંતર અને તે બિંદુમાંથી પસાર ન થતી હોય તેવી રેખાની લંબઅંતરનો ગુણોત્તર અચળ હોય અને તે ગુણોત્તર 1 કરતાં મોટો હોય તેવાં બિંદુઓના ગણને અતિવલય કહે છે.

નોંધ : આ નિશ્ચિત ગુણોત્તરને e દ્વારા દર્શાવાય છે તથા e ને તેની ઉત્કેન્દ્રતા કહે છે. અતિવલય માટે $e > 1$.

- અતિવલય બંને અક્ષો પ્રત્યે તેમજ ઊગમબિંદુ પ્રત્યે સંમિત છે.
- અતિવલયનું કેન્દ્ર ઊગમબિંદુ છે.
- જેનાં અંત્યબિંદુઓ અતિવલય પર હોય તેવા રેખાખંડને અતિવલયની જીવા કહે છે.
- નાભિમાંથી પસાર થતી અતિવલયની જીવાને નાભિજીવા કહે છે.
- અતિવલયની જે નાભિજીવા તેના મુખ્ય અક્ષને લંબ હોય તેને અતિવલયનો નાભિલંબ કહે છે.
- અતિવલયના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડને અતિવલયની જીવા કહે છે.
- નાભિમાંથી પસાર થતી અને નિયામિકાને લંબરેખાને અતિવલયનો મુખ્ય અક્ષ કહે છે.
- પ્રધાન અક્ષના અતિવલય સાથેનાં છેદબિંદુઓ અંત્યબિંદુઓ હોય, તે રેખાખંડના લંબદ્વિભાજક રેખાને અતિવલયની અનુબદ્ધ અક્ષ કહે છે.
- અતિવલયના અક્ષો સાથેનાં છેદબિંદુઓને અતિવલયનાં શિરોબિંદુઓ કહે છે.


અતિવલય $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ માટે :

- (1) અતિવલયનું કેન્દ્ર $(0, 0)$.
- (2) અતિવલયની નાભિઓ $S(ae, 0), S'(-ae, 0)$ છે.
- (3) અતિવલયની નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર $SS' = 2ae$.
- (4) અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $e > 1$ અને તે માટે $b^2 = a^2(e^2 - 1)$.
- (5) અતિવલયની નિયામિકાઓનાં સમીકરણો $x = \pm \frac{a}{e}$.
- (6) અતિવલયની બે નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર $\frac{2a}{e}$.
- (7) અતિવલયનો મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે. અનુબદ્ધ અક્ષ Y-અક્ષ છે.
- (8) અતિવલયનાં મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ $2a$ અને અતિવલયના અનુબદ્ધ અક્ષની લંબાઈ $2b$ છે.
- (9) અતિવલયના અર્ધ પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ a અને અર્ધ અનુબદ્ધ અક્ષની લંબાઈ b છે.
- (10) અતિવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $\frac{2b^2}{a}$ છે.
- (11) અતિવલયના શિરોબિંદુઓ $A(a, 0), A'(-a, 0), B(0, b), B'(0, -b)$ છે.
- (12) અતિવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ $(ae, \pm \frac{b^2}{a}), (-ae, \pm \frac{b^2}{a})$ છે.
- (13) અતિવલયનાં પ્રચલ સમીકરણ $x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$ જ્યાં $\theta \in (-\pi, \pi) - \{\pm \frac{\pi}{2}\}$.



આકૃતિ 9.11

અતિવલય $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$:



આકૃતિ 9.12

- (1) અતિવલયનું કેન્દ્ર $(0, 0)$.
- (2) અતિવલયની નાભિઓ $(0, \pm be)$.
- (3) અતિવલયની નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર $= 2be$.
- (4) અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રતા $e > 1$ અને તે માટે $a^2 = b^2(e^2 - 1)$ છે.
- (5) અતિવલયની નિયામિકાઓનાં સમીકરણો $y = \pm \frac{b}{e}$.
- (6) અતિવલયની બે નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર $\frac{2b}{e}$ છે.
- (7) અતિવલયનો મુખ્ય અક્ષ Y-અક્ષ છે અને અનુબદ્ધ અક્ષ X-અક્ષ છે.
- (8) અતિવલયના મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ $2b$ અને અનુબદ્ધ અક્ષની લંબાઈ $2a$ છે.
- (9) અતિવલયના અર્ધ મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ b અને અર્ધ અનુબદ્ધ અક્ષની લંબાઈ a છે.
- (10) અતિવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $\frac{2a^2}{b}$ છે.
- (11) અતિવલયનાં શિરોબિંદુઓ $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$, $B(0, b)$, $B'(0, -b)$ છે.
- (12) અતિવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ $(\pm \frac{a^2}{b}, be)$, $(\pm \frac{a^2}{b}, -be)$ છે.

બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો


- (1) X-અક્ષને સ્પર્શતા અને વર્તુળ $x^2 + (y-1)^2 = 1$ ને બહારથી સ્પર્શતા વર્તુળનાં કેન્દ્રોના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) $\{(x, y) \mid x^2 + (y-1)^2 = 4 : y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid y < 0\}$

(B) $\{(x, y) \mid x^2 = 4y : y \geq 0\} \cup \{(0, y) \mid y < 0\}$

(C) $\{(x, y) \mid x^2 = y : y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid y < 0\}$

(D) $\{(x, y) \mid x^2 = 4y : y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid y < 0\}$



આકૃતિ 9.13

ઉકેલ : આપેલ વર્તુળ $S_1 : x^2 + (y-1)^2 = 1$ નું કેન્દ્ર $C_1(0, 1)$ અને ત્રિજ્યા $r_1 = 1$ છે.

ધારો કે આપેલ વર્તુળને બહારથી સ્પર્શતા તથા X -અક્ષને સ્પર્શતા વર્તુળનું કેન્દ્ર $C_2(h, k)$ છે.

$\therefore$ તે વર્તુળની ત્રિજ્યા = | કેન્દ્રનો y -યામ | = $|k|$

$\therefore$ અહીં S_2 એ S_1 ને બહારથી સ્પર્શે છે.

$\therefore C_1C_2 = r_1 + r_2$

$\therefore \sqrt{(h-0)^2 + (k-1)^2} = 1 + |k|$

$\therefore h^2 + k^2 - 2k + 1 = 1 + 2|k| + k^2$

$\therefore h^2 = 2k + 2|k|$

$\therefore$ વર્તુળના કેન્દ્રના બિંદુનો બિંદુપથ $x^2 = 2y + 2|y|$

જો $y \geq 0$ તો $x^2 = 4y$

જો $y < 0$ તો $x = 0$

$\therefore$ માંગેલ બિંદુપથ $\{(x, y) | x^2 = 4y, y \geq 0\} \cup \{(0, y) | y < 0\}$

જવાબ : (B)

(2) ધારો કે ABCD એક સમલંબ ચતુષ્કોણ છે, જેનું ક્ષેત્રફળ 18 એકમ છે. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ તથા $AB = 2CD$.


$\overline{AD} \perp \overline{AB}$ અને $\overline{AD} \perp \overline{CD}$ છે. ચતુષ્કોણ ABCDની અંદરની બાજુઓને સ્પર્શતા વર્તુળની ત્રિજ્યા =

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4



આકૃતિ 9.14

ઉકેલ : ધારો કે $CD = x_1$, $AB = 2CD = 2x_1$ અને $h = 2r$ તથા $A(0, 0)$, $B(2x_1, 0)$, $C(x_1, 2r)$, $D(0, 2r)$ થશે.

$\therefore \square ABCD$ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} \times$ (બે સમાંતર બાજુના માપનો સરવાળો) $\times$ (બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર)

$$= \frac{1}{2} \times (x_1 + 2x_1) \times h$$

$$= \frac{3}{2} x_1 h$$

$$18 = \frac{3}{2} x_1 2r$$

$$\therefore rx_1 = 6$$

(1)

$$\therefore \overleftrightarrow{BC} \text{ નું સમીકરણ } y - 0 = \frac{-2r}{x_1} (x - 2x_1)$$

$$\therefore y = \frac{-2r}{x_1} x + 4r$$

$$\therefore \frac{2r}{x_1} \cdot x + y - 4r = 0$$

વળી $\overleftrightarrow{BC}$ એ વર્તુળ $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ નો સ્પર્શક છે.

$\therefore$ કેન્દ્રથી સ્પર્શકનું લંબઅંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{\left| \frac{2r^2}{x_1} + r - 4r \right|}{\sqrt{\frac{4r^2}{x_1^2} + 1}} = r$$

$$\therefore \left| \frac{2r^2}{x_1} - 3r \right| = r \sqrt{\frac{4r^2}{x_1^2} + 1}$$

$$\therefore (2r - 3x_1)^2 = x_1^2 + 4r^2$$

$$\therefore r \cdot x_1 = \frac{2}{3} x_1^2. \quad \text{આથી } 3r = 2x_1 \quad (x_1 \neq 0)$$

$$(1) \text{ પરથી } x_1 = \frac{6}{r}. \quad \text{આથી } 3r = 2\left(\frac{6}{r}\right) \quad \text{આથી } r = 2$$

જવાબ : (B)

- (3) રેખા $y = kx + c$ ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતી હોય તથા વર્તુળ $x^2 + y^2 - 20x + 10y + 100 = 0$ ને છેદતી ન હોય, તો k ની કિંમતોનો ગણ

$$(A) \quad \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup \left(-\frac{4}{3}, \infty\right)$$

$$(B) \quad (-\infty, \infty)$$

$$(C) \quad \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup (0, \infty)$$

$$(D) \quad \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

ઉકેલ : અહીં રેખા $y = kx + c$ ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore c = 0$$

$\therefore$ આથી, રેખા $kx - y = 0$ થશે.

વર્તુળ $x^2 + y^2 - 20x + 10y + 100 = 0$ નું કેન્દ્ર $= (10, -5)$ અને ત્રિજ્યા $= \sqrt{100 + 25 - 100} = 5$

રેખા, વર્તુળને છેદતી નથી.

$\therefore$ કેન્દ્ર $(10, -5)$ થી રેખા $kx - y = 0$ નું લંબઅંતર $>$ ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{|k(10) + 5|}{\sqrt{k^2 + 1}} > 5$$

$$\therefore |10k + 5| > 5\sqrt{k^2 + 1}$$

$$\therefore |2k + 1| > \sqrt{k^2 + 1}$$

$$4k^2 + 4k + 1 > k^2 + 1$$

$$\therefore 3k^2 + 4k > 0$$

$$k(3k + 4) > 0$$

$$\therefore k < 0 \text{ અને } 3k + 4 < 0 \text{ અથવા } k > 0, 3k + 4 > 0$$

$$\therefore k < 0 \text{ અને } k < -\frac{4}{3} \text{ અથવા } k > 0, k > -\frac{4}{3}$$

$$\therefore k \text{ ની કિંમતોનો ગણ } \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup (0, \infty)$$

જવાબ : (C)


(4) બહારના બિંદુ Pમાંથી વર્તુળ $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9\sin^2 \alpha + 13\cos^2 \alpha = 0$ ને દોરેલા સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 2α છે, તો બિંદુ Pના બિંદુગણનું સમીકરણ

$$(A) \quad x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 + 4x + 6y + 9 = 0$$



આકૃતિ 9.15

ઉકેલ : ધારો કે, વર્તુળની બહારના બિંદુ Pમાંથી દોરેલા સ્પર્શકો $\overleftrightarrow{PA}$ અને $\overleftrightarrow{PB}$ છે તથા તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 2α છે. અહીં, વર્તુળનું કેન્દ્ર $C(-2, 3)$ તથા $P(x, y)$ છે.

હવે, ΔAPC માં $\sin\alpha = \frac{AC}{CP}$

$$= \frac{\sqrt{4+9-9\sin^2\alpha-13\cos^2\alpha}}{\sqrt{(x+2)^2+(y-3)^2}}$$

$$\therefore \sin\alpha = \frac{2\sin\alpha}{\sqrt{(x+2)^2+(y-3)^2}} \quad (\sin\alpha \neq 0)$$

$$\therefore (x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$$

જવાબ : (A)


(5) વક્ર $y = x^2$ ને $(2, 4)$ બિંદુ આગળ સ્પર્શતા અને $(0, 1)$ બિંદુમાંથી પસાર થતા વર્તુળનું સમીકરણ

(A) $5x^2 + 5y^2 + 32x - 53y + 48 = 0$

(B) $5x^2 + 5y^2 - 32x - 53y + 48 = 0$

(C) $5x^2 + 5y^2 + 32x + 53y + 48 = 0$

(D) $5x^2 + 5y^2 - 32x + 53y + 48 = 0$



આકૃતિ 9.16

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર $C(h, k)$ તથા $A(2, 4)$ અને $B(0, 1)$ છે.

$$\therefore AC^2 = BC^2$$

$$\therefore (h-2)^2 + (k-4)^2 = (0-h)^2 + (1-k)^2$$

$$\therefore h^2 - 4h + 4 + k^2 - 8k + 16 = h^2 + 1 - 2k + k^2$$

$$4h + 6k - 19 = 0$$

(1)

અહીં વક્ર $y = x^2$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 2x. \quad \text{અથવા} \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(2,4)} = 4$$

$\therefore$ વક્રના સ્પર્શકનો $(2, 4)$ આગળનો ઢાળ = 4

$$\overleftrightarrow{AC} \text{ નો ઢાળ } = \frac{4-k}{2-h}$$

∴ ($\overleftrightarrow{AC}$ નો ઢાળ) (વક્રના સ્પર્શકનો (2, 4) બિંદુ આગળનો ઢાળ) = -1

$$\therefore \left(\frac{4-k}{2-h} \right) 4 = -1$$

$$\therefore 16 - 4k = -2 + h$$

$$\therefore h + 4k - 18 = 0$$

(2)

(1) અને (2) પરથી, $h = -\frac{16}{5}$, $k = \frac{53}{10}$

$$\therefore \text{વર્તુળના કેન્દ્રના યામ} = \left(-\frac{16}{5}, \frac{53}{10} \right)$$

$$\therefore \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{\left(0 + \frac{16}{5} \right)^2 + \left(1 - \frac{53}{10} \right)^2} = \sqrt{\frac{256}{25} + \frac{1849}{100}} = \frac{\sqrt{2873}}{10}$$

∴ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ

$$\left(x + \frac{16}{5} \right)^2 + \left(y - \frac{53}{10} \right)^2 = \frac{2873}{100}$$

$$\therefore x^2 + y^2 + \frac{32x}{5} - \frac{106y}{10} + \frac{256}{25} + \frac{2809}{100} - \frac{2873}{100} = 0$$

$$\therefore 100x^2 + 100y^2 + 640x - 1060y + 1024 + 2809 - 2873 = 0$$

$$5x^2 + 5y^2 + 32x - 53y + 48 = 0$$

જવાબ : (A)

(6) (a, b) માંથી પસાર થતા અને વર્તુળ $x^2 + y^2 = p^2$ ને લંબચ્છેદી વર્તુળના કેન્દ્રનો બિંદુગણ છે.

$$(A) \quad x^2 + y^2 - 3ax - 4by + (a^2 + b^2 - p^2) = 0 \quad (B) \quad 2ax + 2by - (a^2 - b^2 + p^2) = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 2ax - 3by + (a^2 - b^2 - p^2) = 0 \quad (D) \quad 2ax + 2by - (a^2 + b^2 + p^2) = 0$$

ઉકેલ : ધારો કે (a, b) માંથી પસાર થતા વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ છે.

$$\therefore a^2 + b^2 + 2ag + 2bf + c = 0 \quad (1)$$

આપેલ વર્તુળ $x^2 + y^2 - p^2 = 0$ છે.

$$\therefore x^2 + y^2 - p^2 = 0 \quad \text{પરથી} \quad g_1 = 0, f_1 = 0, c_1 = -p^2$$

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \quad \text{પરથી} \quad g_2 = g, f_2 = f, c_2 = c$$

હવે, બંને વર્તુળો લંબચ્છેદી છે.

$$\therefore 2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$$

$$\therefore 2(0)g + 2(0)f_2 = -p^2 + c$$

$$\therefore c = p^2$$

હવે, ધારો કે (a, b) માંથી પસાર થતા વર્તુળનું કેન્દ્ર $(-g, -f) = (x, y)$ છે.


$$\therefore g = -x, f = -y. \quad \text{વળી, } c = p^2 \quad \text{હોવાથી,}$$

$$(1) \text{ પરથી, } a^2 + b^2 - 2ax - 2by + p^2 = 0$$

$$\therefore 2ax + 2by - (a^2 + b^2 + p^2) = 0$$

જવાબ : (D)

- (7) વર્તુળમાં અંતર્ગત લંબચોરસ ABCDનાં શિરોબિંદુઓ A(1, 3) તથા B(-5, 3) છે. વર્તુળના વ્યાસને સમાવતી રેખા $y = 4x - 3$ હોય, તો લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિનો ગુણોત્તર
- (A) 168 : 72 (B) 17 : 21 (C) 168 : 64 (D) 42 : 17



આકૃતિ 9.17

ઉકેલ : અહીં, $\overline{AB}$ નું મધ્યબિંદુ E(-2, 3) તથા $\overleftrightarrow{AB}$ સમક્ષિતિજ હોવાથી $\overline{AB}$ ના લંબદ્વિભાજકનું સમીકરણ $x = -2$ વર્તુળના વ્યાસને સમાવતી રેખા $y = 4x - 3$ અને લંબદ્વિભાજક $\overleftrightarrow{OE}$ $x = -2$ નું છેદબિંદુ O (-2, -11) એ વર્તુળનું કેન્દ્ર થશે.

$$\therefore OE = \sqrt{(-2+2)^2 + (3+11)^2} = \sqrt{196} = 14. \text{ આથી, } BC = 28.$$

$$\text{વળી, } AB = \sqrt{(-5-1)^2 + (3-3)^2} = 6$$

$$\therefore \text{લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ} = 28 \times 6 = 168$$

$$\text{લંબચોરસની પરિમિતિ} = 28 + 6 + 28 + 6 = 68$$

$$\therefore \text{લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ : લંબચોરસની પરિમિતિ} = 168 : 68$$

$$\therefore \text{માંગેલ ગુણોત્તર } 42 : 17$$

જવાબ : (D)

- (8) જેનું કેન્દ્ર રેખાઓ $3x + 5y = 1$ અને $(2+c)x + 5c^2y = 1$ ના છેદબિંદુ આગળનું લક્ષ હોય (જ્યાં $c \rightarrow 1$) તથા (2, 0) માંથી પસાર થતું હોય, તેવા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(A) \quad 25x^2 + 25y^2 - 4x + 4y - 60 = 0$$

$$(B) \quad 25x^2 + 25y^2 - 20x + 2y - 60 = 0$$

$$(C) \quad 25x^2 + 25y^2 + 4x - 2y - 64 = 0$$

$$(D) \quad 25x^2 + 25y^2 - 4x - 4y - 60 = 0$$

ઉકેલ : રેખાઓ $3x + 5y - 1 = 0$ અને $(2+c)x + 5c^2y - 1 = 0$ નું છેદબિંદુ $\left(\frac{5c^2 - 5}{15c^2 - 5c - 10}, \frac{1 - c}{15c^2 - 5c - 10} \right)$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = \left(\lim_{c \rightarrow 1} \frac{5(c^2 - 1)}{5(3c^2 - c - 2)}, \lim_{c \rightarrow 1} \frac{1 - c}{5(3c^2 - c - 2)} \right)$$

$$= \left(\lim_{c \rightarrow 1} \frac{(c-1)(c+1)}{(3c+2)(c-1)}, \lim_{c \rightarrow 1} \frac{c-1}{-5(3c+2)(c-1)} \right) = \left(\lim_{c \rightarrow 1} \frac{c+1}{3c+2}, \lim_{c \rightarrow 1} \frac{1}{-5(3c+2)} \right)$$

$$= \left(\frac{2}{5}, \frac{-1}{25} \right)$$

$$\therefore \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{\left(2 - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(0 + \frac{1}{25}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{64}{25} + \frac{1}{625}} = \frac{\sqrt{1601}}{25}$$

$\therefore$ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ

$$\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{25}\right)^2 = \frac{1601}{625}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - \frac{4x}{5} + \frac{2y}{25} + \frac{4}{25} + \frac{1}{625} - \frac{1601}{625} = 0$$

$$\therefore 625x^2 + 625y^2 - 500x + 50y - 1500 = 0$$

$$\therefore 25x^2 + 25y^2 - 20x + 2y - 60 = 0$$

જવાબ : (B)


- (9) ઊગમબિંદુ કેન્દ્ર અને a ત્રિજ્યા ધરાવતું એક વર્તુળ X-અક્ષને A અને Bમાં છેદે છે. $P(\alpha)$ અને $Q(\beta)$ બે વર્તુળ પરનાં બિંદુઓ છે કે જ્યાં $\alpha - \beta = 2\gamma$ જ્યાં γ અચળ છે, તો $\overleftrightarrow{AP}$ અને $\overleftrightarrow{BQ}$ ના છેદગણના બિંદુગણનું સમીકરણ

$$(A) \quad x^2 + y^2 - 2ay \tan \gamma = a^2$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 + 2ay \tan \gamma = a^2$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 + 2ay \tan \gamma = a^2$$

$$(D) \quad x^2 - y^2 + 2ay \tan \gamma = a^2$$



આકૃતિ 9.18

ઉકેલ : અહીં A ની યામ $(-a, 0)$ અને P ની યામ $(a \cos \alpha, a \sin \alpha)$

$$\overleftrightarrow{AP} \text{ નું સમીકરણ } y = \frac{a \sin \alpha}{a(\cos \alpha + 1)}(x + a) \Rightarrow y = \frac{a \left(2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}\right)}{a \left(2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}\right)}(x + a)$$

$$\therefore y = \tan \left(\frac{\alpha}{2} \right) (x + a) \quad (1)$$

તે જ રીતે B(a, 0) અને Q(a cos β, a sin β)

$$\overleftrightarrow{BQ} \text{ નું સમીકરણ } y = \frac{a \sin \beta}{a(\cos \beta - 1)}(x - a)$$

$$\therefore y = -\cot \left(\frac{\beta}{2} \right) (x - a) \quad (2)$$

સમીકરણ (1) અને (2) પરથી $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{y}{a+x}$

$$\tan\left(\frac{\beta}{2}\right) = \frac{a-x}{y}$$

હવે, $\alpha - \beta = 2\gamma$

$$\tan \gamma = \frac{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) - \tan\left(\frac{\beta}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \tan\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\frac{y}{a+x} - \frac{a-x}{y}}{1 + \frac{y}{a+x} \times \frac{a-x}{y}}$$

$$\therefore \tan \gamma = \frac{y^2 - a^2 + x^2}{(a+x)y + (a-x)y}$$

$$\therefore \tan \gamma = \frac{x^2 + y^2 - a^2}{2ay}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2ay \tan \gamma = a^2 \quad \text{મોડેલ બિંદુગણનું સમીકરણ છે.}$$

જવાબ : (A)

- (10) વર્તુળો $x^2 + y^2 = b^2$ અને $(x-a)^2 + y^2 = b^2$ નો સામાન્ય સ્પર્શક $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$ હોય તથા $m > 0$ અને $a > 2b > 0$ નો $m = \dots$

(A) $\frac{2b}{\sqrt{a^2 - 4b^2}}$

(B) $\frac{\sqrt{a^2 - 4b^2}}{2a}$

(C) $\frac{2b}{a-2b}$

(D) $\frac{b}{a-2b}$

ઉકેલ : અહીં વર્તુળો $x^2 + y^2 = b^2$ અને $(x-a)^2 + y^2 = b^2$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$ હોવાથી,

કેન્દ્ર (0, 0) થી સ્પર્શકનું લંબઅંતર = b (ત્રિજ્યા)

તથા કેન્દ્ર (a, 0) થી સ્પર્શકનું લંબઅંતર = b (ત્રિજ્યા)

$$\therefore \frac{|-b\sqrt{1+m^2}|}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{|am - 0 - b\sqrt{1+m^2}|}{\sqrt{1+m^2}} = b$$

$$\therefore |am - b\sqrt{1+m^2}|^2 = b^2(1+m^2)$$

$$\therefore a^2m^2 - 2abm\sqrt{1+m^2} + b^2(1+m^2) = b^2(1+m^2)$$

$$\therefore m^2a^2 = 2abm\sqrt{1+m^2}$$

$$\therefore am = 2b\sqrt{1+m^2} \quad (a \neq 0, m \neq 0)$$

$$\therefore m^2a^2 = 4b^2(1+m^2)$$

$$\therefore m^2 = \frac{4b^2}{a^2 - 4b^2}. \quad \text{અર્થાત્, } m = \frac{2b}{\sqrt{a^2 - 4b^2}} \quad (m > 0)$$

જવાબ : (A)

$$\therefore 16 + 58 + m - n = 0$$

$$\therefore m - n = -74$$

$$\therefore n - m = 74$$

જવાબ : (C)


- (13) એક વર્તુળ રેખા $y = x$ ને બિંદુ P માં સ્પર્શે છે અને $\overline{OP}$ નું માપ $4\sqrt{2}$ છે, જ્યાં O ઊગમબિંદુ છે. $(10, -2)$ વર્તુળના અંદરના ભાગનું બિંદુ છે. રેખા $x + y = 0$ દ્વારા વર્તુળ પર કપાતી જવાની લંબાઈ $6\sqrt{2}$ હોય, તો તે વર્તુળનું સમીકરણ

(A) $x^2 + y^2 + 9x + 2y + 32 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 18x + 2y + 16 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 18x - 2y + 16 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 18x + 2y + 32 = 0$



આકૃતિ 9.21

ઉકેલ : ધારો કે $\overline{CL} \perp \overline{QR}$, જ્યાં $\overline{QR}$ વર્તુળની આપેલ જવા છે. જ્યાં C વર્તુળનું કેન્દ્ર છે.

OPCL લંબચોરસ છે કે જેથી $OP = 4\sqrt{2} = CL$ અને $QL = \frac{1}{2}QR = 3\sqrt{2}$

$$\therefore r = CQ = \sqrt{CL^2 + LQ^2} = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\therefore CP = 5\sqrt{2}$$

ધારો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર C (h, k) છે. $x - y = 0$ નું C થી અંતર $5\sqrt{2}$ છે.

$$\therefore \frac{|h-k|}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \quad \text{આથી, } k-h = \pm 10 \quad (1)$$

$x + y = 0$ નું C થી અંતર $4\sqrt{2}$ છે.

$$\therefore \frac{|k+h|}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} \quad \text{આથી, } k+h = \pm 8 \quad (2)$$

(1) અને (2)ને ઉકેલતાં,

વર્તુળનાં કેન્દ્ર $(9, -1)$, $(1, -9)$, $(-1, 9)$, $(-9, 1)$ મળે, પરંતુ $(10, -2)$ વર્તુળના અંદરના ભાગમાં હોય, તેવું એકમાત્ર વર્તુળનું કેન્દ્ર $(9, -1)$ છે.

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } (x-9)^2 + (y+1)^2 = (5\sqrt{2})^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 18x + 2y + 32 = 0$$

જવાબ : (D)


- (14) ધારો કે A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 અને A_5 એ એકમ વર્તુળની અંતર્ગત નિયમિત ષટ્કોણનાં શિરોબિંદુઓ છે, તો રેખાખંડો A_0A_1, A_0A_2 અને A_0A_4 નો ગુણાકાર

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $3\sqrt{3}$

(C) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

(D) 3



આકૃતિ 9.22

ઉકેલ : ધારો કે $O(0, 0)$ કેન્દ્ર અને 1 એકમ ત્રિજ્યા ધરાવતા વર્તુળના શિરોબિંદુ A_0 ના યામ $(1, 0)$ છે.

અહીં, વર્તુળમાં અંતર્ગત નિયમિત ષટ્કોણની અંદરની બાજુ ઊગમબિંદુ આગળ $\frac{\pi}{3}$ ના માપનો ખૂણો બનાવે છે.

$$\therefore A_1 \text{ ની યામ } = \left(\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$A_2 \text{ ની યામ } = \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$A_3 \text{ ની યામ } = \left(\cos \frac{3\pi}{3}, \sin \frac{3\pi}{3} \right) = (-1, 0)$$

$$A_4 \text{ ની યામ } = \left(\cos \frac{4\pi}{3}, \sin \frac{4\pi}{3} \right) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$A_5 \text{ ની યામ } = \left(\cos \frac{5\pi}{3}, \sin \frac{5\pi}{3} \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$A_0A_1 = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

$$A_0A_2 = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$$

$$A_0A_4 = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$$

$$\therefore (A_0A_1) (A_0A_2) (A_0A_4) = (1)(\sqrt{3})(\sqrt{3}) = 3$$

જવાબ : (D)


- (15) જો a અને b લંબાઈના સળિયાઓ અનુક્રમે X-અક્ષ અને Y-અક્ષ પર આવેલા હોય, તો સળિયાનાં અંત્યબિંદુઓમાંથી પસાર થતા વર્તુળના કેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) $4(x^2 - y^2) = a^2 + b^2$

(B) $4(x^2 - y^2) = a^2 - b^2$

(C) $x^2 - y^2 = a^2 - b^2$

(D) $x^2 - y^2 = a^2 + b^2$



આકૃતિ 9.23

ઉકેલ : ધારો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર (h, k) છે અને વર્તુળ સળિયાઓ $\overline{AB}$ અને $\overline{CD}$ નાં અંત્યબિંદુઓમાંથી પસાર થાય છે. અર્થાત્ વર્તુળ A, B, C, Dમાંથી પસાર થાય છે.

$\overline{AB}$ અને $\overline{CD}$ સળિયાની લંબાઈ અનુક્રમે a અને b છે.

આકૃતિ પરથી $\overline{OL} \perp \overline{AB}$, $\overline{OM} \perp \overline{CD}$

$$\therefore AL = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2} \text{ અને } CM = \frac{1}{2} CD = \frac{b}{2}$$

હવે, $OA = OC$

(એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા)

$$\therefore OA^2 = OC^2$$

$$\therefore OL^2 + AL^2 = OM^2 + CM^2$$

$$\frac{a^2}{4} + k^2 = h^2 + \frac{b^2}{4}$$

$$\therefore 4(h^2 - k^2) = a^2 - b^2$$

$$\therefore \text{કેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ } 4(x^2 - y^2) = a^2 - b^2$$

જવાબ : (B)


- (16) જો $\overline{OA}$ અને $\overline{OB}$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ને ઊગમબિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકો હોય અને C એ આ વર્તુળનું કેન્દ્ર હોય, તો ચતુષ્કોણ OACBનું ક્ષેત્રફળ =

(A) $\frac{1}{2} \sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$

(B) $\sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$

(C) $c \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

(D) $\frac{\sqrt{g^2 + f^2 - c}}{c}$



આકૃતિ 9.24

ઉકેલ : અહીં, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ $OA = OB$ તથા $CA = CB$ અને વિકર્ણ $\overline{OC}$ ચતુષ્કોણ OACBને

બે એકરૂપ કાટકોણ ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરે છે. તે ત્રિકોણો ΔOAC તથા ΔOBC છે.

$\therefore$ ચતુષ્કોણ $OACB$ નું ક્ષેત્રફળ = 2 (ત્રિકોણ OAC નું ક્ષેત્રફળ)

$$= 2 \times \left(\frac{1}{2} \times \text{પાયો} \times \text{વેધ} \right)$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times OA \times AC$$

$$= \sqrt{0+0+2g \times 0+2f \times 0+c} \cdot \sqrt{g^2+f^2-c}$$

$$= \sqrt{c(g^2+f^2-c)}$$

જવાબ : (B)

(17) $(0, 0)$, $(a, 0)$ અને $(0, b)$ માંથી પસાર થતા વર્તુળનું સમીકરણ =

(A) $x^2 + y^2 - ax + by = 0$

(B) $x^2 + y^2 + ax + by = 0$

(C) $x^2 + y^2 + ax - by = 0$

(D) $x^2 + y^2 - ax - by = 0$

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ છે. તે $(0, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore c = 0$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું સમીકરણ } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$$

વળી તે $(a, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore a^2 + 2ga = 0 \quad \text{આથી } g = \frac{-a}{2}$$

વર્તુળ $(0, b)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore b^2 + 2fb = 0 \quad \text{આથી } f = \frac{-b}{2}$$

$$\text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } x^2 + y^2 - ax - by = 0$$

જવાબ : (D)

(18) વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 10y + \alpha = 0$ અક્ષોને સ્પર્શતું ન હોય અને બિંદુ $(1, 4)$ એ વર્તુળના અંદરના ભાગમાં હોય, તો α નો વિસ્તાર

(A) $(25, 29)$

(B) $(9, 25)$

(C) $(5, 25)$

(D) $(0, 29)$

$$\text{ઉકેલ : વર્તુળનું સમીકરણ } x^2 + y^2 - 6x - 10y + \alpha = 0$$

$$\therefore \text{કેન્દ્ર } (3, 5) \text{ અને ત્રિજ્યા } r = \sqrt{34 - \alpha}$$

અહીં, વર્તુળ X -અક્ષને સ્પર્શતું નથી.

$$\therefore \text{ત્રિજ્યા } r < | \text{કેન્દ્રનો } y\text{-યામ} |$$

$$\therefore \sqrt{34 - \alpha} < 5. \quad \text{આથી } \alpha > 9$$

અહીં, વર્તુળ Y -અક્ષને સ્પર્શતું કે છેદતું નથી.

$$\therefore \text{ત્રિજ્યા } r < | \text{કેન્દ્રનો } x\text{-યામ} |$$

$$\sqrt{34-\alpha} < 3$$

$$\therefore 34-\alpha < 9 \quad \text{આથી } \alpha > 25$$

વળી, બિંદુ (1, 4) એ વર્તુળના અંદરના ભાગમાં આવેલું હોવાથી, બિંદુ (1, 4)નું કેન્દ્ર (3, 5)થી અંતર < ત્રિજ્યા

$$\therefore \sqrt{(3-1)^2 + (5-4)^2} < r \quad \therefore \sqrt{5} < \sqrt{34-\alpha}$$

$$\therefore 5 < 34 - \alpha \quad \text{આથી, } \alpha < 29$$


આમ, $\alpha > 9$, $\alpha > 25$ તથા $\alpha < 29$

$$\therefore \alpha \in (25, 29)$$

જવાબ : (A)

- (19) વર્તુળ $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ ની એક જવા ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થઈને વર્તુળ ધન Y-અક્ષને જે બિંદુએ છેદે છે ત્યાં $\tan^{-1}\left(\frac{7}{4}\right)$ માપના ખૂણો આંતરે છે, તો જવાને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ

- (A) $2x + 3y = 0$ (B) $x + 2y = 0$ (C) $x - 2y = 0$ (D) $2x - 3y = 0$



આકૃતિ 9.25

ઉકેલ : અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વર્તુળ ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થઈને ધન Y-અક્ષની દિશામાં બિંદુ B(0, 6)માંથી પસાર થાય છે. ધારો કે $\overline{OP}$ એ વર્તુળની જવા છે અને બિંદુ B આગળ θ માપનો ખૂણો આંતરે છે કે જ્યાં $\tan\theta = \frac{7}{4}$.

આપેલા વર્તુળના ઊગમબિંદુ O આગળના સ્પર્શક $\overleftrightarrow{OT}$ નું સમીકરણ $2x + 3y = 0$

$$\therefore \text{સ્પર્શકનો ઢાળ} = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{જો } m \angle XOT = \alpha, \tan\alpha = -\frac{2}{3}$$

ભૂમિતિ પરથી, $m \angle POT = m \angle OBP = \theta$

$$\Rightarrow m \angle POX = \theta + \alpha \text{ અને}$$

$$\tan(\theta + \alpha) = \frac{\tan\theta + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha \tan\theta} = \frac{\frac{7}{4} - \frac{2}{3}}{1 + \frac{7}{4} \times \frac{2}{3}} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}$$


$\therefore$ જવા $\overline{OP}$ ને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ $y = x \tan(\theta + \alpha)$

$\therefore x - 2y = 0$ માંગેલ સમીકરણ છે.

જવાબ : (C)

(20) વર્તુળ $x^2 + y^2 = a^2$ ની જે જીવાઓ કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો બનાવે, તે તમામ જીવાઓનાં મધ્યબિંદુઓના બિંદુગણનું સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 = a^2$ (B) $x^2 + y^2 = 2a^2$ (C) $2x^2 + 2y^2 = a^2$ (D) શક્ય નથી.



આકૃતિ 9.26

ઉકેલ : ધારો કે વર્તુળ $x^2 + y^2 = a^2$ ની કોઈ જીવા $\overline{AB}$ નું મધ્યબિંદુ $P(x, y)$ છે તથા $O(0, 0)$ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે.

$$\therefore OA = OB = \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = a$$

$$\therefore m \angle AOB = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore OA^2 + OB^2 = AB^2$$

$$\therefore a^2 + a^2 = AB^2 \quad \text{અર્થાત્, } AB^2 = 2a^2$$

$$\text{હવે, } m \angle OPA = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore OP^2 + AP^2 = OA^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 + AP^2 = a^2$$

$$x^2 + y^2 + \frac{AB^2}{4} = a^2 \quad \left(\because AP = \frac{AB}{2} \right)$$

$$\therefore x^2 + y^2 = a^2 - \frac{a^2}{2}$$

$$\therefore x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$\therefore 2x^2 + 2y^2 = a^2$$

જવાબ : (C)

બીજી રીત : ધારો કે $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ છે.

$$\therefore x_1^2 + y_1^2 = a^2$$

$$\vec{OA} \perp \vec{OB}$$

$$\therefore \left(\frac{y_1 - 0}{x_1 - 0} \right) \left(\frac{y_2 - 0}{x_2 - 0} \right) = -1$$

$$\therefore x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$$


જો મધ્યબિંદુ (x, y) હોય તો,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore 4(x^2 + y^2) &= x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 + y_1^2 + 2y_1 y_2 + y_2^2 \\ &= a^2 + a^2 + 0 = 2a^2 \end{aligned}$$

$$\therefore 2x^2 + 2y^2 = a^2 \text{ માંગેલ બિંદુગણ છે.}$$

ચીજ રીત :



આકૃતિ 9.26 A

$$m \angle AOB = \frac{\pi}{2} \text{ અથવા } m \angle OAM = m \angle AOM = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore OM^2 + AM^2 = a^2$$

$$\therefore 2OM^2 = a^2$$

$$\therefore 2x^2 + 2y^2 = a^2$$


(21) બિંદુ $(2, 5)$ માંથી વર્તુળ $x^2 + y^2 = 16$ ને દોરેલા સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

(A) $\tan^{-1} \frac{4}{5}$

(B) $2 \tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{13}}$

(C) $\tan^{-1} \frac{8}{5}$

(D) $\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{4}{5}$



આકૃતિ 9.27

ઉકેલ : અહીં વર્તુળનું કેન્દ્ર $C(0, 0)$ તથા બિંદુ $P(2, 5)$ છે.

$$\therefore CP = \sqrt{(2-0)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{29}$$

હવે, ΔACP માં $m\angle A = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore AC^2 + AP^2 = CP^2$$

$$\therefore AP^2 = CP^2 - AC^2 = 29 - 16$$

$$\therefore AP = \sqrt{13}$$

ધારો કે બહારના બિંદુ P આગળ સ્પર્શકોથી બનતા ખૂણાનું માપ 2α છે.

$\therefore$ અર્ધકોણ α થશે.

$$\therefore \Delta ACP \text{ માટે, } \tan\alpha = \frac{CA}{AP} = \frac{4}{\sqrt{13}}$$


$$\therefore \alpha = \tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{13}}$$

$$\therefore P \text{ આગળના ખૂણાનું માપ } = 2\alpha = 2\tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{13}}$$

જવાબ : (B)

- (22) 5 એકમ ત્રિજ્યાવાળાં બે વર્તુળો $(1, 2)$ બિંદુ આગળ સ્પર્શી છે. તેમના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $4x + 3y = 10$ હોય, તો બંને વર્તુળોના સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 - 10x + 10y + 25 = 0$, $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 15 = 0$
 (B) $x^2 + y^2 + 10x + 10y + 25 = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 - 10x - 10y - 25 = 0$, $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 15 = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$, $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 15 = 0$



આકૃતિ 9.28

ઉકેલ : બંને વર્તુળોના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ $4x + 3y - 10 = 0$ છે. આથી, તેનો ઢાળ $= -\frac{4}{3}$

$$\therefore \text{કેન્દ્રોને જોડતી રેખાનો ઢાળ} = \frac{3}{4}$$

વળી, તે $(1, 2)$ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore \text{કેન્દ્રોમાંથી પસાર થતી રેખા } y - 2 = \frac{3}{4}(x - 1)$$

$$\therefore \frac{y-2}{3} = \frac{x-1}{4} = k \text{ લેતાં, } x=4k+1, \quad y=3k+2$$

કોઈક ભિન્ન k માટે બંને વર્તુળોનાં કેન્દ્રો $x=4k+1$ અને $y=3k+2$ થશે.

હવે કેન્દ્રથી સ્પર્શકનું લંબઅંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{|4(4k+1)+3(3k+2)-10|}{\sqrt{4^2+3^2}} = 5$$

$$|16k+4+9k+6-10| = 25$$

$$\therefore |25k| = 25 \quad \text{આથી } |k| = 1 \quad \text{આથી } k = \pm 1$$

$\therefore$ 5 એકમ ત્રિજ્યાવાળાં વર્તુળોનાં કેન્દ્રો $(5, 5)$ અને $(-3, -1)$ થશે.

$\therefore (5, 5)$ કેન્દ્ર અને 5 ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$ અને

$(-3, -1)$ કેન્દ્ર અને 5 ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 25$

$\therefore$ માંગેલાં વર્તુળો $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$ અને $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 15 = 0$ જવાબ : (D)

(23) ઊગમબિંદુમાંથી દોરેલાં વર્તુળ $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ ના સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

(A) $\frac{\pi}{4}$


(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{6}$

ઉકેલ : ઊગમબિંદુ $(0, 0)$ માંથી પસાર થતા સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx$ એટલે કે $mx - y = 0$ છે.

વર્તુળનું કેન્દ્ર $(3, -1)$, ત્રિજ્યા $r = \sqrt{5}$



આકૃતિ 9.29

$\therefore$ કેન્દ્રથી સ્પર્શકનું લંબઅંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{|m(3)+1|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5}$$

$$\therefore (3m+1)^2 = 5(m^2+1)$$

$$\therefore 2m^2 + 3m - 2 = 0$$

$\therefore$ બે બીજ m_1 અને m_2 હોય, તો $m_1 m_2 = \frac{-2}{2} = -1$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2} \quad [(2m+1)(m+2) = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{2} \text{ or } -2]$$

જવાબ : (B)