

ઉકેલ : અહીં આપેલા વર્તુળ $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 1 = 0$ નું કેન્દ્ર $C(4, -3)$ છે તથા $\overline{CA} \perp \overline{PA}$ અને $\overline{CB} \perp \overline{PB}$

$\therefore \overline{PC}$ માંગેલા વર્તુળનો વ્યાસ થશે.

$C(4, -3)$ તથા $P(1, 2)$ છે. તે વ્યાસાંત બિંદુઓ થશે.

$\therefore$ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ $(x-1)(x-4) + (y-2)(y+3) = 0$

$\therefore x^2 + y^2 - 5x + y - 2 = 0$

જવાબ : (B)

(26) વર્તુળો $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ અને રેખાઓ $\sqrt{3}(x^2 + y^2) = 4xy$ વચ્ચેનાં ભાગનું ક્ષેત્રફળ

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{5\pi}{2}$

(D) 3π

ઉકેલ : રેખાઓનું સંયુક્ત સમીકરણ $\sqrt{3}x^2 - 4xy + \sqrt{3}y^2 = 0$


$\therefore a = \sqrt{3}, 2h = -4, b = \sqrt{3}$

$\therefore$ તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ θ હોય, તો

$$\tan \theta = \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{|a + b|}$$

$\therefore \tan \theta = \frac{2\sqrt{4-3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{6}$



આકૃતિ 9.32

$\therefore$ માંગેલ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6} \times (2^2 - 1^2) = \frac{\pi}{4}$

$(\because \frac{1}{2} \theta (r_1^2 - r_2^2))$

જવાબ : (A)


(27) $(0, 0)$ અને $(3, 0)$ માંથી પસાર થતા અને વર્તુળ $x^2 + y^2 = 25$ ને સ્પર્શતા વર્તુળનું કેન્દ્ર

(A) $\left(\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\sqrt{2}\right)$

(B) $\left(\frac{3}{2}, \sqrt{2}\right), \left(\frac{3}{2}, -\sqrt{2}\right)$

(C) $\left(-\frac{1}{2}, 2\right), \left(-\frac{1}{2}, -2\right)$

(D) $\left(\frac{3}{2}, 2\right), \left(\frac{3}{2}, -2\right)$



આકૃતિ 9.33

ઉકેલ : ધારો કે વર્તુળનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

વર્તુળ $(0, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$\therefore c = 0$ તથા તે $(3, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$9 + 6g = 0. \quad \text{આથી } g = -\frac{3}{2}$$

વર્તુળ $x^2 + y^2 = 25$ અને $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$ પરસ્પર સ્પર્શે છે.

બંને વર્તુળોના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$2gx + 2fy + 25 = 0$$

કેન્દ્ર $(0, 0)$ થી સામાન્ય સ્પર્શક $2gx + 2fy + 25 = 0$ નું અંતર 5 થશે.

$$\therefore 5 = \frac{|25|}{\sqrt{4g^2 + 4f^2}} \quad \text{આથી, } (4g^2 + 4f^2) = 25$$

$$\therefore 4 \times \frac{9}{4} + 4f^2 = 25$$

$$\therefore f^2 = 4$$

$$\therefore f = \pm 2$$

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર } \left(\frac{3}{2}, 2\right) \text{ અથવા } \left(\frac{3}{2}, -2\right)$$

જવાબ : (D)


(28) $(3, 7)$ અને $(5, 8)$ કેન્દ્રવાળા એકરૂપ વર્તુળોની સામાન્ય જીવાને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ

(A) $4x + 2y + 31 = 0$

(B) $4x - 2y + 31 = 0$

(C) $4x + 2y - 31 = 0$

(D) $4x - 2y - 31 = 0$



આકૃતિ 9.34

ઉકેલ : આપેલાં બંને વર્તુળો એકરૂપ હોવાથી ત્રિજ્યા સમાન થાય. ધારો કે ત્રિજ્યા r છે.

$$\therefore (3, 7) \text{ કેન્દ્રવાળા } r \text{ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ } (x-3)^2 + (y-7)^2 = r^2$$

$$\therefore S_1 : x^2 + y^2 - 6x - 14y + 58 - r^2 = 0$$

$$\text{તથા } (5, 8) \text{ કેન્દ્રવાળા અને } r \text{ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ } (x-5)^2 + (y-8)^2 = r^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - 16y + 89 - r^2 = 0$$

$$\text{સામાન્ય જીવાને સમાવતી રેખાનું સમીકરણ } S_1 - S_2 = 0 \text{ પરથી } 4x + 2y - 31 = 0$$

જવાબ : (C)


(29) વર્તુળ $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ ના કેન્દ્ર સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો ખૂણો બનાવતી વર્તુળની જીવાના મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) $4x^2 + 4y^2 - 16x - 16y + 5 = 0$

(B) $2x^2 + 2y^2 - 4x - 4y + 5 = 0$

(C) $4x^2 + 4y^2 + 16x + 16y + 5 = 0$

(D) $2x^2 + 2y^2 + 4x + 4y + 5 = 0$



આકૃતિ 9.35

ઉકેલ : વર્તુળ $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ નું કેન્દ્ર $C(2, 2)$ તથા ત્રિજ્યા $r = 3$ થાય.

જો $\overline{AB}$ કેન્દ્ર C આગળ $\frac{\pi}{3}$ માપનો ખૂણો બનાવે છે.

ΔABC માં $m\angle ACB = \frac{\pi}{3}$ તથા $CA = CB$ (ત્રિજ્યા)

$$\therefore m\angle CAB = m\angle CBA = \frac{\pi}{3}$$

ધારો કે, જો $\overline{AB}$ નું મધ્યબિંદુ $M(x, y)$ છે.

$$\therefore \Delta AMC \text{ માં } \sin \frac{\pi}{3} = \frac{CM}{AC}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{CM}{3} \quad \text{આથી, } CM = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore CM^2 = \frac{27}{4}$$

$$\therefore (x-2)^2 + (y-2)^2 = \frac{27}{4}$$

$$\therefore 4x^2 + 4y^2 - 16x - 16y + 5 = 0 \text{ માંગેલ બિંદુગણ છે.}$$

જવાબ : (A)


(30) જો સમબાજુ ત્રિકોણના અંતઃવૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$ હોય, તો ત્રિકોણના પરિવૃત્તનું સમીકરણ

(A) $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 27 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 27 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 27 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 27 = 0$



આકૃતિ 9.36

ઉકેલ : ΔABC સમબાજુ ત્રિકોણ છે, તથા તેના અંતઃવૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$ છે.

$\therefore$ કેન્દ્રના યામ $O(-1, 2)$ તથા ત્રિજ્યા $r = \sqrt{8}$

હવે, ΔABC ના પરિવૃત્તનું કેન્દ્ર પણ $O(-1, 2)$ થાય.

$$r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$= 4R \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\therefore r = \frac{R}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{પરિત્રિજ્યા} = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{પરિવૃત્તનું સમીકરણ } (x+1)^2 + (y-2)^2 = 32$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 2x - 4y - 27 = 0$$

જવાબ : (B)

(31) $x=2$ અને $y=6$ રેખાઓ જેના અભિલંબો હોય અને $2x+5y-5=0$ જેનો સ્પર્શક હોય તેવા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(A) \quad x^2 + y^2 - 4x - 10y + 29 = 0$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 + 4x + 10y - 29 = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 + 4x + 10y = 0$$

ઉકેલ : અહીં $x=2$ અને $y=6$ અભિલંબ છે.

$\therefore$ તે બંને રેખાઓનું છેદબિંદુ $(2, 6)$ વર્તુળનું કેન્દ્ર થશે.

હવે સ્પર્શક $2x+5y-5=0$ છે.

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \frac{|2(2)+5(6)-5|}{\sqrt{4+25}} = \frac{29}{\sqrt{29}} = \sqrt{29}$$

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } (x-2)^2 + (y-6)^2 = (\sqrt{29})^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$$

જવાબ : (C)

(32) ઊગમબિંદુ કેન્દ્રવાળા અને જે સમબાજુ ત્રિકોણની મધ્યગાની લંબાઈ $3a$ હોય તેવા ત્રિકોણના શિરોબિંદુમાંથી પસાર, થતા વર્તુળનું સમીકરણ (પરિવૃત્તનું સમીકરણ)

$$(A) \quad x^2 + y^2 = a^2$$

$$(B) \quad x^2 + y^2 = 2a^2$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 = 4a^2$$

$$(D) \quad x^2 + y^2 = 3a^2$$

ઉકેલ : અહીં વર્તુળનું કેન્દ્ર $(0, 0)$ છે તથા ત્રિકોણ સમબાજુ છે.

$\therefore$ ત્રિકોણનું મધ્યકેન્દ્ર = પરિકેન્દ્ર = $(0, 0)$

અહીં, સમબાજુ ત્રિકોણની મધ્યગાની લંબાઈ = $3a$

$\therefore$ વર્તુળની ત્રિજ્યા = કેન્દ્રથી ત્રિકોણના શિરોબિંદુ સુધીનું લંબઅંતર

$$= \frac{2}{3} (\text{મધ્યગાની લંબાઈ}) = \frac{2}{3} (3a) = 2a$$

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } x^2 + y^2 = 4a^2$$

જવાબ : (C)

- (33) ત્રિકોણના શિરોબિંદુ $(3, 4)$, $(5\cos\theta, 5\sin\theta)$ અને $(5\sin\theta, -5\cos\theta)$ હોય, તો ત્રિકોણના મધ્યકેન્દ્રના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) $9x^2 + 9y^2 + 18x + 24y + 25 = 0$ (B) $9x^2 + 9y^2 - 18x + 24y + 25 = 0$

(C) $9x^2 + 9y^2 + 18x - 24y - 25 = 0$ (D) $9x^2 + 9y^2 - 18x - 24y - 25 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે ΔABC માં $A(3, 4)$, $B(5\cos\theta, 5\sin\theta)$ અને $C(5\sin\theta, -5\cos\theta)$ છે.

$$\text{મધ્યકેન્દ્રના યામ } (a, b) = \left(\frac{3+5\cos\theta+5\sin\theta}{3}, \frac{4+5\sin\theta-5\cos\theta}{3} \right)$$

$$\therefore a = \frac{3+5\cos\theta+5\sin\theta}{3}, b = \frac{4+5\sin\theta-5\cos\theta}{3}$$

$$\therefore 5\sin\theta+5\cos\theta = 3a-3 \quad (1)$$

$$\text{અને } 5\sin\theta-5\cos\theta = 3b-4 \quad (2)$$

$$\text{વર્ગ કરીને ઉમેરતાં, } (3a-3)^2 + (3b-4)^2 = 50. \quad \text{આથી } 9a^2 + 9b^2 - 18a - 24b - 25 = 0$$

$$\therefore \text{ માંગેલ બિંદુગણ } 9x^2 + 9y^2 - 18x - 24y - 25 = 0 \quad \text{જવાબ : (D)}$$

- (34) વર્તુળ $x^2 + y^2 = 4$ અને $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 24$ ને સામાન્ય સ્પર્શક હોય.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : અહીં, $C_1 = (0, 0)$, $r_1 = 2$; $C_2 = (3, 4)$, $r_2 = 7$

$$\therefore C_1C_2 = \sqrt{9+16} = 5 \quad |r_1 - r_2| = |2-7| = 5$$

$$\therefore C_1C_2 = |r_1 - r_2|$$

$\therefore$ વર્તુળો પરસ્પર અંદરથી સ્પર્શી છે.

$\therefore$ એક જ સામાન્ય સ્પર્શક મળે. જવાબ : (B)

- (35) વર્તુળો $x^2 + y^2 = 4$ અને $x^2 + y^2 - 4\lambda x + 9 = 0$ ને બે સામાન્ય છેદબિંદુ હોય, તો $\lambda = \dots\dots$

(A) $\lambda \in \left(\frac{-13}{8}, \frac{13}{8} \right)$ (B) $\lambda > \frac{13}{8}$ અથવા $\lambda < \frac{-13}{8}$

(C) $1 < \lambda < \frac{13}{8}$ (D) આમાંથી એક પણ નહિ. (AIEEE : 2002)

ઉકેલ : અહીં આપેલા સમીકરણ ઉકેલતાં, $4\lambda x = 13$

$$y^2 + \left(\frac{13}{4\lambda} \right)^2 = 4 \quad \text{આથી, } y^2 = 4 - \left(\frac{13}{4\lambda} \right)^2$$

$$\text{તેને બે વાસ્તવિક ભિન્ન કિંમતો હોય, તો } 4 - \left(\frac{13}{4\lambda} \right)^2 > 0$$

$$\therefore 4 > \left(\frac{13}{4\lambda} \right)^2, \text{ આથી, } \lambda^2 > \left(\frac{13}{8} \right)^2. \text{ આથી, } \lambda < \frac{-13}{8} \text{ અથવા } \lambda > \frac{13}{8} \quad \text{જવાબ : (B)}$$

(36) જો આપેલ વર્તુળ $r^2 = 2 - 4r \cos \theta + 6r \sin \theta$ હોય, તો આપેલા વર્તુળની ત્રિજ્યા =

- (A) $\sqrt{13}$ (B) $\sqrt{11}$ (C) $\sqrt{14}$ (D) $\sqrt{15}$

ઉકેલ : અહીં, $r^2 = 2 - 4r \cos \theta + 6r \sin \theta$ આપેલ છે.

હવે, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ લેતાં,

$$x^2 + y^2 = 2 - 4x + 6y$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 4x - 6y - 2 = 0$$

$$\therefore g = 2, f = -3, c = -2$$

$$\therefore \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{4 + 9 + 2} = \sqrt{15}$$

જવાબ : (D)

(37) વર્તુળ $x^2 + y^2 + (1 - \lambda)x + \lambda y + 5 = 0$ ની ત્રિજ્યા 5 કરતાં વધારે ન હોય, તો મહત્તમ $\lambda = \dots$, $\lambda \in \mathbb{N}$

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

$$\text{ઉકેલ : અહીં, વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \sqrt{\left(\frac{1 - \lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 - 5} \leq 5$$

$$\therefore (1 - \lambda)^2 + \lambda^2 - 20 \leq 100$$

$$\therefore 2\lambda^2 - 2\lambda - 119 \leq 0$$

$$\therefore \frac{1 - \sqrt{239}}{2} \leq \lambda \leq \frac{1 + \sqrt{239}}{2}$$

$$\therefore -7.2 \leq \lambda \leq 7.2 \text{ (આશરે)}$$

$$\therefore \lambda = 7$$

જવાબ : (A)

(38) જો બે વર્તુળો બિંદુઓ $(0, a)$ અને $(0, -a)$ માંથી પસાર થાય છે અને, એકબીજાને લંબચ્છેદી છે અને રેખા $y = mx + c$ ને સ્પર્શે છે, તો

- (A) $c^2 = a^2(1 + m^2)$ (B) $c^2 = a^2|1 - m^2|$
(C) $c^2 = a^2(2 + m^2)$ (D) $c^2 = 2a^2(1 + m^2)$

ઉકેલ : $(0, a)$ અને $(0, -a)$ માંથી પસાર થતાં વર્તુળોના સમુદાયનું સમીકરણ

$$x^2 + y^2 + 2\lambda ax - a^2 = 0.$$

જો બે વર્તુળો $\lambda = \lambda_1$ અને $\lambda = \lambda_2$ માટે એકબીજાને લંબચ્છેદી હોય, તો

$$2\lambda_1\lambda_2 a^2 = -2a^2 \quad \text{આથી, } \lambda_1\lambda_2 = -1 \quad (2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2)$$

વળી, આ બંને વર્તુળો રેખા $y = mx + c$ ને સ્પર્શે છે.

$$\left[\frac{-\lambda am + c}{\sqrt{1 + m^2}} \right]^2 = \lambda^2 a^2 + a^2$$

$$\therefore (\lambda am - c)^2 = a^2 (\lambda^2 + 1)(1 + m^2)$$

$$\therefore a^2 \lambda^2 + 2mca\lambda - c^2 + a^2(1 + m^2) = 0$$

$$\therefore a^2(1 + m^2) - c^2 = -a^2 \quad (\text{બીજનોગુણકાર } \lambda_1 \lambda_2 = -1)$$

$$\therefore c^2 = (2 + m^2)a^2 \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(39) બિંદુ P અને Q ના યામ અનુક્રમે $(2, 3)$ અને $(3, 2)$ છે. $\overline{OP}$ અને $\overline{OQ}$ ને વ્યાસ લઈને દોરેલાં વર્તુળોની સામાન્ય જીવાની લંબાઈ = (જ્યાં O એ ઊગમબિંદુ છે.)

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{13}$ (C) $\frac{5}{\sqrt{2}}$ (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : અહીં વર્તુળોનાં સમીકરણ

$$x^2 + y^2 - 2x - 3y = 0 \quad (1) \text{ અને } x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0 \quad (2) \text{ છે.}$$

છેદબિંદુ માટે $x = y$

$$\therefore 2x^2 - 5x = 0$$

$$\therefore x = 0, \frac{5}{2} \text{ મળે. હવે } y = x \text{ હોવાથી છેદબિંદુ } (0, 0), \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right) \text{ મળે.}$$

$$\text{જીવાની લંબાઈ} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(40) ઊગમબિંદુથી સૌથી વધારે દૂર વર્તુળ $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$ પરનાં બિંદુના યામ =

(A) $\left(2 + \frac{8}{\sqrt{5}}, 1 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ (B) $\left(1 + \frac{4}{\sqrt{5}}, 2 + \frac{8}{\sqrt{5}}\right)$
(C) $\left(1 + \frac{8}{\sqrt{5}}, 2 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : અહીં માંગેલ બિંદુ ઊગમબિંદુ અને કેન્દ્ર $(1, 2)$ ને જોડતી રેખા પર આવેલું છે.

એટલે કે રેખા $y = 2x$ પર આવેલું છે.

$$\therefore y = 2x \text{ લેતાં } 5x^2 - 10x - 11 = 0$$

હવે રેખા $y = 2x$ એ વર્તુળને બિંદુઓ $\left(1 \pm \frac{4}{\sqrt{5}}, 2 \pm \frac{8}{\sqrt{5}}\right)$ માં મળે છે. તે પૈકીનું ઊગમબિંદુથી સૌથી વધારે દૂરનું

$$\text{બિંદુ } \left(1 + \frac{4}{\sqrt{5}}, 2 + \frac{8}{\sqrt{5}}\right) \text{ છે.}$$

જવાબ : (B)

બીજી રીત : વર્તુળનું સમીકરણ $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 16$

$$\therefore \text{તેનાં પ્રચલ સમીકરણ } (1 + 4\cos t, 2 + 4\sin t), t \in [0, 2\pi) \text{ છે.}$$

ઊગમબિંદુથી અંતર d હોય તો,

$$d^2 = (1 + 4\cos t)^2 + (2 + 4\sin t)^2$$

$$g(t) = 21 + 8\cos t + 16\sin t$$

$$8 \cos t + 16 \sin t \text{ ની મહત્તમ કિંમત } \sqrt{64 + 256} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$$

$$\therefore d \text{ ની મહત્તમ કિંમત } \sqrt{21 + 8\sqrt{5}} = \sqrt{21 + 2\sqrt{80}} = \sqrt{16} + \sqrt{5} = 4 + \sqrt{5}$$

$$\text{મહત્તમ માટે } g'(t) = -8 \sin t + 16 \cos t = 0$$

$$\therefore \frac{\sin t}{2} = \frac{\cos t}{1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \sin t = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos t = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\text{વળી, } f''(t) = -8 \cos t - 16 \sin t < 0$$

$$\therefore (1 + 4 \cos t, 2 + 4 \sin t) = \left(1 + \frac{4}{\sqrt{5}}, 2 + \frac{8}{\sqrt{5}}\right)$$

- (41) વર્તુળ $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 0$ પરના બિંદુ P થી દોરેલા સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 2α હોય તો P ના બિંદુગણનું સમીકરણ..... .

(A) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 9 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 4 = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$

ઉકેલ : આમા વર્તુળનું કેન્દ્ર $(-2, 3)$ અને ત્રિજ્યા $= \sqrt{4 + 9 - 9 \sin^2 \alpha - 13 \cos^2 \alpha} = 2 \sin \alpha$

ધારો કે $P(h, k)$ માંગેલ કેન્દ્ર છે તથા $\angle APC = \alpha$.

$$\therefore \angle PAC = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{AC}{PC} = \frac{2 \sin \alpha}{\sqrt{(h+2)^2 + (k-3)^2}}$$


$$\therefore \sqrt{(h+2)^2 + (k-3)^2} = 2$$

$$\therefore (h+2)^2 + (k-3)^2 = 4$$

$$\therefore h^2 + k^2 + 4h - 6k + 9 = 0$$

માંગેલ બિંદુગણ $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$.

જવાબ : (D)



આકૃતિ 9.37


- (42) જો રેખા $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ એ વર્તુળો $x^2 + y^2 = a^2$ અને $x^2 + y^2 = b^2$ ની સામાન્ય જવા $APQB$ હોય, તો $AP = \dots\dots$ (જ્યાં $a > b$) છે.

(A) $\sqrt{a^2 + p^2} - \sqrt{b^2 + p^2}$

(B) $\sqrt{a^2 - p^2} - \sqrt{b^2 - p^2}$

(C) $\sqrt{a^2 + p^2} + \sqrt{b^2 + p^2}$

(D) $\sqrt{a^2 - p^2} + \sqrt{b^2 - p^2}$



આકૃતિ 9.38

ઉકેલ : અહીં, આપેલાં વર્તુળો $x^2 + y^2 = a^2$ અને $x^2 + y^2 = b^2$ સમકેન્દ્રીય વર્તુળો છે. તેમનું કેન્દ્ર $(0, 0)$ છે.

ધારો કે ઊગમબિંદુથી આપેલી રેખાનું લંબઅંતર $OL = p$ જ્યાં $a > b$

$\therefore \Delta OLA$ કાટકોણ ત્રિકોણ છે.

$$\therefore OL^2 + AL^2 = OA^2$$

$$\therefore AL = \sqrt{OA^2 - OL^2} = \sqrt{a^2 - p^2}$$

$$\text{તે જ રીતે } PL = \sqrt{OP^2 - OL^2} = \sqrt{b^2 - p^2}$$

$$\therefore AP = AL - PL$$

$$\therefore AP = \sqrt{a^2 - p^2} - \sqrt{b^2 - p^2}$$

જવાબ : (B)

(43) બિંદુ $P(2, 5)$ માંથી દોરેલી રેખા વર્તુળ $x^2 + y^2 = 16$ ને A અને B બિંદુઓમાં છેદે, તો $PA \cdot PB = \dots\dots$

(A) 11

(B) 12

(C) 10

(D) 13

ઉકેલ : આપણે જાણીએ છીએ કે $PA \cdot PB = PT^2$ જ્યાં $PT =$ સ્પર્શકની લંબાઈ છે.

$$\therefore PA \cdot PB = (2)^2 + (5)^2 - 16 = 13$$

જવાબ : (D)

(44) બિંદુ $(2, 3)$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 - 8x - 10y + k = 0$ ની અંદર આવેલ હોય અને વર્તુળ યામાક્ષોને છેદતું કે સ્પર્શતું ન હોય તો $\dots\dots$


(A) $25 < k < 40$

(B) $25 < k < 33$

(C) $16 < k < 25$

(D) $25 < k < 40$

ઉકેલ :



આકૃતિ 9.39

આપેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર $= (4, 5)$ તથા ત્રિજ્યા $= \sqrt{16 + 25 - k}$

અહીં વર્તુળ યામાક્ષોને સ્પર્શતું કે છેદતું નથી.

વર્તુળના કેન્દ્રના x -યામ અને y -યામ ત્રિજ્યા કરતાં મોટા થશે.

$$\therefore 4 > \sqrt{16+25-k} \quad \text{અને} \quad 5 > \sqrt{16+25-k}$$

$$\therefore k > 25 \quad \text{અને} \quad k > 16$$

વળી, બિંદુ $(2, 3)$ એ વર્તુળ $x^2 + y^2 - 8x - 10y + k = 0$ ની અંદર આવેલ છે.

$$\therefore 4+9-16-30+k < 0 \quad \Rightarrow \quad k < 33$$

$$\therefore 25 < k < 33$$

જવાબ : (B)


- (45) ΔPQR એ વર્તુળ $x^2 + y^2 = 25$ ની અંદર આવેલો છે. જો Q અને R ના યામો અનુક્રમે $(3, 4)$ અને $(-4, 3)$ હોય, તો $m \angle QPR = \dots\dots$

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{6}$



ઉકેલ : આપણે જાણીએ છીએ કે, $m \angle QPR = \frac{1}{2} m \angle QOR$, જ્યાં O એ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે.

ધારો કે, $m_1 = \overline{OQ}$ નો ઢાળ $= \frac{4}{3}$ અને $m_2 = \overline{OR}$ નો ઢાળ $= -\frac{3}{4}$

$$\therefore m_1 m_2 = -1$$

$$m \angle QOR = \frac{\pi}{2} \quad \text{આથી,} \quad m \angle QPR = \frac{\pi}{4}$$

જવાબ : (C)

- (46) વર્તુળ $\sqrt{1+a^2}(x^2 + y^2) - 2bx - 2aby = 0$ ની ત્રિજ્યા $\dots\dots$

(A) $|b|$

(B) $|a|$

(C) ab

(D) $\sqrt{1+a^2}$

$$\text{ઉકેલ : } x^2 + y^2 - \frac{2b}{\sqrt{1+a^2}}x - \frac{2ab}{\sqrt{1+a^2}}y = 0 \quad \text{પરથી} \quad g = \frac{-b}{\sqrt{1+a^2}}, \quad f = \frac{-ab}{\sqrt{1+a^2}}, \quad c = 0$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ત્રિજ્યા } = \sqrt{\frac{b^2}{1+a^2} + \frac{a^2b^2}{1+a^2}} = \sqrt{\frac{b^2(1+a^2)}{1+a^2}} = |b|$$

જવાબ : (A)

- (47) (h, k) કેન્દ્રવાળા વર્તુળોનો સમુદાય $(-1, 1)$ માંથી પસાર થતો હોય અને X -અક્ષ તેના સ્પર્શકો હોય, તો k ની કિંમતોનો ગણ $\dots\dots$

(A) $-\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{1}{2}$

(B) $k \leq \frac{1}{2}$

(C) $0 \leq k \leq \frac{1}{2}$

(D) $k \geq \frac{1}{2}$

ઉકેલ : (h, k) કેન્દ્રવાળા X -અક્ષને સ્પર્શતા વર્તુળનું સમીકરણ $(x-h)^2 + (y-k)^2 = k^2$ છે.

વર્તુળ $(-1, 1)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore (-1-h)^2 + (1-k)^2 = k^2$$

h માં દ્વિઘાત સમીકરણ $h^2 + 2h - 2k + 2 = 0$ ના વાસ્તવિક બીજ h માટે $\Delta \geq 0$

$$\therefore 4 - 4(1)(-2k + 2) \geq 0$$

$$\therefore 2k - 1 \geq 0$$

$$\therefore k \geq \frac{1}{2}$$

જવાબ : (D)

- (48) $\frac{5}{2}$ એકમ ત્રિજ્યા ધરાવતાં વર્તુળ પર બિંદુ $P(-3, 4)$ માંથી દોરેલા સ્પર્શકો $\overline{PQ}$ અને $\overline{PR}$ હોય તથા ΔPQR નું પરિકેન્દ્ર $(1, 3)$ હોય, તો તે વર્તુળનું સમીકરણ

(A) $4x^2 + 4y^2 - 40x + 16y + 91 = 0$

(B) $4x^2 + 4y^2 - 40x - 16y - 91 = 0$

(C) $4x^2 + 4y^2 + 40x - 16y + 91 = 0$

(D) $4x^2 + 4y^2 - 40x - 16y + 91 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે માંગેલ વર્તુળનું કેન્દ્ર $C(h, k)$ અને ત્રિજ્યા r છે. તે ΔPQR નું પરિવૃત્ત એ કેન્દ્ર (h, k) માંથી પસાર થાય છે. (એ $\overline{CP}$ વ્યાસવાળું વર્તુળ છે.)

$$m \angle PQC = m \angle PRC = \frac{\pi}{2}$$


$\overline{PC}$ વ્યાસ છે.

$\therefore \overline{PC}$ નું મધ્યબિંદુ એ ΔPQR નું પરિકેન્દ્ર થશે.

$$\therefore (1, 3) = \left(\frac{-3+h}{2}, \frac{4+k}{2} \right)$$

$$h = 5, \quad k = 2$$

આથી, વર્તુળનું કેન્દ્ર $C(5, 2)$



આકૃતિ 9.41

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } (x-5)^2 + (y-2)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - 4y + 29 - \frac{25}{4} = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - 4y + \frac{91}{4} = 0$$

$$\therefore 4x^2 + 4y^2 - 40x - 16y + 91 = 0$$

જવાબ : (D)

- (49) સમીકરણ $(ex - \pi y)^2 + (\pi x + ey)^2 = \pi^2 - e^2$ એ દર્શાવે છે.

(A) રેખા

(B) વર્તુળ

(C) પરવલય

(D) ઉપવલય

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણ, $e^2x^2 - 2e\pi xy + \pi^2y^2 + \pi^2x^2 + 2e\pi xy + e^2y^2 = \pi^2 - e^2$

$$\therefore (e^2 + \pi^2)x^2 + (e^2 + \pi^2)y^2 = \pi^2 - e^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = \left(\sqrt{\frac{\pi^2 - e^2}{\pi^2 + e^2}} \right)^2 \quad \text{જ્યાં } \frac{\pi^2 - e^2}{\pi^2 + e^2} > 0 \quad \text{છે જ.}$$

$\therefore$ આપેલ સમીકરણ વર્તુળ દર્શાવે છે.

જવાબ : (B)


- (50) બિંદુ $P(1, 8)$ માંથી વર્તુળ $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ ને દોરેલા સ્પર્શકો વર્તુળને A અને B બિંદુ આગળ સ્પર્શે છે, તો ΔPAB ના બધા જ શિરોબિંદુઓમાંથી પસાર થતા વર્તુળનું સમીકરણ (પરિવૃત્તનું સમીકરણ)

(A) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 19 = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 4x - 10y + 19 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 29 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 19 = 0$



ઉકેલ : $\overline{CP}$ વ્યાસવાળું વર્તુળ માંગેલ વર્તુળ થાય, કારણ કે,

$$m \angle PAC = m \angle PBC = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore (x-3)(x-1) + (y-2)(y-8) = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 4x - 10y + 19 = 0$$

જવાબ : (B)

- (51) પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિમાંથી પસાર થતા પરવલયને સ્પર્શતાં મહત્તમ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ


($a > 0$)

(A) $x^2 + y^2 + 10ax + 3a^2 = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 10ax + 9a^2 = 0$

(C) $2x^2 + 2y^2 + 10ax + 9a^2 = 0$

(D) $2x^2 + 2y^2 - 10ax + 9a^2 = 0$



ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિ $S(a, 0)$ છે.

ધારો કે માંગેલ વર્તુળની ત્રિજ્યા r છે.

$\therefore$ તેનું કેન્દ્ર $C(a+r, 0)$ થશે.

$$\therefore \text{વર્તુળનું સમીકરણ } (x-a-r)^2 + y^2 = r^2$$

આ વર્તુળના પરવલય સાથે છેદબિંદુ માટે,

$$\therefore x^2 + a^2 + r^2 - 2ax + 2ar - 2rx + 4ax = r^2$$

$$\therefore x^2 + a^2 + 2ax - 2rx + 2ar = 0$$

$$\therefore x^2 + (2a-2r)x + 2ar + a^2 = 0$$

દ્વિઘાત સમીકરણ માટે $\Delta = 0$ હોય, તો વર્તુળ પરવલયને સ્પર્શે.

$$(2a-2r)^2 - 4(1)(2ar+a^2) = 0$$

$$\therefore 4(a^2 - 2ar + r^2) - 8ar - 4a^2 = 0$$

$$\therefore r^2 = 4ar. \text{ અર્થાત્, } r = 4a$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું કેન્દ્ર} = (5a, 0) \text{ અને ત્રિજ્યા } r = 4a$$

$$\therefore \text{માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ } (x-5a)^2 + (y-0)^2 = 16a^2$$

$$\therefore x^2 - 10ax + 25a^2 + y^2 - 16a^2 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10ax + 9a^2 = 0$$

જવાબ : (B)

- (52) જો P એ પરવલય $y^2 = 3(2x-3)$ પરનું કોઈ પણ બિંદુ હોય તથા M બિંદુ Pમાંથી પરવલયની નિયામિકા પરનો લંબપાદ હોય અને S પરવલયનું નાભિ હોય, તો સમબાજુ ત્રિકોણ SMPની દરેક બાજુની લંબાઈ =


(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 12

ઉકેલ :



આકૃતિ 9.44

અહીં, પરવલય $y^2 = 3(2x-3)$ પરથી,

$$y^2 = 6\left(x - \frac{3}{2}\right) \text{ અર્થાત્ } (y-0)^2 = 6\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

ઊગમબિંદુનું $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ આગળ સ્થાનાંતર લેતાં,

$$x' = x - \frac{3}{2},$$

$$y' = y - 0$$

∴ આપેલ પરવલય $y'^2 = 6x'$ થશે. તેને $y'^2 = 4ax'$ સાથે સરખવતાં, $a = \frac{3}{2}$

∴ આ પરવલયની નિયામિકા $x' = -a$ પરથી, $x - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$ એટલે કે $x = 0$

હવે, P ની યામ = $(a + at^2, 2at) = (\frac{3}{2} + \frac{3}{2}t^2, 3t)$ તથા બિંદુ P માંથી નિયામિકા પરનો લંબપાદ $M(0, 3t)$ થશે.

નાભિ માટે, $x - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$, $y - 0 = 0$ એટલે કે $x = 3$, $y = 0$

∴ નાભિ $S(3, 0)$ થશે.

$$\therefore SM = \sqrt{9 + 9t^2}, PM = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}t^2$$

$$\therefore SM^2 = PM^2 \Rightarrow 9 + 9t^2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}t^2\right)^2$$

$$\Rightarrow 4(1 + t^2) = (1 + t^2)^2 \Rightarrow 1 + t^2 = 4 \Rightarrow t^2 = 3$$

$$\therefore SM = \sqrt{9(1 + t^2)} = \sqrt{9 \times 4} = 6. \quad PM = \frac{3}{2}(1 + t^2) = \frac{3}{2}(4) = 6$$

$$\therefore SP^2 = \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{3}{2}\right)^2 + 9t^2 = 9 + 27 = 36$$

આથી, $SP = 6$

(નોંધ : $SP = PM$ હોય જ.)

જવાબ : (B)

- (53) પરવલય $y^2 = 12x$ ની નાભિજીવા તેના અક્ષ સાથે α માપનો ખૂણો બનાવે છે, જ્યાં $\alpha \in (0, \frac{\pi}{3})$. નાનામાં નાની નાભિજીવાની લંબાઈ =

(A) 12

(B) 24

(C) 16

(D) 32

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 12x$ પરથી $a = 3$

$$\therefore \text{નાભિજીવાની લંબાઈ} = 4|a|\operatorname{cosec}^2\alpha = 12\operatorname{cosec}^2\alpha$$

$(0, \frac{\pi}{3})$ માં $\operatorname{cosec}\alpha$ ઘટતું વિધેય છે. તેથી $\alpha = \frac{\pi}{3}$ માટે $\operatorname{cosec}\alpha$ ની ન્યૂનતમ કિંમત મળે.

$$\therefore \text{નાભિજીવાની ન્યૂનતમ લંબાઈ} = 12\operatorname{cosec}^2\frac{\pi}{3} = 16$$

જવાબ : (C)


- (54) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના શીર્ષમાંથી દોરેલી તમામ જીવાઓના મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ

(A) $y^2 = ax$

(B) $y^2 = 3ax$

(C) $y^2 = 2ax$

(D) $y^2 = 4ax$



આકૃતિ 9.45

ઉકેલ : ધારો કે પરવલય $y^2 = 4ax$ ના શીર્ષ $O(0,0)$ માંથી દોરેલી જીવા $\overline{OP}$ નું મધ્યબિંદુ $M(h,k)$ છે.

$\therefore$ P ના યામ $= (2h, 2k)$ થશે. તે પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનું બિંદુ છે.

$$\therefore 4k^2 = 8ha$$

$$\therefore k^2 = 2ha$$

વ્યાપક રીતે મધ્યબિંદુ (x, y) લઈએ, તો મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ $y^2 = 2ax$ જવાબ : (C)

(55) જો પરવલય $y^2 = -4x$ ના અભિલંબનું સમીકરણ $3x + 2y + p = 0$ હોય, તો $p = \dots\dots$

(A) $\frac{51}{4}$ (B) $\frac{49}{4}$ (C) $\frac{-51}{4}$ (D) $\frac{-49}{4}$

ઉકેલ : અહીં $3x + 2y + p = 0$ પરથી $y = -\frac{3}{2}x - \frac{p}{2}$

$$\therefore m = \frac{-3}{2}, \quad c = \frac{-p}{2}$$

પરવલય $y^2 = -4x$ પરથી $a = -1$

હવે, રેખા $y = \frac{-3}{2}x - \frac{p}{2}$ એ પરવલય $y^2 = -4x$ નો અભિલંબ હોય, તો $c = -2am - am^3$

$$\therefore \frac{-p}{2} = -2(-1)\left(\frac{-3}{2}\right) + \left(\frac{-27}{8}\right)$$

$$\therefore \frac{-8p}{2} = -24 - 27. \text{ આથી } p = \frac{51}{4} \quad \text{જવાબ : (A)}$$

બીજી રીત : $y^2 = -4x$ ના અભિલંબનો ઢાળ $= \frac{-3}{2}$. આથી, તેના સ્પર્શકનો ઢાળ $= \frac{2}{3}$.

$$2y \frac{dy}{dx} = -4$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-2}{y}$$

$$\frac{-2}{y} = \frac{2}{3} \text{ આથી } y = -3$$

$$y = -3, \quad y^2 = -4x \text{ માં મૂકતાં } x = \frac{-9}{4}$$

$$\text{અભિલંબના સમીકરણમાં મૂકતાં } \frac{-27}{4} - 6 + p = 0$$

$$\therefore p = 6 + \frac{27}{4} = \frac{51}{4}$$

(56) બિંદુ $(15, 12)$ માંથી પરવલય $y^2 = 4x$ ને ત્રણ અભિલંબો દોરવામાં આવે, તો આ અભિલંબના પાદબિંદુથી રચાતા ત્રિકોણનું પરિકેન્દ્ર $= \dots\dots$

(A) $\left(\frac{17}{3}, 3\right)$ (B) $\left(\frac{17}{2}, 2\right)$ (C) $\left(\frac{17}{2}, 3\right)$ (D) $\left(\frac{17}{3}, 2\right)$

ઉકેલ : $y^2 = 4x$ પરથી $a = 1$

$\therefore$ પરવલયના t બિંદુ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ

$$y = -tx + 2t + t^3 \quad (a=1)$$

વળી, અભિલંબ (15,12) બિંદુમાંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 12 = -15t + 2t + t^3$$

$$\therefore t^3 - 13t - 12 = 0$$

$$(t+1)(t^2 - t - 12) = 0. \text{ અર્થાત્, } (t+1)(t+3)(t-4) = 0$$

$$\therefore t = -1, t = 4, t = -3$$

અભિલંબથી રચાતા ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ,

$$t = -1 \Rightarrow (at^2, 2at) = A(1, -2), \quad t = 4 \Rightarrow B(16, 8), \quad t = -3 \Rightarrow C(9, -6)$$

ΔABC નું પરિકેન્દ્ર $P(x, y)$ હોય, તો $PA = PB = PC$

$PA^2 = PB^2$	$PA^2 = PC^2$
$(x-1)^2 + (y+2)^2 = (x-16)^2 + (y-8)^2$	$(x-1)^2 + (y+2)^2 = (x-9)^2 + (y+6)^2$
$\therefore -2x + 1 + 4y + 4 = -32x + 256 - 16y + 64$	$\therefore -2x + 1 + 4y + 4 = -18x + 81 + 12y + 36$
$\therefore 30x + 20y - 315 = 0$	$\therefore 16x - 8y - 112 = 0$
$\therefore 6x + 4y - 63 = 0$	$\therefore 2x - y - 14 = 0$

સમીકરણો $6x + 4y - 63 = 0$ અને $2x - y - 14 = 0$ ઉકેલતાં $\left(\frac{17}{2}, 3\right)$ મળે

$$\therefore \text{પરિકેન્દ્ર } P\left(\frac{17}{2}, 3\right)$$

જવાબ : (C)

(57) પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિજવાઓનાં મધ્યબિંદુઓના બિંદુગણનું સમીકરણ =

$$(A) \quad y^2 = 2a(x-a) \quad (B) \quad y^2 = a(x-a) \quad (C) \quad y^2 = 2a(y-a) \quad (D) \quad y^2 = 2a(2x-a)$$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિજવાઓનાં અંત્યબિંદુઓ $P(at^2, 2at)$ તથા $Q\left(\frac{a}{t^2}, \frac{-2a}{t}\right)$ થાય.

$$\therefore \text{નાભિજવા } \overline{PQ} \text{ નું મધ્યબિંદુ } M = \left(\frac{at^2 + \frac{a}{t^2}}{2}, \frac{2at - \frac{2a}{t}}{2} \right) = \left(\frac{a}{2} \left(t^2 + \frac{1}{t^2} \right), a \left(t - \frac{1}{t} \right) \right)$$

$$\therefore x = \frac{a}{2} \left(t^2 + \frac{1}{t^2} \right) \quad \text{અને} \quad y = a \left(t - \frac{1}{t} \right)$$

$$\text{હવે } \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 = t^2 + \frac{1}{t^2} - 2$$

$$\therefore \left(\frac{y}{a}\right)^2 = \frac{2x}{a} - 2$$

$$\therefore y^2 = 2a(x-a)$$

જવાબ : (A)

(58) ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતાં તથા પરવલય $y^2 = 4x$ પરના બિંદુ $(1, 2)$ આગળ પરવલયને સ્પર્શતા વર્તુળની ત્રિજ્યા =

(A) $\frac{5\sqrt{5}}{3}$

(B) $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4x$ ના બિંદુ $(1, 2)$ પરના અભિલંબનું સમીકરણ $y - 2 = \frac{-2}{2}(x - 1)$, $(y - y_1 = \frac{-y_1}{2a}(x - x_1))$

$$\therefore y - 2 = -x + 1$$

$$\therefore x + y - 3 = 0$$

(1)

ધારો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર (a, b) છે.

$$\therefore a + b - 3 = 0$$

(વર્તુળનું કેન્દ્ર અભિલંબ પર હોય) (1) પરથી (2)

અહીં વર્તુળનું કેન્દ્ર (a, b) છે તથા વર્તુળ $(0, 0)$ તથા $(1, 2)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore a^2 + b^2 = (a-1)^2 + (b-2)^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = a^2 + b^2 - 2a - 4b + 5$$

$$\therefore 2a + 4b - 5 = 0$$

(3)

(2) અને (3) ઉકેલતાં, $a = \frac{7}{2}$, $b = \frac{-1}{2}$

$$\therefore \text{માંગેલ ત્રિજ્યા} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

જવાબ : (D)

(59) વર્તુળ $x^2 + y^2 = 2a^2$ અને પરવલય $y^2 = 8ax$ ના સામાન્ય સ્પર્શકોનાં સમીકરણ

(A) $x = \pm(y + 2a)$

(B) $x = \pm(y + a)$

(C) $y = \pm(x + a)$

(D) $y = \pm(x + 2a)$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ના કોઈ પણ સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx + \frac{a}{m}$ છે. અહીં પરવલય $y^2 = 8ax$ હોવાથી,

$$m \text{ ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = mx + \frac{2a}{m}$$

વળી તે સ્પર્શક વર્તુળ $x^2 + y^2 = 2a^2$ નો પણ સ્પર્શક છે.

$$\therefore c^2 = a^2(1 + m^2) \text{ પરથી, } \frac{4a^2}{m^2} = 2a^2(1 + m^2)$$

$$\therefore m^4 + m^2 - 2 = 0$$

$$\therefore (m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0$$

હવે $m^2 = -2$ શક્ય નથી.

$$\therefore m^2 = 1 \quad \text{આથી, } m = \pm 1$$

$$\therefore \text{ માંગેલ સ્પર્શકોનાં સમીકરણ } y = \pm (x + 2a)$$

બીજી રીત :

વર્તુળના કેન્દ્ર $O(0, 0)$ થી સામાન્ય સ્પર્શકનું લંબઅંતર = ત્રિજ્યા

$$\therefore \frac{\left| \frac{2a}{m} \right|}{\sqrt{1+m^2}} = \sqrt{2} a$$

$$\therefore \frac{2a}{m} = \pm \sqrt{2} a \left(\sqrt{1+m^2} \right)$$

$$\therefore \frac{4a^2}{m^2} = 2a^2 (1+m^2)$$

$$\therefore m^4 + m^2 - 2 = 0$$

$$\therefore (m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0$$

$$\therefore m = \pm 1$$

$$\therefore \text{ માંગેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = \pm (x + 2a)$$

જવાબ : (D)

(60) પરવલય $y^2 = 8x$ અને વક્ર $xy = -1$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ =

$$(A) \quad y = 2x + 1 \quad (B) \quad y = x + 2 \quad (C) \quad 2y = x + 2 \quad (D) \quad y = 2x + 2$$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 8x$ પરથી $4a = 8$. આથી, $a = 2$

$$\therefore \text{ પરવલયના કોઈ પણ સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = mx + \frac{2}{m}$$

વળી, તે $xy = -1$ નો પણ સ્પર્શક હોવાથી, $x\left(mx + \frac{2}{m}\right) = -1$ નાં સમાન બીજ મળે.

$$\therefore mx^2 + \frac{2}{m}x + 1 = 0 \quad \text{નાં સમાન બીજ મળે. આથી, } \Delta = 0.$$

$$\therefore \left(\frac{2}{m}\right)^2 - 4(m)(1) = 0$$

$$\therefore \frac{4}{m^2} = 4m$$

$$\therefore m^3 = 1$$


$$\text{આથી, } m = 1$$

$$\therefore \text{ સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = mx + \frac{2}{m} = x + 2$$

જવાબ : (B)

(61) પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ P માંથી નિયામિકા પરનો લંબપાદ M છે. S નાભિ છે. જો ΔSPM સમબાજુ ત્રિકોણ હોય, તો તેનું ક્ષેત્રફળ

$$(A) \quad 4\sqrt{3} a^2 \quad (B) \quad 8\sqrt{3} a^2 \quad (C) \quad 12\sqrt{3} a^2 \quad (D) \quad \text{એક પણ નહિ.}$$



આકૃતિ 9.46

ઉકેલ : અહીં, પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ $P(at^2, 2at)$ માંથી નિયામિકા $x = -a$ પરનો લંબપાદ M છે.

$\therefore M(-a, 2at)$ મળે. $N(-a, 0)$ છે.

$$MN = 2at, \quad NS = 2a$$

$$\therefore \Delta MNS \text{ માં } \tan 30^\circ = \frac{NS}{MN}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2a}{2at}. \quad \text{અર્થાત્, } t = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta SPM \text{ નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{\sqrt{3}}{4} (SP)^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (at^2 + a)^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times 16 \\ &= 4\sqrt{3}a^2 \end{aligned}$$

જવાબ : (A)


(62) પરવલય $y^2 = 36x$ પરના સ્પર્શકનું સ્પર્શબિંદુ અને તેની નાભિમાંથી સ્પર્શક પર દોરેલ લંબના લંબપાદને જોડતા રેખાખંડનાં મધ્યબિંદુઓનો બિંદુગણ શાંકવ હોય, તો આવા શાંકવના નાભિલંબની લંબાઈ થાય.

(A) $\frac{81}{4}$

(B) 81

(C) $\frac{81}{3}$

(D) $\frac{81}{2}$



આકૃતિ 9.47

ઉકેલ : ધારો કે પરવલય $y^2 = 36x$ પરના સ્પર્શકનું સ્પર્શબિંદુ $P(9t^2, 18t)$ છે. નાભિમાંથી સ્પર્શક પર દોરેલ લંબપાદ $T(0, 9t)$ છે.

ધારો કે $\overline{PT}$ નું મધ્યબિંદુ $Q(x_1, y_1)$ છે.

$$\therefore (x_1, y_1) = \left(\frac{9t^2}{2}, \frac{27t}{2} \right) \text{ અર્થાત્, } x_1 = \frac{9t^2}{2}, y_1 = \frac{27t}{2}$$

$$\therefore x_1 = \frac{9}{2} \times \frac{4y_1^2}{(27)^2} = \frac{2y_1^2}{81}$$

$$\therefore y_1^2 = \frac{81x_1}{2}$$

$$\therefore \text{વ્યાપક રીતે મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ } y^2 = \frac{81}{2}x$$

$$\therefore \text{માંગેલ નાભિલંબની લંબાઈ} = \frac{81}{2}$$

જવાબ : (D)

(63) પરવલય $y^2 - 6x - 6y + 4 = 0$ નું નાભિ =

(A) $\left(\frac{2}{3}, 3 \right)$

(B) $\left(\frac{4}{3}, 3 \right)$

(C) $\left(\frac{-2}{3}, -3 \right)$

(D) $\left(\frac{-4}{3}, \frac{2}{3} \right)$

ઉકેલ : અહીં, $y^2 - 6x - 6y + 4 = 0$

$$\therefore y^2 - 6y + 9 - 6x - 5 = 0$$

$$\therefore (y-3)^2 = 6\left(x+\frac{5}{6}\right) \quad (1)$$

$\therefore$ ઊગમબિંદુ $O(0,0)$ નું સ્થાનાંતર $\left(\frac{-5}{6}, 3 \right)$ આગળ કરવામાં આવે, તો

$$x' = x - h \text{ અને } y' = y - k \text{ પરથી, } x' = x + \frac{5}{6} \quad y' = y - 3$$

$$\therefore (1) \text{ પરથી, } y'^2 = 6x'. \text{ તેને } y'^2 = 4ax' \text{ સાથે સરખાવતાં, } 4a = 6 \text{ અર્થાત્, } a = \frac{3}{2}$$

$$\therefore y'^2 = 6x' \text{ નું નાભિ } S(a, 0) = S\left(\frac{3}{2}, 0\right) = (x'y')$$

$$\text{હવે, } x' = x + \frac{5}{6} \text{ અને } y' = y - 3 \text{ પરથી, } \frac{3}{2} = x + \frac{5}{6} \text{ અને } 0 = y - 3$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} \text{ અને } y = 3$$

$$\therefore \text{આપેલ પરવલયનું નાભિ } \left(\frac{2}{3}, 3 \right) \text{ મળે.}$$

જવાબ : (A)

(64) પરવલય $y^2 = 4x$ અને $x^2 = 4y$ ના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ

(A) $x - y + 1 = 0$

(B) $x + y + 1 = 0$

(C) $x + y - 1 = 0$

(D) $x - y - 1 = 0$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4x$ પરથી, $4a = 4$ અર્થાત્, $a = 1$

$$x^2 = 4y \text{ પરથી, } 4b = 4 \text{ અર્થાત્, } b = 1$$

$\therefore$ બંને પરવલયોના સામાન્ય સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$\frac{1}{a^3}x + \frac{1}{b^3}y + (ab)^{\frac{2}{3}} = 0 \text{ પરથી, } x + y + 1 = 0$$

જવાબ : (B)

(65) પરવલય $y^2 = 7x$ ની નાભિજીવા X-અક્ષની ધન દિશા સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો ખૂણો બનાવે, તો નાભિજીવાની લંબાઈ

- (A) $\frac{28}{3}$ (B) $\frac{18}{3}$ (C) $\frac{7}{3}$ (D) $\frac{14}{3}$

ઉકેલ : અહીં $a = \frac{7}{4}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$

$$\therefore \text{નાભિજીવાની લંબાઈ} = 4|a| \operatorname{cosec}^2 \theta$$

$$= 4 \times \frac{7}{4} \times \operatorname{cosec}^2 \frac{\pi}{3} = 7 \times \frac{4}{3} = \frac{28}{3}$$

જવાબ : (A)

(66) પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ P આગળનો સ્પર્શક પરવલય $x^2 = 4by$ ને સ્પર્શે છે, તો બિંદુ P ના બિંદુગણનું સમીકરણ =

- (A) $y = 2x^2$ (B) $xy = -2ab$ (C) $x^2 + y^2 = 16$ (D) $x^2 = 4y$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ $P(x_1, y_1)$ આગળનો સ્પર્શક, $yy_1 = 2a(x + x_1)$ છે અને પરવલય $x^2 = 4by$ છે.

$$\text{છેદબિંદુ માટે } x^2 = 4b \left(\frac{2a}{y_1} (x + x_1) \right)$$

$$\therefore y_1 x^2 - 8abx - 8abx_1 = 0$$

આ જીવા $x^2 = 4by$ નો સ્પર્શક હોવાથી $\Delta = 0$

$$\therefore 64a^2b^2 - 4(y_1)(-8abx_1) = 0$$

$$\therefore -2ab = x_1 y_1$$


$$\therefore \text{વ્યાપક રીતે બિંદુગણનું સમીકરણ } xy = -2ab$$

જવાબ : (B)

(67) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના નાભિલંબને વ્યાસ લઈ દોરેલ વર્તુળનું સમીકરણ ($a > 0$)

- (A) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + 3a^2 = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + 3a^2 = 0$

- (C) $x^2 + y^2 - 2ax - 3a^2 = 0$ (D) $x^2 + y^2 + 2by - 3a^2 = 0$



આકૃતિ 9.48

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ નું નાભિ $(a, 0)$ અને નાભિલંબની લંબાઈ $4a$, $(a > 0)$

$\therefore$ વર્તુળનો વ્યાસ $4a$ અને તેથી વર્તુળની ત્રિજ્યા $= 2a$

$(a, 0)$ કેન્દ્રવાળા તથા $2a$ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(x-a)^2 + (y-0)^2 = 4a^2$$

$$\therefore x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 4a^2 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2ax - 3a^2 = 0$$

જવાબ : (C)

(68) જેનું નાભિ $(-1, 4)$ હોય તથા નિયામિકા $3x + y - 1 = 0$ હોય તેવા પરવલયનું સમીકરણ

(A) $x^2 + 9y^2 - 6xy + 26x + 78y - 169 = 0$ (B) $9x^2 + y^2 - 6xy + 26x - 78y + 169 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6xy + 26x + 78y + 169 = 0$ (D) $x^2 + 9y^2 - 6xy + 26x - 78y + 169 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે પરવલય પરનું બિંદુ $P(x, y)$ તથા નાભિ $S(-1, 4)$ તથા નિયામિકા $l : 3x + y - 1 = 0$ છે તથા બિંદુ P માંથી નિયામિકા l પરનો લંબપાદ M છે.

$$\therefore SP = PM$$

$$SP^2 = PM^2$$

$$\therefore (x+1)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{3x+y-1}{\sqrt{9+1}} \right)^2$$

$$\therefore x^2 + 2x + 1 + y^2 - 8y + 16 = \frac{(3x+y-1)^2}{10}$$

$$\therefore 10x^2 + 10y^2 + 20x - 80y + 170 = 9x^2 + y^2 + 1 + 6xy - 2y - 6x$$

$$\therefore x^2 + 9y^2 - 6xy + 26x - 78y + 169 = 0$$

જવાબ : (D)


(69) એક પરવલયાકાર પરાવર્તકનો આડછેદ આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે. નાભિ પાસે મુખ $\overline{AB}$ ની પહોળાઈ 10 સેમી છે. શિરોબિંદુથી 11 સેમી દૂર આવેલ મુખ $\overline{PQ}$ ની પહોળાઈ થાય.

(A) $8\sqrt{110}$

(B) $4\sqrt{110}$

(C) $2\sqrt{110}$

(D) $\sqrt{110}$



આકૃતિ 9.49

ઉકેલ : પરવલય પરાવર્તકના નાભિ આગળ મુખ $\overline{AB}$ ની પહોળાઈ 10 સેમી છે.

$$\therefore 4a = 10 \text{ સેમી}$$

$$\therefore \text{પરવલયનું સમીકરણ } y^2 = 10x \text{ થશે.}$$

હવે, શિરોબિંદુથી 11 સેમી દૂર આવેલ મુખ માટે x -યામ = 11

$$\therefore y^2 = 10 \times 11 = 110$$

$$\therefore y = \pm \sqrt{110}$$

$$\therefore P(11, \sqrt{110}), Q(11, -\sqrt{110}) \text{ થશે. આથી, } PQ = 2\sqrt{110}$$

જવાબ : (C)

(70) પરવલયના શીર્ષ આગળનો સ્પર્શક, નિયામિકા તથા નાભિલંબ વચ્ચેના રેખાખંડનું ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે.

(A) 1 : 2

(B) 1 : 1

(C) 2 : 1

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ના શીર્ષ આગળનો સ્પર્શક Y-અક્ષ થશે. તેથી ઊગમબિંદુથી પરવલયની નિયામિકા સુધીનું અંતર અને ઊગમબિંદુથી નાભિલંબ સુધીનું અંતર સમાન થાય. તેથી નિયામિકા અને નાભિલંબને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ ઊગમબિંદુ (પરવલયનું શીર્ષ) થશે.

$\therefore$ પરવલયનું શીર્ષ તે રેખાખંડનું 1 : 1ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે.

જવાબ : (B)

(71) પરવલય $y^2 = 16x$ ને (3, 9)માંથી દોરેલા સ્પર્શકોના ઢાળ m_1 અને m_2 હોય તો $\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} = \dots\dots$

(A) $\frac{9}{4}$

(B) $\frac{10}{9}$

(C) $\frac{19}{2}$

(D) $\frac{9}{2}$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 16x$ માં (3, 9) લેતાં $9^2 - 16(3) = 81 - 48 > 0$

$\therefore$ (3, 9)માંથી આપેલા પરવલયને બે સ્પર્શકો દોરી શકાય.

$$\therefore \text{પરવલય } y^2 = 16x \text{ના } m \text{ ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ } y = mx + \frac{4}{m}$$

$$\text{વળી, તે (3, 9)માંથી પસાર થાય છે. આથી, } 9 = 3m + \frac{4}{m}$$

$$\therefore 3m^2 - 9m + 4 = 0$$

તેનાં બે બીજ m_1 અને m_2 હોય, તો

$$m_1 + m_2 = 3, \quad m_1 m_2 = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} = \frac{3}{\frac{4}{3}} = \frac{9}{4}$$

જવાબ : (A)

(72) પરવલય $y^2 + 4y + x = 0$ નું શિરોબિંદુ ચરણમાં આવેલ છે.

- (A) પ્રથમ (B) દ્વિતીય (C) તૃતીય (D) ચતુર્થ

ઉકેલ : $y^2 + 4y + x = 0$

$$\therefore y^2 + 4y + 4 - 4 + x = 0$$

$$\therefore (y+2)^2 = -(x-4)$$

$\therefore$ પરવલયનું શિરોબિંદુ $(4, -2)$ થશે. તે ચતુર્થ ચરણમાં છે.

જવાબ : (D)

(73) રેખા $y = mx + c$ એ પરવલય $y^2 - 4x - 4 = 0$ ને સ્પર્શે, તો $c \in$

- (A) $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$ (B) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
(C) $(-\infty, -2] \cup (2, \infty)$ (D) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

ઉકેલ : અહીં, $y = mx + c$ અને $y^2 - 4x - 4 = 0$ પરથી, $(mx + c)^2 - 4x - 4 = 0$

$$\therefore m^2x^2 + 2mcx + c^2 - 4x - 4 = 0$$

$$\therefore m^2x^2 + (2mc - 4)x + (c^2 - 4) = 0$$

રેખા એ પરવલયને સ્પર્શે છે, તેથી $\Delta = 0$ લેતાં,

$$(2mc - 4)^2 - 4m^2(c^2 - 4) = 0$$

$$\therefore 4m^2c^2 - 16mc + 16 - 4m^2c^2 + 16m^2 = 0$$

$$\therefore 16m^2 - 16mc + 16 = 0$$

$$\therefore m^2 - mc + 1 = 0$$

દ્વિઘાત સમીકરણ પરથી m વાસ્તવિક સંખ્યા મળે તે માટે, $(-c)^2 - 4(1)(1) \geq 0$

$$\therefore c^2 \geq 4$$

$$\therefore c \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

જવાબ : (D)

(74) બિંદુ $(-6, 12)$ માંથી પરવલય $y^2 = 24x$ પર દોરેલા બે સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ =

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 24x$ ની નિયામિકાનું સમીકરણ $x = -6$

આપેલ બિંદુનો x -યામ $= -6$ હોવાથી આપેલ બિંદુ નિયામિકા પર છે.

$$\therefore \text{સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ} = \frac{\pi}{2}$$

જવાબ : (C)

બીજી રીત : પરવલય $y^2 = 24x$ ના m ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ $y = mx + \frac{6}{m}$

સ્પર્શક $(-6, 12)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 12 = -6m + \frac{6}{m}$$

$$\therefore 12m = -6m^2 + 6$$

$$\therefore m^2 + 2m - 1 = 0$$

$$\therefore \text{બીજનો ગુણકાર } m_1 m_2 = -1$$

$$\therefore \text{બંને સ્પર્શક વચ્ચેના ખૂણાનું માપ } \frac{\pi}{2} \text{ છે.}$$

જવાબ : (C)

(75) પરવલય $(x+3)^2 = 4(y-1)$ ની નિયામિકાનું સમીકરણ થાય.

(A) $x=1$

(B) $x=0$

(C) $y=1$

(D) $y=0$

ઉકેલ : આપેલ પરવલય $(x+3)^2 = 4(y-1)$ છે. ઊગમબિંદુનું સ્થાનાંતર $(-3, 1)$ આગળ લેતાં,

$$x' = x - h, \quad y' = y - k \text{ પરથી, } x' = x + 3 \quad y' = y - 1$$

$$\therefore \text{આપેલ સમીકરણ } x'^2 = 4y' \text{ બને તેને } x'^2 = 4by' \text{ સાથે સરખાવતાં, } 4b = 4. \text{ આથી, } b = 1$$

$$\therefore \text{નિયામિકાનું સમીકરણ } y' = -b \Rightarrow y' = -1$$

$$\therefore y - 1 = -1$$

આથી, $y = 0$ નિયામિકાનું સમીકરણ થાય.

જવાબ : (D)

(76) પરવલય $(y+2)^2 = 4(x-1)$ ના શિરોલંબ સ્પર્શકનું સમીકરણ છે.

(A) $x=0$

(B) $x=1$

(C) $x=-1$

(D) $x=2$

ઉકેલ : $(y+2)^2 = 4(x-1)$ પરવલય આપેલ છે.

ઊગમબિંદુનું સ્થાનાંતર $(1, -2)$ આગળ કરતાં,

$$x' = x - h, \quad y' = y - k \text{ પરથી, } x' = x - 1, \quad y' = y + 2$$

$$\therefore y'^2 = 4x'. \text{ તેનું શિરોબિંદુ } (0, 0) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{આપેલ પરવલયનું શિરોબિંદુ } (1, -2) \text{ છે.}$$

$$\therefore \text{પરવલયના શિરોલંબ સ્પર્શકનું સમીકરણ } x' = 0 \text{ છે. એટલે કે } x - 1 = 0$$

જવાબ : (B)

(77) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના t બિંદુ આગળનો સ્પર્શક X-અક્ષની ધન દિશા સાથે α માપનો ખૂણો બનાવે, તો $t = \dots\dots$

(A) $\tan \alpha$

(B) $\cot \alpha$

(C) $\sin \alpha$

(D) $\cos \alpha$

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ના t બિંદુ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $x - ty + at^2 = 0$

અહીં, સ્પર્શક X-અક્ષની ધન દિશા સાથે α માપનો ખૂણો બનાવે, તો સ્પર્શકનો ઢાળ $= \tan \alpha$

$$\therefore t \text{ બિંદુએ સ્પર્શકનો ઢાળ } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}$$

$$\therefore \frac{1}{t} = \tan \alpha. \text{ આથી } t = \cot \alpha$$

જવાબ : (B)

- (78) પરવલય $y^2 = 4ax$ ની નાભિ $S(a, 0)$ અને નાભિજવા $\overline{PQ}$ હોય, તો $SP, 2a, SQ$ શ્રેણીમાં હોય. $a > 0$
- (A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : અહીં પરવલય $y^2 = 4ax$ અને $\overline{PQ}$ નાભિજવા છે.

$$\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{2}{2a}$$

$$\therefore \frac{1}{SP}, \frac{1}{2a}, \frac{1}{SQ} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore SP, 2a, SQ \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (C)

- (79) પરવલય $y^2 = 16x$ પરના બિંદુ આગળ દોરેલા અભિલંબો અક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવે છે.

- (A) $(4, 8)$ (B) $(-4, 8)$ (C) $(-4, -8)$ (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 16x$ પરથી $a = 4$

અહીં અભિલંબ અક્ષો સાથે સમાન માપનો ખૂણો બનાવે છે. આથી, ઢાળ $= \pm \tan \frac{\pi}{4}$

$$\therefore m = \pm 1$$


પરવલય $y^2 = 16x$ ની m ઢાળવાળા અભિલંબનું પાદબિંદુ $(am^2, -2am)$ હોય.

$$\therefore \text{ માંગેલ બિંદુના યામ } = (4, 8) \text{ અથવા } (4, -8)$$

જવાબ : (A)

- (80) વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2ax = 0$, $a \in R$ એ પરવલય $y^2 = 4x$ ને બહારથી સ્પર્શે, તો

- (A) $a > 0$ (B) $a < 0$ (C) $a = 0$ (D) $a = -1$



આકૃતિ 9.50

ઉકેલ : આપેલ વર્તુળ $x^2 + y^2 + 2ax = 0$

$$\therefore (x+a)^2 + (y-0)^2 = a^2$$

∴ વર્તુળનું કેન્દ્ર $(-a, 0)$, ત્રિજ્યા $= |a|$ થશે. બંનેનો સ્પર્શક અક્ષ Y -છે.

વળી, આપેલ પરવલય $y^2 = 4x$ એ Y -અક્ષની જમણી બાજુ છે.

∴ વર્તુળ પરવલયને બહારથી સ્પર્શે, તો $a > 0$ હોવું જોઈએ.

જવાબ : (A)


(81) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના બે પરસ્પર લંબ સ્પર્શકો હંમેશાં રેખા પર છેદે છે.

(A) $x = -a$

(B) $x = 2a$

(C) $x = -4a$

(D) $x = 3a$



ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ $P(t_1)$ અને $Q(t_2)$ બિંદુઓએ દોરેલા સ્પર્શકોનાં સમીકરણ અનુક્રમે

$$y = \frac{1}{t_1}x + at_1 \quad (1) \quad \text{અને} \quad y = \frac{1}{t_2}x + at_2 \quad (2)$$

હવે, બંને સ્પર્શકો પરસ્પર લંબ હોવાથી $\frac{1}{t_1} \times \frac{1}{t_2} = -1$. આથી, $t_1 t_2 = -1$

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી બંને સ્પર્શકોનું છેદબિંદુ } = (at_1 t_2, a(t_1 + t_2)) = (-a, a(t_1 + t_2))$$

આમ, બંને સ્પર્શકોનાં છેદબિંદુનો x -યામ $= -a$ હોવાથી, બંને સ્પર્શકોનું છેદબિંદુ રેખા $x = -a$ ઉપર છે.

જવાબ : (A)

(82) ધારો કે N એ પરવલય $y^2 = 4ax$ ના બિંદુ $P(t)$ થી X -અક્ષ પરનો લંબપાદ છે તથા X -અક્ષને સમાંતર અને


$\overrightarrow{PN}$ ને દુભાગતી રેખા પરવલયને Q માં મળે છે. જો $\overrightarrow{NQ}$ એ Y -અક્ષને T માં મળે, તો T ના યામ =

(A) $(0, \frac{4}{3}at)$

(B) $(0, 2at)$

(C) $(\frac{at^2}{4}, at)$

(D) $(0, at)$



ઉકેલ : અહીં $P(at^2, 2at)$ આથી, $N(at^2, 0)$

$\therefore \overline{PN}$ નું મધ્યબિંદુ $M(at^2, at)$ છે.

X-અક્ષને સમાંતર માંગેલ રેખાનું સમીકરણ $y = at$ છે.

હવે, $y = at$ અને $y^2 = 4ax$ નું છેદબિંદુ Q છે.

$$\therefore a^2 t^2 = 4ax$$

$$\therefore x = \frac{at^2}{4}. \quad \text{આથી, } Q\left(\frac{at^2}{4}, at\right)$$

ધારો કે T ના યામ $(0, b)$ છે.

અહીં, T, Q, N સમરેખ છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} 0 & b & 1 \\ \frac{at^2}{4} & at & 1 \\ at^2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -b\left(\frac{at^2}{4} - at^2\right) - a^2 t^3 = 0$$

$$\therefore \frac{3bat^2}{4} = a^2 t^3$$

$$\therefore b = \frac{4}{3} at$$

$$\therefore T \text{ ના યામ } \left(0, \frac{4}{3} at\right)$$

જવાબ : (A)

(83) X-અક્ષની ધન દિશા સાથે θ માપનો ખૂણો બનાવતી, પરવલય $y^2 = 4x$ ની નાભિજીવાની લંબાઈ 8 હોય, તો


$$\theta = \dots\dots \left(\text{જ્યાં } 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{2}$



આકૃતિ 9.53

ઉકેલ : અહીં, પરવલય $y^2 = 4x$ માટે $4a = 4$. આથી, $a = 1$

તથા $P(at^2, 2at) = P(t^2, 2t)$, નાભિ $S(a, 0) = S(1, 0)$

નાભિજીવા $\overline{PQ}$. X-અક્ષની ધન દિશા સાથે θ માપનો ખૂણો બનાવે છે.

લંબાઈ $l = 4a \operatorname{cosec}^2 \theta = 8$. આથી $\operatorname{cosec}^2 \theta = 2$ ($a = 1$)

$$\therefore \sin^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$


$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$$

જવાબ : (C)

(84) એક વર્તુળનું કેન્દ્ર, પરવલય $y^2 = 4ax$ ($a > 0$)નું શીર્ષ (શિરોબિંદુ) છે તથા વ્યાસ એ પરવલયના નાભિલંબની

લંબાઈ કરતા $\frac{3}{4}$ ગણો છે. જો $\overleftrightarrow{PQ}$ એ પરવલય અને વર્તુળની સામાન્ય જીવાને સમાવતી રેખા હોય અને $L_1 L_2$ નાભિલંબ હોય, તો સમલંબ ચતુષ્કોણ $PL_1 L_2 Q$ નું ક્ષેત્રફળ =

(A) $\left(\frac{\sqrt{2}+1}{2}\right)a^2$ (B) $\left(\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}}\right)a^2$ (C) $(\sqrt{2}+2)a^2$ (D) $\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}\right)a^2$



આકૃતિ 9.54

ઉકેલ : વર્તુળનું કેન્દ્ર = પરવલય $y^2 = 4ax$ નું શીર્ષ $= (0, 0)$

વર્તુળનો વ્યાસ $= \frac{3}{4} \times$ પરવલય $y^2 = 4ax$ ના નાભિલંબની લંબાઈ

$$\therefore \text{વર્તુળની ત્રિજ્યા} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \times 4a \right) = \frac{3a}{2}$$

$$\therefore \text{વર્તુળનું સમીકરણ } x^2 + y^2 = \frac{9a^2}{4} \quad (1)$$

$$\text{પરવલયનું સમીકરણ } y^2 = 4ax \text{ છે.} \quad (2)$$

P અને Q માટે આ સમીકરણો ઉકેલવા પડે.

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી, } x^2 + 4ax - \frac{9a^2}{4} = 0$$

$$\therefore 4x^2 + 16ax - 9a^2 = 0$$

$$\therefore (2x - a)(2x + 9a) = 0$$

$$\therefore x = \frac{a}{2} \quad \text{કારણ કે } x > 0$$

$$\text{હવે, } y^2 = 4ax = 4a\left(\frac{a}{2}\right) = 2a^2$$

$$\therefore y = \pm \sqrt{2a} \quad \text{છેદબિંદુ } P\left(\frac{a}{2}, \sqrt{2a}\right), \left(\frac{a}{2}, -\sqrt{2a}\right) \text{ બને.}$$

$$\therefore PQ = 2\sqrt{2a}$$

$$\begin{aligned} \therefore PL_1L_2Q &= \frac{1}{2}\left(a - \frac{a}{2}\right)(4a + 2\sqrt{2a}) \quad \{(સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર) (સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો)\} \\ &= \frac{a^2}{4}(4 + 2\sqrt{2}) = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)a^2 = \left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}\right)a^2 \end{aligned} \quad \text{જવાબ : (D)}$$

(85) બિંદુ $P(4, -4)$ અને $Q(9, 6)$ એ પરવલય $y^2 = 4a(x-b)$ પરનાં બિંદુઓ હોય તથા R એ ચાપ PQ પરનું કોઈ બિંદુ હોય, તો બિંદુ R ના યામ હોય ત્યારે ΔPRQ નું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય.

$$(A) \left(\frac{1}{4}, 1\right) \quad (B) \left(-\frac{1}{4}, 0\right) \quad (C) \left(\frac{9}{4}, 4\right) \quad (D) \left(\frac{9}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

ઉકેલ : બિંદુ $(4, -4)$ અને $(9, 6)$ એ પરવલય $y^2 = 4a(x-b)$ પરનાં બિંદુ છે.

$$\therefore 4 = a(4-b)$$

$$\therefore 4a - ab = 4 \quad (1)$$

$$9 = a(9-b)$$

$$\therefore 9a - ab = 9 \quad (2)$$

$$\therefore a = 1 \text{ અને } b = 0 \quad ((1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી})$$

$$\therefore \text{પરવલય } y^2 = 4x \text{ થશે.}$$

અહીં R એ ચાપ PQ પરનું કોઈ બિંદુ છે. ધારો કે $R(t^2, 2t)$

$\therefore \Delta PRQ$ ના ક્ષેત્રફળ માટે,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -4 & 1 \\ 9 & 6 & 1 \\ t^2 & 2t & 1 \end{vmatrix} = 4(6 - 2t) + 4(9 - t^2) + 1(18t - 6t^2)$$

$$= 24 - 8t + 36 - 4t^2 + 18t - 6t^2$$

$$= -(10t^2 - 10t - 60)$$

$$= -10\left(t^2 - t + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 6\right)$$

$$= -10\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{250}{4}$$

બીજી રીત :

$$-10t^2 + 10t + 60 \text{ મહત્તમ થવા માટે}$$

$$t = \frac{-b}{2a} = \frac{-10}{-20} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore R\left(\frac{1}{4}, 1\right).$$

$\therefore$ ત્રિકોણ PRQ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2}|\Delta|$ મહત્તમ માટે $t = \frac{1}{2}$ હોવું જોઈએ.

$\therefore R\left(\frac{1}{4}, 1\right)$ થાય ત્યારે ΔPRQ નું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય.

જવાબ : (A)

(86) X-અક્ષ સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો ખૂણો બનાવતા પરવલય $y^2 = 12x$ ની સ્પર્શકનું સમીકરણ =

(A) $\pm y - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$

(B) $\pm y + \sqrt{3}x + 3 = 0$

(C) $\pm y - \sqrt{3}x - \sqrt{3} = 0$

(D) $\pm y + \sqrt{3}x - 3 = 0$

ઉકેલ : સ્પર્શક X-અક્ષ સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો ખૂણો બનાવે છે.

$$\therefore \text{સ્પર્શકનો ઢાળ } m = \tan \frac{\pi}{3} \text{ અથવા } m = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\therefore m = \sqrt{3} \text{ અથવા } m = -\sqrt{3}$$

વળી, $y^2 = 12x$ પરથી $a = 3$

$$\therefore \text{પરવલયની } m \text{ ઢાળવાળા સ્પર્શકના સમીકરણ } y = mx + \frac{a}{m} \text{ પરથી}$$

$$y = \sqrt{3}x + \sqrt{3} \text{ અથવા } y = -\sqrt{3}x - \sqrt{3}$$

$$\pm y = \sqrt{3}x + \sqrt{3}$$

$$\therefore \pm y - \sqrt{3}x - \sqrt{3} = 0$$

જવાબ : (C)

(87) ધારો કે બિંદુ $M(2, 0)$ અને બિંદુ N એ પરવલય $y^2 = 16x$ પરનું બિંદુ છે તથા $\overline{MN}$ ના મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ $y^2 + kx + 8 = 0$ તો $k = \dots\dots$

(A) 16

(B) 8

(C) -8

(D) -16

ઉકેલ : ધારો કે $M(2, 0)$ તથા $N(at_1^2, 2at_1)$ પરથી $N(4t_1^2, 8t_1)$ છે.

હવે, ધારો કે $\overline{MN}$ નું મધ્યબિંદુ (x, y) છે.

$$(x, y) = \left(\frac{4t_1^2 + 2}{2}, \frac{8t_1}{2} \right). \text{ આથી } x = 2t_1^2 + 1, \quad y = 4t_1$$

$$\therefore x = 2\left(\frac{y}{4}\right)^2 + 1. \quad \text{આથી } y^2 - 8x + 8 = 0$$

$$k = -8$$

જવાબ : (C)

(88) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના અભિલંબ તેની શીર્ષથી $4a$ અંતરે પરવલયની અક્ષ પર છેદે છે, તો તેમના ઢાળ

(A) સમાંતર શ્રેણીમાં હોય.

(B) સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય.

(C) સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય.

(D) આમાંથી એક પણ નહિ.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ના અભિલંબનું સમીકરણ, $y = mx - 2am - am^3$

તે અક્ષ એટલે કે X-અક્ષ પર $4a$ અંતરે છેદે છે અર્થાત્ $(4a, 0)$ માં છેદે છે.

$$\therefore 0 = m(4a) - 2am - am^3 \text{ અથવા } am^3 - 2am = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$m^3 - 2m = 0. \text{ અથવા } m(m^2 - 2) = 0$$

$$\therefore m(m - \sqrt{2})(m + \sqrt{2}) = 0$$

$$m = 0 \text{ અથવા } m = \sqrt{2} \text{ અથવા } m = -\sqrt{2}$$

$\therefore$ અભિલંબના ઢાળ $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$ છે અને તે સમાંતર શ્રેણીમાં છે. **જવાબ : (A)**

(89) પરવલય પરના બિંદુ (x_1, y_1) તથા (x_2, y_2) માંથી પરવલય $y^2 = 4ax$ ને દોરવામાં આવેલાં સ્પર્શકોનું છેદબિંદુ (x_3, y_3) હોય તો

(A) x_1, x_2, x_3 સમાંતર શ્રેણીમાં હોય.

(B) y_1, y_2, y_3 સમાંતર શ્રેણીમાં હોય.

(C) x_1, x_3, x_2 સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય.

(D) x_1, x_2, x_3 સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ પરનાં બિંદુઓ $(x_1, y_1) = (at_1^2, 2at_1)$ અને $(x_2, y_2) = (at_2^2, 2at_2)$ છે.

$\therefore (at^2, 2at)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ $x - ty + at^2 = 0$ છે.

$$\therefore t_1 \text{ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ } x - t_1y + at_1^2 = 0 \quad (1)$$

$$\therefore \text{અને } t_2 \text{ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ } x - t_2y + at_2^2 = 0 \quad (2)$$

$\therefore$ બંને સમીકરણો ઉકેલતાં, સ્પર્શકોનાં છેદબિંદુના યામ $= (at_1t_2, a(t_1 + t_2))$ મળે.

$$\therefore (x_3, y_3) = (at_1t_2, a(t_1 + t_2))$$

$$\text{અહીં } x_1 \cdot x_2 = at_1^2 \times at_2^2 = a^2t_1^2t_2^2 = (at_1t_2)^2 = x_3^2$$

$$\therefore x_1 \times x_2 = (x_3)^2$$

$\therefore x_1, x_3, x_2$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

જવાબ : (C)

(90) પરવલય $y^2 = 4ax$ પરના બિંદુ (x_1, y_1) માંથી ત્રણ અભિલંબ લંબ દોરવામાં આવે, તો તેમના લંબપાદના y -યામોનો સરવાળો =

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : પરવલય $y^2 = 4ax$ ના અભિલંબનું સમીકરણ $y = mx - 2am - am^3$.

વળી તે (x_1, y_1) માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore y_1 = mx_1 - 2am - am^3$$

$$\therefore am^3 + m(2a - x_1) + y_1 = 0$$

અહીં બીજનો સરવાળો $m_1 + m_2 + m_3 = 0$

$\therefore$ અભિલંબના લંબપાદના y -યામનો સરવાળો $= -2am_1 - 2am_2 - 2am_3$ (પાદબિંદુ $(am^2, -2am)$ છે.)

$$= -2a(m_1 + m_2 + m_3) = -2a(0) = 0 \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(91) પરવલય $y^2 = 4ax$ ના નાભિજીવાના એક ભાગની લંબાઈ b અને બીજાની c હોય, તો અર્ધનાભિલંબની લંબાઈ

(A) $\frac{2bc}{b+c}$

(B) $\frac{bc}{b+c}$

(C) $\frac{b+c}{2}$

(D) $\frac{b+c}{2bc}$

ઉકેલ : અહીં $\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{2}{l}$

$$\therefore \frac{1}{c} + \frac{1}{b} = \frac{2}{l}$$

$$\therefore l = \frac{2bc}{b+c}$$

નોંધ : અહીં l એ b અને c વચ્ચેનો સ્વરિત મધ્યક થાય.

જવાબ : (A)

(92) ઉપવલય $\frac{x^2}{f(k^2 + 7k + 3)} + \frac{y^2}{f(k + 10)} = 1$ નો પ્રધાન અક્ષ X -અક્ષ હોય તથા f વધતું વિધેય હોય, તો k ની કિંમતોનો ગણ

(A) $(1, \infty) \cup (-\infty, 1)$

(B) $(-\infty, -7) \cup (7, \infty)$

(C) $(-\infty, -7) \cup (1, \infty)$

(D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : અહીં ઉપવલય $\frac{x^2}{f(k^2 + 7k + 3)} + \frac{y^2}{f(k + 10)} = 1$ નો પ્રધાન અક્ષ X -અક્ષ છે.

$$\therefore f(k^2 + 7k + 3) > f(k + 10)$$

હવે f વધતું વિધેય છે.

$$\therefore k^2 + 7k + 3 > k + 10$$

$$\therefore (k + 3)^2 > 16$$

$$\therefore k + 3 < -4 \quad \text{અથવા} \quad k + 3 > 4$$

$$\therefore k < -7 \quad \text{અથવા} \quad k > 1$$

$$\therefore k \in (-\infty, -7) \cup (1, \infty)$$

જવાબ : (C)


(93) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ પરના બિંદુ $(-2\sqrt{2}, -2)$ ને અનુરૂપ ઉત્કેન્દ્રીકોણનું માપ

(A) $\frac{-\pi}{4}$

(B) $\frac{-\pi}{2}$

(C) $\frac{-3\pi}{4}$

(D) એક પણ નહિ.



આકૃતિ 9.55

ધારો કે θ ઉત્કેન્દ્રીકોણ છે તથા ઉપવલય પરનું બિંદુ $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ છે.

અહીં $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$

$\therefore x = 4 \cos \theta$ અને $y = 2\sqrt{2} \sin \theta$

$\therefore -2\sqrt{2} = 4 \cos \theta$ અને $-2 = 2\sqrt{2} \sin \theta$

$\therefore \cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \sin \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$

$\therefore P(\theta)$ ત્રીજા ચરણમાં હોવાથી, $\theta = -\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{-3\pi}{4}$

જવાબ : (C)

- (94) ઉપવલય $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{12} = 1$ ની નાભિઓ S અને S' હોય તથા B એ ઉપવલય પરનું Y-અક્ષનું બિંદુ હોય, તો $\Delta SBS'$ નું ક્ષેત્રફળ =

- (A) $4\sqrt{3}$ (B) $8\sqrt{2}$ (C) $12\sqrt{2}$ (D) $12\sqrt{3}$

ઉકેલ : અહીં $a^2 = 36$, $b^2 = 12$ આથી $a = 6$, $b = 2\sqrt{3}$

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2)$ પરથી $e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{24}{36}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

માંગેલ $\Delta SBS'$ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} (2ae) (b)$ $(\frac{1}{2} \times SS' \times OB)$

$= abe$

$= 6 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{2}$

જવાબ : (C)

બીજી રીત :

$\Delta SBS'$ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} |D|$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2\sqrt{6} & 0 & 1 \\ -2\sqrt{6} & 0 & 1 \\ 0 & 2\sqrt{3} & 1 \end{vmatrix} \text{ નો માનક}$$

$$= \frac{1}{2} (-2\sqrt{3}(2\sqrt{6} + 2\sqrt{6})) \text{ નો માનક}$$

$$= 4\sqrt{18} = 12\sqrt{2}$$

(95) ઉપવલય $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{4} = 1$ ના શિરોબિંદુમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકો વડે બનતા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ =

(A) 14

(B) 28

(C) 42

(D) 56

ઉકેલ : અહીં $a=7$, $b=2$ અને $a > b$ છે, તેથી મુખ્ય અક્ષ X-અક્ષ છે. આપેલ ઉપવલયનાં શિરોબિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકો વડે બનતા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ = (મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ) (ગૌણ અક્ષની લંબાઈ)

$$= 2a \times 2b = 14 \times 4 = 56$$

જવાબ : (D)

(96) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) પરનાં બિંદુ $P(\theta)$ આગળનો સ્પર્શક સહાયકવૃત્તને બે બિંદુઓ A અને Bમાં છેદે


તથા $O(0,0)$ કેન્દ્ર હોય તથા $m \angle AOB = \frac{\pi}{2}$ હોય, તો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા e નીચેના સમીકરણનું સમાધાન કરે :

(A) $e^2 (1 + \sin^2 \theta) = 1$

(B) $e^2 (1 - \sin^2 \theta) = 1$

(C) $e^2 (1 + \cos^2 \theta) = 1$

(D) $e^2 (1 - \cos^2 \theta) = 1$



ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય પરનું બિંદુ $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ છે તથા સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2$ છે.

$$\therefore \text{બિંદુ } P \text{ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ } \frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$$

$$\therefore (b \cos \theta) x + (a \sin \theta) y - ab = 0 \quad (1)$$

હવે, સહાયકવૃત્ત અને સ્પર્શક રેખા સમીકરણ (1)માંથી પસાર થતા રેખાચુગ્મનું સંયુક્ત સમીકરણ

$$x^2 + y^2 - a^2 \left(\frac{b \cos \theta x + a \sin \theta y}{ab} \right)^2 = 0$$

$$\therefore b^2 x^2 + b^2 y^2 - b^2 \cos^2 \theta \cdot x^2 - a^2 \sin^2 \theta \cdot y^2 - 2ab \sin \theta \cos \theta xy = 0$$

$$\text{હવે } m \angle AOB = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x^2 \text{ નો સહગુણક} + y^2 \text{ નો સહગુણક} = 0$$

$$b^2 - b^2 \cos^2 \theta + b^2 - a^2 \sin^2 \theta = 0$$

$$b^2 (1 + \sin^2 \theta) = a^2 \sin^2 \theta$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{\sin^2 \theta}{1 + \sin^2 \theta} \cdot \text{હવે } e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\therefore e^2 = 1 - \frac{\sin^2 \theta}{1 + \sin^2 \theta} = \frac{1}{1 + \sin^2 \theta}$$

$$\therefore e^2 (1 + \sin^2 \theta) = 1$$

જવાબ : (A)


(97) ધારો કે ઉપવલયના પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ 20 અને ગૌણ અક્ષની લંબાઈ 12 છે. આ ઉપવલયના એક નાભિને કેન્દ્ર તરીકે લઈ વર્તુળ એવી રીતે દોરેલ છે કે જે ઉપવલયને A આગળ સ્પર્શે છે. વર્તુળનું સમીકરણ

(A) $x^2 + y^2 + 16x + 60 = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 16x - 60 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 16x + 60 = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 16x - 60 = 0$



આકૃતિ 9.57

ઉકેલ : સરળતા ખાતર ધારો કે પ્રધાન અક્ષ x -અક્ષ છે. માટે

અહીં, ઉપવલયના પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ $= 2a = 20$ આથી, $a = 10$

ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $= 2b = 12$ આથી, $b = 6$

હવે, $b^2 = a^2 (1 - e^2)$ પરથી,

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow e^2 = 1 - \frac{36}{100} = \frac{64}{100} \quad \text{આથી, } e = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$\therefore$ ઉપવલયનું એક નાભિ $S (ae, 0) = S (8, 0)$ મળે.

∴ વર્તુળનું કેન્દ્ર = (8,0) મળે.

સ્પષ્ટ છે કે ત્રિજ્યા $r=2$

∴ માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ $(x-8)^2 + y^2 = 4$

∴ $x^2 + y^2 - 16x + 60 = 0$

જવાબ : (C)

(98) ઉપવલય $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ ના કોઈ બિંદુ P આગળનો સ્પર્શક Y-અક્ષને Qમાં છેદે છે. ધારો કે R એ બિંદુ Qનું રેખા

$y=x$ માં પ્રતિબિંબ હોય, તો $\overline{QR}$ ને વ્યાસ લઈ દોરેલ વર્તુળ કોઈ ચોક્કસ બિંદુમાંથી પસાર થાય.

(A) (0,0) (B) (10,0) (C) (5,0) (D) (10,5)

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ પરનાં બિંદુ $P(10\cos\theta, 5\sin\theta)$ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ,

$$\frac{x}{10}\cos\theta + \frac{y}{5}\sin\theta = 1$$

તે Y-અક્ષને એટલે કે $x=0$ ને Qમાં છેદે છે. આથી Qના યામ = $(0, 5\operatorname{cosec}\theta)$

હવે, બિંદુ R એ Q બિંદુનું રેખા $y=x$ પરનું પ્રતિબિંબ છે.

∴ Rના યામ = $(5\operatorname{cosec}\theta, 0)$

∴ $\overline{QR}$ વ્યાસ હોય તેવા વર્તુળનું સમીકરણ

$$(x-0)(x-5\operatorname{cosec}\theta) + (y-5\operatorname{cosec}\theta)(y-0) = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 5(x+y)\operatorname{cosec}\theta = 0$$

સ્પષ્ટ છે કે તે (0, 0)માંથી પસાર થાય છે.

જવાબ : (A)

(99) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પર કોઈ બિંદુ P હોય તથા $\overline{AA'}$ મુખ્ય અક્ષ હોય, તો $\Delta APA'$ નું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ


(A) $\frac{1}{2}ab$

(B) ab

(C) $2ab$

(D) $4ab$

ઉકેલ :



આકૃતિ 9.58

ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરનું બિંદુ $P(acos\theta, bsin\theta)$ તથા $A(a, 0)$, $A'(-a, 0)$ મળે.

$$\begin{aligned}
\therefore \Delta APA' \text{ નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times AA' \times PM \\
&= \frac{1}{2}(2a)(b|\sin\theta|) \\
&= ab|\sin\theta|
\end{aligned}$$

ક્ષેત્રફળ મહત્તમ થાય ત્યારે $\sin\theta = 1$ હોવું જોઈએ કારણ કે $-1 \leq \sin\theta \leq 1$ છે.

$$\therefore \Delta APA' \text{ નું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ} = ab$$

જવાબ : (B)

(100) વર્તુળ $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ના વ્યાસને અર્ધ ગૌણ અક્ષ અને વર્તુળ $x^2 + (y-2)^2 = 4$ ના વ્યાસને અર્ધ પ્રધાન અક્ષ લઈ, એક ઉપવલય દોરવામાં આવે છે. જો ઉપવલયનું કેન્દ્ર ઊગમબિંદુ હોય અને યામાક્ષો ઉપવલયના અક્ષો હોય, તો ઉપવલયનું સમીકરણ મળે. (જ્યાં પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ છે.)

$$(A) \quad 4x^2 + y^2 = 4 \quad (B) \quad x^2 + 4y^2 = 8 \quad (C) \quad 4x^2 + y^2 = 8 \quad (D) \quad x^2 + 4y^2 = 16$$

ઉકેલ : પ્રથમ વર્તુળની ત્રિજ્યા $r_1 = 1$. તેથી ઉપવલયના અર્ધ ગૌણ અક્ષની લંબાઈ = 2

બીજા વર્તુળની ત્રિજ્યા $r_2 = 2$. તેથી ઉપવલયના અર્ધ પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ = 4

$$\therefore a = 4, b = 2$$

$$\therefore \text{ માંગેલ ઉપવલયનું સમીકરણ } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\therefore x^2 + 4y^2 = 16$$

જવાબ : (D)

(101) સમીકરણ $\frac{x^2}{3-r} + \frac{y^2}{r-7} + 1 = 0$ ઉપવલય દર્શાવે, તો $r \in$

$$(A) \quad (3, 7] \quad (B) \quad [3, 7) \quad (C) \quad (3, 7) \quad (D) \quad \text{આમાંથી એક પણ નહિ}$$

ઉકેલ : આપેલ સમીકરણ પરથી, $\frac{x^2}{3-r} + \frac{y^2}{r-7} = -1$

$$\therefore \frac{x^2}{r-3} + \frac{y^2}{7-r} = 1$$

જો આ સમીકરણ ઉપવલય દર્શાવે, તો $r-3 > 0$ અને $7-r > 0$

$$\therefore r > 3 \text{ અને } 7 > r$$

$$\therefore 3 < r < 7$$

જવાબ : (C)

(102) જો ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની નાભિઓ S અને S' હોય, B એ ઉપવલયના ગૌણ અક્ષ પરનું એક અંત્યબિંદુ હોય તથા $\Delta SBS'$ સમબાજુ ત્રિકોણ હોય, તો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા =

$$(A) \quad \frac{1}{2} \quad (B) \quad \frac{1}{3} \quad (C) \quad \frac{1}{4} \quad (D) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની નાભિઓ $S(ae, 0)$, $S'(-ae, 0)$ તથા $B(0, b)$ આપેલ છે. (જ્યાં $a > b$ લઈએ.)

$\Delta SBS'$ સમબાજુ ત્રિકોણ છે. અર્થાત્, $SB = S'B = SS'$

$$\therefore SB^2 = SS'^2$$

$$\therefore (ae-0)^2 + (0-b)^2 = (2ae)^2$$

$$\therefore a^2e^2 + b^2 = 4a^2e^2$$

$$\therefore a^2e^2 + a^2 - a^2e^2 = 4a^2e^2 \quad (b^2 = a^2(1-e^2))$$

$$\therefore 4e^2 = 1. \text{ અર્થાત્, } e = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (A)

(103) જો કોઈ ઉપવલયની નાભિઓ S અને S' હોય, $\overline{OB}$ ગૌણ અક્ષ હોય તથા $m\angle SBS' = \frac{\pi}{2}$, તો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા =

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે, જ્યાં $a > b$ છે.

તેની ઉપવલયની નાભિ $S(ae, 0)$, $S'(-ae, 0)$, $O(0, 0)$ તથા $B(0, b)$ મળે.

$$\therefore m\angle SBS' = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore (\overline{SB} \text{ નો ઢાળ}) (\overline{S'B} \text{ નો ઢાળ}) = -1$$

$$\therefore \left(\frac{b-0}{0-ae} \right) \left(\frac{b-0}{0+ae} \right) = -1$$

$$\therefore b^2 = a^2e^2$$

$$\therefore a^2(1-e^2) = a^2e^2 \quad (a > b)$$

$$\therefore 2e^2 = 1 \text{ અર્થાત્, } e = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

જવાબ : (B)

(104) ઉપવલય $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ ની નાભિઓ $(0, \pm\sqrt{32})$ છે, તો ઉપવલય $\frac{x^2}{4+k^2} + \frac{y^2}{36+k^2} = 1$ ની નાભિઓના યામ

(A) $(k^2, \pm\sqrt{32+k^2})$ (B) $(-k^2, \pm\sqrt{32-k^2})$ (C) $(0, \pm\sqrt{32})$ (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ પરથી, $a^2 = 4$, $b^2 = 36$

$\therefore$ ઉપવલયની નાભિઓનાં યામ $= (0, \pm\sqrt{b^2-a^2}) = (0, \pm\sqrt{32})$ જે આપેલ છે.

$$\text{ઉપવલય } \frac{x^2}{4+k^2} + \frac{y^2}{36+k^2} = 1 \text{ માટે } a^2 = 4+k^2, \quad b^2 = 36+k^2$$

$$\therefore \text{ માંગેલ નાભિઓનાં યામ } = (0, \pm\sqrt{b^2-a^2})$$

$$= (0, \pm\sqrt{32})$$

જવાબ : (C)

(105) ઉપવલય પરના કોઈ બિંદુ P માંથી ઉપવલયને મહત્તમ કેટલા અભિલંબો મળે ?

- (A) 0 (B) 4 (C) 2 (D) 1

ઉકેલ : ઉપવલય પરના બિંદુ $P(\theta)$ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ

$ax \sec \theta - by \operatorname{cosec} \theta = a^2 - b^2$. તે (x_1, y_1) માંથી પસાર થાય, તો

$$\therefore ax_1 \frac{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}} - by_1 \frac{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}{2 \tan \frac{\theta}{2}} = a^2 - b^2$$

$$\therefore ax_1 \left(\frac{1+t^2}{1-t^2} \right) - by_1 \left(\frac{1+t^2}{2t} \right) = a^2 - b^2 \quad \left(\tan \frac{\theta}{2} = t \text{ લેતાં} \right)$$

$$\therefore ax_1 2t + ax_1 2t^3 - by_1 + by_1 t^4 = (a^2 - b^2)(2t - 2t^3)$$

જે t માં ચતુર્થ ઘાતનું સમીકરણ છે.

નિશ્ચિત બિંદુ (x_1, y_1) માંથી પસાર થતાં મહત્તમ 4 અભિલંબો દોરી શકાય.

જવાબ : (B)

(106) ઉપવલય $3x^2 - 18x + 2y^2 - 8y + 29 = 0$ ના પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ અને ગૌણ અક્ષની લંબાઈનો ગુણોત્તર =

- (A) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{2} : \sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{3} : \sqrt{2}$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $3x^2 - 18x + 2y^2 - 8y + 29 = 0$

$$\therefore 3x^2 - 18x + 27 + 2y^2 - 8y + 8 - 6 = 0$$

$$\therefore 3(x^2 - 6x + 9) + 2(y^2 - 4y + 4) = 6$$

$$\therefore \frac{(x-3)^2}{2} + \frac{(y-2)^2}{3} = 1$$

$$\therefore a^2 = 2 \quad b^2 = 3. \text{ આથી, } a < b$$

પ્રધાન અક્ષની લંબાઈ $= 2b = 2\sqrt{3}$, ગૌણ અક્ષની લંબાઈ $= 2a = 2\sqrt{2}$

માંગેલ ગુણોત્તર $= \sqrt{3} : \sqrt{2}$

જવાબ : (C)

(107) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓએ મળતા ઉત્કેન્દ્રીકોણ = ($a > b$)

- (A) $\tan^{-1} \left(\pm \frac{ae}{b} \right)$ (B) $\tan^{-1} \left(\pm \frac{a}{be} \right)$ (C) $\tan^{-1} \left(\pm \frac{be}{a} \right)$ (D) $\tan^{-1} \left(\pm \frac{b}{ae} \right)$

ઉકેલ : ઉપવલયના નાભિલંબનાં અંત્યબિંદુઓ $\left(ae, \pm \frac{b^2}{a} \right), \left(-ae, \pm \frac{b^2}{a} \right)$. જો ઉપવલય પરના બિંદુ $\left(ae, \frac{b^2}{a} \right)$

આગળ ઉત્કેન્દ્રીકોણ θ હોય, તો

$$(a \cos \theta, b \sin \theta) = \left(ae, \frac{b^2}{a} \right) \text{ લઈએ.}$$

$$\therefore a \cos \theta = ae, \quad b \sin \theta = \frac{b^2}{a}$$

$$\therefore \frac{b}{a} \tan \theta = \frac{b^2}{a^2 e} \text{ અર્થાત્, } \tan \theta = \frac{b}{ae} \text{ અર્થાત્, } \theta = \tan^{-1} \frac{b}{ae}$$

$$\text{તે જ રીતે } \left(ae, \frac{-b^2}{a} \right) \text{ માટે } a \cos \theta = ae, \quad b \sin \theta = \frac{-b^2}{a}$$

$$\therefore P(\theta) \text{ ચોથા ચરણમાં છે. અર્થાત્ } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{-b}{ae} \right)$$

$$\left(-ae, \frac{b^2}{a} \right) \text{ માટે } a \cos \theta = -ae, \quad b \sin \theta = \frac{b^2}{a}.$$

$P(\theta)$ દ્વિતીય ચરણમાં હોવાથી,

$$\therefore \theta = \cos^{-1}(-e) = \pi - \cos^{-1} e$$

$$\left(-ae, \frac{-b^2}{a} \right) \text{ માટે } a \cos \theta = -ae, \quad b \sin \theta = \frac{-b^2}{a}, \quad \tan \theta = \frac{b}{ae}$$

$$P(\theta) \text{ ત્રીજા ચરણમાં હોવાથી } \theta = \pi + \tan^{-1} \frac{b}{ae}$$

જવાબ : (D)

(108) જો ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા $\frac{\sqrt{5}}{4}$ હોય, તો ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{16} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા =

(A) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

(B) $\frac{7}{\sqrt{11}}$

(C) $\sqrt{\frac{7}{11}}$

(D) $\frac{7}{11}$

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ પરથી, $b^2 = 4$, $e^2 = \frac{5}{16}$. ધારો કે $a > b$

$$\text{હવે, } b^2 = a^2(1 - e^2) \text{ પરથી, } 4 = a^2 \left(1 - \frac{5}{16} \right). \text{ અર્થાત્, } a^2 = \frac{64}{11}$$

અહીં $a > b$ છે.

$$\text{હવે, ઉપવલય } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ માં } a^2 = \frac{64}{11}, \quad b^2 = 16 \text{ લેતાં,}$$

$$a^2 < b^2 \text{ હોવાથી } a^2 = b^2(1 - e^2) \text{ પરથી, } \frac{64}{11} = 16(1 - e^2)$$

$$\therefore \frac{4}{11} = 1 - e^2 \text{ અર્થાત્, } e^2 = 1 - \frac{4}{11} = \frac{7}{11}$$

$$\therefore e = \sqrt{\frac{7}{11}}$$

જવાબ : (C)

નોંધ : $a < b$ હોય તો $a^2 = b^2(1 - e^2) = 4 \left(1 - \frac{5}{16} \right) = \frac{44}{16} = \frac{11}{4}$

આ વિકલ્પમાં $\frac{x^2}{11} + \frac{y^2}{16} = 1$ માં $a^2 < b^2$

$$\therefore \frac{11}{4} = 16(1 - e^2) \Rightarrow 1 - e^2 = \frac{11}{64} \Rightarrow e^2 = \frac{53}{64} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{53}}{8} \text{ પરંતુ આ વિકલ્પ નથી.}$$

(109) પ્રથમ સમીકરણો $x = 6(1 + \cos \alpha)$, $y = 4(1 + \sin \alpha)$ કયા ઉપવલયનાં સમીકરણો દર્શાવે છે ? $\alpha \in [0, 2\pi)$

(A) $\frac{(x-6)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{36} = 1$

(B) $\frac{(x-6)^2}{36} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1$

(C) $\frac{(x+6)^2}{36} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

(D) $\frac{(x-6)^2}{36} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

ઉકેલ : અહીં $x = 6(1 + \cos \alpha)$, $y = 4(1 + \sin \alpha)$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{x-6}{6}, \sin \alpha = \frac{y-4}{4}$$

હવે, $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

$$\therefore \frac{(x-6)^2}{36} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1$$

જવાબ : (B)

(110) ઉપવલયના સહાયક વૃત્તનું ક્ષેત્રફળ એ ઉપવલયના ક્ષેત્રફળના ત્રણ ગણા જેટલું હોય, તેવા ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા (જ્યાં પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ છે.)

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ છે. જ્યાં $a > b$ છે.

તેથી ઉપવલયનું ક્ષેત્રફળ $= \pi ab$

હવે, ઉપવલયના સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2$ થશે અને તેનું ક્ષેત્રફળ $= \pi a^2$ મળે.

આપેલ શરત મુજબ, $\pi a^2 = 3\pi ab$

$$\therefore a = 3b$$

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2)$

$$\therefore b^2 = 9b^2(1 - e^2). \text{ આથી, } e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

જવાબ : (D)


(111) ઉપવલય $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ પર કોઈ બિંદુ P છે તથા S અને S' ઉપવલયની નાભિઓ છે, તો $\Delta PSS'$ નું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ

(A) $2\sqrt{2}$

(B) $7\sqrt{2}$

(C) $14\sqrt{2}$

(D) $28\sqrt{2}$



આકૃતિ 9.59

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ પરથી $a^2 = 81$, $b^2 = 49$ અને $a > b$ છે.

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2) \Rightarrow e^2 = 1 - \frac{49}{81} = \frac{32}{81}$ આથી, $e = \frac{\sqrt{32}}{9} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$

$\therefore$ નાભિ $(\pm ae, 0) = S(4\sqrt{2}, 0)$, $S'(-4\sqrt{2}, 0)$

બિંદુ P ઉપવલય પર હોવાથી $P(9\cos\theta, 7\sin\theta)$ થશે.

$\therefore \Delta PSS'$ નું ક્ષેત્રફળ $= \frac{1}{2} SS' \times PM = \frac{1}{2} \times 8\sqrt{2} \times 7|\sin\theta| = 28\sqrt{2}|\sin\theta|$

$\therefore$ માંગેલ મહત્તમ ક્ષેત્રફળ $= 28\sqrt{2}$ ($\sin\theta$ નો વિસ્તાર $= [-1, 1]$)

જવાબ : (D)

(112) ઉપવલય $9x^2 + 16y^2 - 90x + 32y + 97 = 0$ નું કેન્દ્ર =

- (A) $(5, -1)$ (B) $(5, 1)$ (C) $(1, 5)$ (D) $(1, -5)$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય $9x^2 + 16y^2 - 90x + 32y + 97 = 0$

તેથી, $9x^2 - 90x + 225 + 16y^2 + 32y + 16 + 97 - 241 = 0$

$\therefore 9(x^2 - 10x + 25) + 16(y^2 + 2y + 1) = 144$

$\therefore \frac{(x-5)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$

તેથી સ્પષ્ટ છે કે ઉપવલયનું કેન્દ્ર $= (5, -1)$ છે.

જવાબ : (A)

(113) ઉપવલયના નાભિલંબની લંબાઈ એ તેની બે નાભિઓ વચ્ચેનાં અંતર જેટલી હોય, તો ઉપવલયની ઉત્કેન્દ્રતા =

- (A) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{5}\pm 1}{2}$ (D) એક પણ નહિ.

ઉકેલ : ઉપવલય માટે ધારો કે પ્રધાન અક્ષ X-અક્ષ છે.

હવે, ઉપવલયના નાભિલંબની લંબાઈ $=$ બે નાભિઓ વચ્ચેનું અંતર

$\therefore \frac{2b^2}{a} = 2ae$

$\therefore b^2 = a^2.e$

$$\therefore a^2(1-e^2) = a^2 \times e \quad [a > b \text{ લેતાં } b^2 = a^2(1-e^2)]$$

$$\therefore e^2 + e - 1 = 0$$

$$\therefore e = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad \text{પરંતુ ઉપવલય માટે હંમેશાં } 0 < e < 1$$

$$\therefore e = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

જવાબ : (B)

(114) ઉપવલય $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ ની નાભિઓ S અને S' હોય તથા $\overline{PQ}$ એ નાભિ S માંથી પસાર થતી જીવા હોય, તો

$\Delta S'PQ$ ની પરિમિતિ =

(A) 10


(B) 40

(C) 8

(D) 32

ઉકેલ : અહીં, $a^2 = 100$, $b^2 = 64$.

તેથી $a = 10$, $b = 8$ હોવાથી $a > b$ છે.



આકૃતિ 9.60

હવે, S અને S' ઉપવલયની નાભિઓ હોય તથા $\overline{PQ}$ એ નાભિ S માંથી પસાર થતી જીવા હોય, તો

$$\therefore \text{ માંગેલ } \Delta S'PQ \text{ ની પરિમિતિ} = SP + S'P + SQ + S'Q = 4a = 40$$

જવાબ : (B)

(115) ઉપવલય $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (જ્યાં $a > b$) ની નાભિના યામ =

(A) $(h \pm ae, k)$

(B) $(h \pm ae, k \pm ae)$

(C) (h, k)

(D) $(-h, k \pm ae)$

ઉકેલ : ઊગમબિંદુનું સ્થાનાંતર (h, k) આગળ કરતાં, $x' = x - h$, $y' = y - k$ મળે.

$$\therefore \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$\therefore \text{ આ ઉપવલયની નાભિના યામ } = (\pm ae, 0) = (x', y')$$

$$\therefore \text{ મૂળ ઉપવલય માટે, } \pm ae = x - h, \quad 0 = y - k$$

$$\therefore x = \pm ae + h, \quad y = k$$

$$\therefore \text{ માંગેલ નાભિના યામ } = (h \pm ae, k)$$

જવાબ : (A)

(116) ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$ ના સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 = 25$ (B) $x^2 + y^2 = 36$ (C) $x^2 + y^2 = 11$ (D) $x^2 + y^2 = 61$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી $a^2 = 25$, $b^2 = 36$.

આથી, $a = 5$, $b = 6$ હોવાથી, $a < b$ છે.

$\therefore$ માંગેલ સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = b^2$ પરથી, $x^2 + y^2 = 36$

જવાબ : (B)

(117) ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ના સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 = 20$ (B) $x^2 + y^2 = 12$ (C) $x^2 + y^2 = 4$ (D) $x^2 + y^2 = 16$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી $a = 4$, $b = 2$ હોવાથી, $a > b$ છે.

$\therefore$ માંગેલ સહાયક વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2$ પરથી,

$$x^2 + y^2 = 16$$

જવાબ : (D)

(118) ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ના નિયામિકા વૃત્તનું સમીકરણ

- (A) $x^2 + y^2 = 25$ (B) $x^2 + y^2 = 16$ (C) $x^2 + y^2 = 41$ (D) $x^2 + y^2 = 9$

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી $a^2 = 25$, $b^2 = 16$ હોવાથી $a > b$ છે.

$\therefore$ માંગેલ નિયામિકા વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ પરથી, $x^2 + y^2 = 41$

જવાબ : (C)

(119) ઉપવલય $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ના નિયામિકા વૃત્તનું પ્રચલબિંદુ =

- (A) $(3\cos\theta, 3\sin\theta)$ (B) $(2\cos\theta, 2\sin\theta)$ (C) $(\sqrt{13}\cos\theta, \sqrt{13}\sin\theta)$ (D) એક પણ નહિ

ઉકેલ : આપેલ ઉપવલય પરથી, $a^2 = 9$, $b^2 = 4$. તેથી, $a > b$

નિયામિકા વૃત્તનું સમીકરણ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ પરથી, $x^2 + y^2 = 13$

$\therefore$ માંગેલ પ્રચલબિંદુ $= (r\cos\theta, r\sin\theta) = (\sqrt{13}\cos\theta, \sqrt{13}\sin\theta)$

જવાબ : (C)

(120) એક બિંદુનું $(-2, 0)$ થી અંતર તેના રેખા $x = \frac{-9}{2}$ થી મળતાં અંતર કરતાં $\frac{2}{3}$ ગણું છે, તો તેનો બિંદુગણ =

- (A) રેખા (B) વર્તુળ (C) ઉપવલય (D) અતિવલય

ઉકેલ : ધારો કે બિંદુ (α, β) છે. તેથી આપેલ માહિતી પરથી,

બિંદુ (α, β) થી $(-2, 0)$ સુધીનું અંતર $= \frac{2}{3}$ (બિંદુ (α, β) થી $x = \frac{-9}{2}$ સુધીનું લંબ અંતર)

$$\therefore \sqrt{(\alpha+2)^2 + \beta^2} = \frac{2}{3} \left| \alpha + \frac{9}{2} \right|$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 + 4\alpha + 4 = \frac{4\alpha^2 + 36\alpha + 81}{9}$$

$$\therefore 9\alpha^2 + 9\beta^2 + 36\alpha + 36 - 4\alpha^2 - 36\alpha - 81 = 0$$

$$\therefore 5\alpha^2 + 9\beta^2 = 45$$

વ્યાપક રીતે બિંદુગણ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ઉપવલય દર્શાવે છે.

જવાબ : (C)

(121) જો રેખા $y = 3x + k$ એ વક્ર $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{2} = 1$ ને સ્પર્શે, તો $k = \dots\dots$

- (A) $\pm\sqrt{47}$ (B) $\pm\sqrt{63}$ (C) $\pm\sqrt{53}$ (D) ન મળે.

ઉકેલ : આપેલ રેખા $y = 3x + k$ પરથી $m = 3$, $c = k$

આપેલ ઉપવલય $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{2} = 1$ પરથી, $a^2 = 5$, $b^2 = 2$

રેખા એ ઉપવલયને સ્પર્શે, તો $c^2 = a^2m^2 + b^2$ પરથી,

$$k^2 = 5(9) + 2 = 47. \text{ આથી } k = \pm\sqrt{47}$$

જવાબ : (A)

(122) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના પરસ્પર લંબ સ્પર્શકોના છેદબિંદુનો બિંદુગણ $\dots\dots$ દર્શાવે છે.

- (A) પરવલય (B) વર્તુળ (C) ઉપવલય (D) અતિવલય

ઉકેલ : ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના પરસ્પર લંબ સ્પર્શકોના છેદબિંદુનો બિંદુગણ નિયામિકા વૃત્ત $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$

મળે છે. તેથી માંગેલ બિંદુગણ વર્તુળ દર્શાવે છે.

જવાબ : (B)

(123) સમીકરણો $x = 7\cos\theta + 7\sin\theta$ અને $y = 10\cos\theta - 10\sin\theta$ દ્વારા દર્શાવાતો વક્ર $\dots\dots$

- (A) વર્તુળ (B) પરવલય (C) ઉપવલય (D) અતિવલય

ઉકેલ : $x = 7(\cos\theta + \sin\theta)$, $y = 10(\cos\theta - \sin\theta)$

$$\therefore \left(\frac{x}{7}\right)^2 + \left(\frac{y}{10}\right)^2 = (\cos\theta + \sin\theta)^2 + (\cos\theta - \sin\theta)^2 = 2$$

$$\therefore \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{100} = 2$$

$\therefore$ માંગેલ બિંદુગણ $\frac{x^2}{98} + \frac{y^2}{200} = 1$ ઉપવલય દર્શાવે છે.

જવાબ : (C)

(124) ઉપવલયની નાભિઓ $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ તથા શિરોબિંદુઓ $(\pm 3\sqrt{3}, 0)$ હોય, તો તે ઉપવલયના ગૌણ અક્ષની લંબાઈ = $\dots\dots$

- (A) $\sqrt{19}$ (B) $2\sqrt{19}$ (C) $3\sqrt{19}$ (D) $4\sqrt{19}$

ઉકેલ : અહીં $ae = 2\sqrt{2}$, $a = 3\sqrt{3}$. અર્થાત્, $e = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$

$$\text{હવે } b^2 = a^2(1 - e^2) = 27\left(1 - \frac{8}{27}\right) = 19$$

$$\therefore b = \sqrt{19}$$

$$\therefore \text{ગૌણ અક્ષની લંબાઈ} = 2\sqrt{19}$$

જવાબ : (B)

(125) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના બિંદુ P આગળનો અભિલંબ X-અક્ષને Q અને Y-અક્ષને Rમાં છેદે છે, તો

$$PQ : PR = \dots\dots$$

(A) $a : b$

(B) $a^2 : b^2$

(C) $b : a$

(D) $b^2 : a^2$

ઉકેલ : ધારો કે $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ એ ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરનું બિંદુ છે.

બિંદુ $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ $(a \sec \theta)x - (b \operatorname{cosec} \theta)y = a^2 - b^2$ થશે.

તે X-અક્ષને $Q\left(\frac{a^2 - b^2}{a} \cos \theta, 0\right)$ અને Y-અક્ષને $R\left(0, -\frac{a^2 - b^2}{b} \sin \theta\right)$ માં છેદશે.

$$\begin{aligned} \therefore PQ^2 &= \left(a \cos \theta - \frac{a^2 - b^2}{a} \cos \theta\right)^2 + b^2 \sin^2 \theta \\ &= \frac{b^2}{a^2} (b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta) \end{aligned}$$

$$\text{તે જ રીતે, } PR^2 = \frac{a^2}{b^2} (b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta)$$

$$\therefore PQ^2 : PR^2 = \frac{b^2}{a^2} : \frac{a^2}{b^2}$$

$$\therefore PQ : PR = b^2 : a^2$$

જવાબ : (D)

(126) ઉપવલય $3x^2 + 6x + 12y^2 + 48y + 15 = 0$ ની ઉત્કેન્દ્રતા

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{1}{2}$

ઉકેલ : અહીં $3x^2 + 6x + 12y^2 + 48y + 15 = 0$

$$\therefore 3x^2 + 6x + 3 + 12y^2 + 48y + 48 - 36 = 0$$

$$\therefore 3(x^2 + 2x + 1) + 12(y^2 + 4y + 4) = 36$$

$$\therefore \frac{(x+1)^2}{12} + \frac{(y+2)^2}{3} = 1$$

$$\therefore x' = x + 1, y' = y + 2 \text{ લેતાં } \frac{(x')^2}{12} + \frac{(y')^2}{3} = 1$$

તેથી $a^2 = 12$, $b^2 = 3$ હોવાથી $a > b$.

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2)$. આથી, $\frac{3}{12} = 1 - e^2$

$$\therefore e^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

તેથી, $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

જવાબ : (B)

(127) ઉપવલય $x^2 + 4y^2 = 100$ ની ઉત્કેન્દ્રતા

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{1}{2}$

ઉકેલ : $x^2 + 4y^2 = 100$ પરથી, $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ ઉપવલય દર્શાવે છે.

વળી $a^2 = 100$, $b^2 = 25$ અને $a > b$ છે.

હવે, $b^2 = a^2(1 - e^2)$ પરથી, $(1 - e^2) = \frac{1}{4}$ તેથી, $e^2 = \frac{3}{4}$

માટે $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

જવાબ : (A)

(128) ઉપવલય $5x^2 + 2y^2 = 7$ ને બિંદુ $(1, 2)$ માંથી દોરેલા સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ =

(A) $\tan^{-1}(4\sqrt{105})$

(B) $\tan^{-1}(\sqrt{105})$

(C) $\tan^{-1}(2\sqrt{105})$

(D) $\tan^{-1}(6\sqrt{105})$

ઉકેલ : અહીં ઉપવલય $5x^2 + 2y^2 = 7$ પરથી,

$$\frac{x^2}{\frac{7}{5}} + \frac{y^2}{\frac{7}{2}} = 1. \text{ આથી, } a^2 = \frac{7}{5}, b^2 = \frac{7}{2}. \text{ આથી, } a < b$$

$\therefore$ ઉપવલયના m ઢાળવાળા સ્પર્શકનું સમીકરણ

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2} \text{ થશે અને તે } (1, 2) \text{ માંથી પસાર થાય છે.}$$

$$\therefore 2 = m \pm \sqrt{\frac{7}{5} m^2 + \frac{7}{2}}$$

$$\therefore (2 - m)^2 = \frac{7m^2}{5} + \frac{7}{2}$$

$$\therefore 4 - 4m + m^2 - \frac{7m^2}{5} - \frac{7}{2} = 0$$

$$\therefore \frac{-2m^2}{5} - 4m + \frac{1}{2} = 0$$

$$\therefore 4m^2 + 40m - 5 = 0 \text{ એ } m \text{ માં દ્વિઘાત સમીકરણ છે.}$$

$$\therefore m_1 + m_2 = -10, m_1 \times m_2 = \frac{-5}{4}$$

ધારો કે બે સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ α હોય, તો


$$\tan \alpha = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \frac{\sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1 m_2}}{1 + m_1 m_2} = \left| \frac{\sqrt{100+5}}{1-\frac{5}{4}} \right| = \frac{\sqrt{105}}{\frac{1}{4}}.$$

આથી, $\alpha = \tan^{-1} 4\sqrt{105}$

જવાબ : (A)

(129) ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ના સ્પર્શકોના અક્ષો દ્વારા કપાતા રેખાખંડોનાં મધ્યબિંદુઓનો બિંદુગણ

- (A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4$ (B) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 4$ (C) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2$ (D) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 2$



આકૃતિ 9.61

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ પરના કોઈ બિંદુ $P(\theta)$ એટલે કે $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ આગળના સ્પર્શકનું

સમીકરણ $\frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$ છે. તે X-અક્ષને અને Y-અક્ષને અનુક્રમે A અને Bમાં છેટે, તો

$A(a \sec \theta, 0)$, $B(0, b \operatorname{cosec} \theta)$ મળે.

$\overline{AB}$ નું મધ્યબિંદુ $M(x, y)$ હોય, તો $x = \frac{a \sec \theta}{2}$, $y = \frac{b \operatorname{cosec} \theta}{2}$

$$\therefore \cos \theta = \frac{a}{2x}, \quad \sin \theta = \frac{b}{2y}$$

હવે, $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ પરથી $\frac{a^2}{4x^2} + \frac{b^2}{4y^2} = 1$

$$\therefore \text{વ્યાપક રીતે, માંગેલ મધ્યબિંદુના બિંદુગણનું સમીકરણ, } \frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 4$$

જવાબ : (B)

(130) ઉપવલય $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ ની નાભિઓ S અને S' હોય તથા P ઉપવલય પરનું કોઈ બિંદુ હોય, તો $PS + PS' = \dots\dots$

- (A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 100

ઉકેલ : અહીં આપેલ ઉપવલય પરથી $a^2 = 100$, $b^2 = 25$

જો P ઉપવલય પરનું બિંદુ હોય તથા S અને S' નાભિઓ હોય, તો

$$PS + PS' = 2a \text{ પરથી } PS + PS' = 20$$

જવાબ : (B)

(131) ધારો કે $E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ઉપવલય દર્શાવે છે અને $C: x^2 + y^2 = 9$ વર્તુળ દર્શાવે છે તથા $P(1, 2)$ અને $Q(2, 1)$

હોય, તો

(A) બિંદુ Q એ Cની અંદરની બાજુ પણ Eની બહારની બાજુ હોય.

(B) બિંદુ Q એ C તથા E બંનેની બહારની બાજુ હોય.

(C) બિંદુ P એ C તથા E બંનેની અંદરની બાજુ હોય.

(D) બિંદુ P એ Cની અંદરની બાજુ તથા Eની બહારની બાજુ હોય.

ઉકેલ : બિંદુ P માટે, $1^2 + 2^2 = 5 < 9$, બિંદુ Q માટે, $2^2 + 1^2 = 5 < 9$

∴ બિંદુ P અને બિંદુ Q વર્તુળના અંદરના ભાગમાં આવેલ છે.

$$\text{હવે, બિંદુ P માટે, } \frac{1^2}{9} + \frac{2^2}{4} = \frac{1}{9} + 1 = \frac{10}{9} > 1$$

$$\text{બિંદુ Q માટે, } \frac{2^2}{9} + \frac{1^2}{4} = \frac{4}{9} + \frac{1}{4} = \frac{25}{36} < 1$$

∴ બિંદુ P એ ઉપવલય Eની બહારના ભાગમાં અને Q એ ઉપવલય Eના અંદરના ભાગમાં આવેલ બિંદુ છે.

આમ, બિંદુ P એ C ની અંદરના ભાગમાં અને Eના બહારના ભાગમાં આવેલ છે.

જવાબ : (D)

(132) ઉપવલય $\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{16} = 1$ તથા ઉપવલય $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની ($a > b$) ઉત્કેન્દ્રતા સમાન હોય, તો $a : b = \dots\dots$

(A) 11 : 16

(B) 11 : 4

(C) 4 : 11

(D) 16 : 11

ઉકેલ : ધારો કે ઉપવલય $\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{16} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e_1 તથા $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ની ઉત્કેન્દ્રતા e_2 છે.

$$\therefore e_1 = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \Rightarrow e_1 = \sqrt{1 - \frac{16}{121}} = \sqrt{\frac{105}{121}} \text{ તથા } e_2 = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

$$\text{હવે, } e_1 = e_2$$

$$\therefore 1 - \frac{16}{121} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\therefore \frac{a^2}{b^2} = \frac{121}{16}$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{11}{4}. \text{ આથી, } a : b = 11 : 4 \quad (a > 0, b > 0)$$

જવાબ : (B)