

Osmania University Common Entrance Test

Notations :

- Options shown in **green** color and with  icon are correct.
- Options shown in **red** color and with  icon are incorrect.

Question Paper Name:	MSc Statistics 6th June 2018 Shift3
Subject Name:	M.Sc. Statistics
Creation Date:	2018-06-07 17:16:35
Duration:	90
Total Marks:	100
Display Marks:	No
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No

MSc Statistics

Group Number :	1
Group Id :	35918189
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	100

PART A

Section Id :	359181188
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	40
Number of Questions to be attempted:	40
Section Marks:	40
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	359181192
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 3591818378 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The Mean of 68 observations is 18. When each observation is divided with 6, the mean of the resulting observations is

68 పరిశీలనల యొక్క మాధ్యమము 18. ప్రతి పరిశీలనను 6తో భాగించిన ఫలిత పరిశీలనల యొక్క మాధ్యమము

Options :

1. ✖ 18
2. ✖ 9
3. ✔ 3
4. ✖ 108

Question Number : 2 Question Id : 3591818379 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The mean and mode of given data are 66 and 60 then the median of the data is

ఇచ్చిన దత్తాంశము యొక్క మాధ్యమము మరియు బహుళకములు 66 మరియు 60, అయిన ఆ దత్తాంశము యొక్క మధ్యగతము

Options :

1. ✖ 96
2. ✔ 64
3. ✖ 129
4. ✖ 62

Question Number : 3 Question Id : 3591818380 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The mean and coefficient of variation of a frequency distribution are 12 and 50%. The standard deviation is

ఒక పౌనః పున్య విభాజనము యొక్క మధ్యమము మరియు విచలనాంకములు 12 మరియు 50 శాతం దాని క్రమ విచలనము

Options :

1. ✔ 0.06

2. ✖ 24

3. ✖ 6

4. ✖ 12

Question Number : 4 Question Id : 3591818381 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The semi inter quartile range for a symmetrical data is

ఒక సౌష్ఠ్యవ దత్తాంశము కొరకు చతుర్దాంశక విచనలము

Options :

1. ✔ $\frac{2}{3}\sigma$

2. ✖ $\frac{4}{5}\sigma$

3. ✖ $\frac{5}{6}\sigma$

4. ✖ $\frac{1}{3}\sigma$

Question Number : 5 Question Id : 3591818382 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The mean, standard deviation and Karl-Pearsons coefficient of Skewness of given data are 90, 10 and 3 respectively. The median of the data is

ఇచ్చిన దత్తాంశము యొక్క మధ్యమము, క్రమ విచలనము మరియు కార్ల్ పియర్ సన్ అసౌష్ఠ్యవ గుణకములు వరుసగా 90, 10 మరియు 3. ఆ దత్తాంశము యొక్క మధ్యగతము

Options :

1. ✔ 100

2. ✖ 80

3. ✖ 89.9

4. ✖ 75

Question Number : 6 Question Id : 3591818383 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

An urn contains 25 balls numbered 1 through 25. Two balls are drawn from it under with replacement. The probability for selecting one odd and one even numbered ball is

ఒక పెట్టెలోని 25 బంతులకు 1 నుండి 25 సంఖ్యలు గలవు. తిరిగి ఉంచు పద్ధతిన రెండు బంతులను ఎంచుకొనిరి. ఒకటి సరి సంఖ్య మరియు ఒకటి బేసి సంఖ్య గల బంతులు ఎంచుకొనుటకు గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 169 / 625

2. ✔ 312 / 625

3. ✖ 156 / 625

4. ✖ None

Question Number : 7 Question Id : 3591818384 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

A restaurant serves two special dishes A and B to its customers consisting of 60% men and 40% women. 80% of men order, dish A and the rest B. 70% of women order dish B and the rest A. The total probability that the customer orders dish A is

60% పురుషులు మరియు 40% స్త్రీలు వినియోగదారులు కలిగిన ఒక రెస్టారెంటులో A మరియు B అను రెండు ప్రత్యేక వంటకములను వడ్డించుచున్నది. 80% పురుషులు A వంటకమును మిగిలివారు B వంటకమును మరియు 70% స్త్రీలు B వంటకమును మిగిలినవారు A వంటకముని ఆర్డర్ చేసిరి. మొత్తము మీద వంటకమును ఆర్డర్ చేసిన వినియోగదారుల సంభావ్యత

Options :

1. ✔ 0.6

2. ✖ 0.4

3. ✖ 0.48

4. ✖ 0.12

Question Number : 8 Question Id : 3591818385 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The probability density function of a random variable X is $f_x(x)$. Let Y be the transformed variable with $Y = a X + b$. The probability density function of a random variable Y is $f_Y(y)=$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత సాంద్రత ప్రమేయము $f_x(x)$. Y అనునది పరివర్తన చలరాశి, $Y = a X + b$ యాదృచ్ఛిక చలరాశి, Y యొక్క సంభావ్యత సాంద్రత ప్రమేయము $f_Y(y)=$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{|b|} f_x\left(\frac{y-b}{a}\right)$

2. ✖ $\frac{1}{|a|} f_x\left(\frac{y-a}{b}\right)$

3. ✖ $\frac{1}{|b|} f_x\left(\frac{y-a}{b}\right)$

4. ✔ $\frac{1}{|a|} f_x\left(\frac{y-b}{a}\right)$

Question Number : 9 Question Id : 3591818386 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Which of the following graph is used to locate the Median of the given data
క్రింద ఇచ్చిన గ్రాఫ్‌లలో ఏది ఇచ్చిన దత్తాంశము యొక్క మధ్యగతమును గుర్తించుటకు వాడతారు

Options :

Cumulative frequency curves

1. ✔ సంచిత పౌనః పున్య వక్రము

Frequency Polygon

2. ✖ పౌనః పున్య బహుభుజి

Histogram

3. ✖ సోపాన చిత్రము

Pie diagram

4. ✖ వలయ పటము

Question Number : 10 Question Id : 3591818387 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ are i.i.d. variates and $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. The $E[S_k / S_n] =$
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ సర్వసమాన స్వతంత్ర విభాజన చలరాశులు మరియు $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.
 $E[S_k / S_n] =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ k/n

3. ✖ n

4. ✖ k

Question Number : 11 Question Id : 3591818388 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The expectation of the number of failures preceding the first success in an indefinite series of independent trials with constant probability p of success is
ఖచ్చిత తత్వము లేని శ్రేణుల స్వతంత్ర ప్రయోగముల లో విజయము యొక్క సంభావ్యత స్థిర
 p అయిన మొదటి విజయము వెనుక నున్న విఫలముల సంఖ్య యొక్క అశంసిత విలువ

Options :

1. ✔ q/p

2. ✖ $1/p$

3. ✖ q

4. ✖ p/q

Question Number : 12 Question Id : 3591818389 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

$f(x) = 2x$, if $0 \leq x \leq 1$ and $f(x) = 0$ otherwise be the density function of a random variable X . The variance of the random variable X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క సాంద్రత ప్రమేయము. ఆ యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ 1/6

2. ✖ 2/3

3. ✖ 1/2

4. ✔ 5/18

Question Number : 13 Question Id : 3591818390 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let $Z = (X - \mu) / \sigma$ be a standard Normal variate. The moment generating function $M_Z(t) =$

$Z = (X - \mu) / \sigma$ అనునది క్రమ సాదారణ చలరాశి అనుకొనుము. ఘాతికలఉత్పాదక ప్రమేయము $M_Z(t) =$

Options :

1. ✖ $e^{-\mu t / \sigma} M_X(t\sigma)$

2. ✖ $e^{-\mu t} M_X(\sigma/t)$

3. ✖ $e^{\mu t / \sigma} M_X(t/\sigma)$

4. ✔ $e^{-\mu t / \sigma} M_X(t/\sigma)$

Question Number : 14 Question Id : 3591818391 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

X be a Poisson variate with parameter λ then characteristic function of X is
X అనునది λ పరామితితో కూడిన పాయిసాన్ విభాజన చలరాశి అయిన దాని X యొక్క
లాక్షణిక ప్రమేయము

Options :

1. ✖ $e^{\lambda(e^{-t} - i)}$
2. ✖ $e^{-i\lambda(e^{-t} - 1)}$
3. ✔ $e^{\lambda(e^{it} - 1)}$
4. ✖ $e^{\lambda(e^{it} + i)}$

Question Number : 15 Question Id : 3591818392 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Let X be a discrete random variable with distribution function F(x) then
 $P[a \leq x \leq b] =$
X అనునది విచ్ఛిన్న యదృచ్ఛిక చల రాశి యొక్క విభాజన ప్రమేయము F(x) అయిన
 $p[a \leq x \leq b] =$

Options :

1. ✖ $F(b) - F(a)$
2. ✔ $F(b) - F(a) + P[x=a]$
3. ✖ $F(b) - F(a) - P[x=b]$
4. ✖ $F(b) - F(a) + P[x=b]$

Question Number : 16 Question Id : 3591818393 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The Moment Generating Function of a random variable X is

$$M_X(t) = \frac{(2-t)}{2(1-t)}; \quad t < 1 \text{ then } E(X) \text{ is}$$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క ఘాతికల ఉత్పాదక ప్రమేయము $M_X(t) = \frac{(2-t)}{2(1-t)}; \quad t < 1$

అయిన $E(X)$

Options :

1. ✖ 1
2. ✖ 1/2
3. ✖ 2/3
4. ✔ 1/4

Question Number : 17 Question Id : 3591818394 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The third non-central moment (μ_3') in terms of central moments is

మూడవ ముడి ఘాతిక (μ_3') కేంద్రీయ ఘాతిక పదములలో

Options :

1. ✖ $\mu_3' = \mu_3 - 3\mu_2 \mu_1' + 2 \mu_1'^3$
2. ✖ $\mu_3' = \mu_3 + 3\mu_2' \mu_1' + 2 \mu_1'^3$
3. ✖ $\mu_3' = \mu_3 - 3\mu_2' \mu_1' - 2 \mu_1'^3$
4. ✔ $\mu_3' = \mu_3 + 3\mu_2 \mu_1' + \mu_1'^3$

Question Number : 18 Question Id : 3591818395 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The expectation of the number of heads when 'n' identical unbiased coins are tossed

n సర్వసమాన నాణెములను నిష్పక్షపాతముగా ఎగుర వేసిన, వాటి బొమ్మల సంఖ్య యొక్క అశంసిత విలువ

Options :

1. ✖ n
2. ✔ $n/2$
3. ✖ $n/4$
4. ✖ $2n$

Question Number : 19 Question Id : 3591818396 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let X be a random variable with $E(X) = 50$ and $V(X) = 100$ then $P[|X - 50| \geq 15]$ is

X అనునది $E(X) = 50$ మరియు $V(X) = 100$ తో కూడిన యాదృచ్ఛిక చలరాశి అయిన
 $P[|X - 50| \geq 15]$

Options :

1. ✔ $\leq 4/9$
2. ✖ $\leq 5/9$
3. ✖ $\geq 4/9$
4. ✖ $\geq 5/9$

Question Number : 20 Question Id : 3591818397 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let Z be a standard normal variate then $P[|Z| \leq 1.96] =$
 Z ఒక క్రమ సాధారణ చలరాశి అనుకొనిన $P[|Z| \leq 1.96] =$

Options :

1. ✖ 99%
2. ✖ 5%
3. ✔ 95%
4. ✖ 1%

Question Number : 21 Question Id : 3591818398 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be a random sample drawn from a Normal population with mean θ and variance θ^2 the distribution of its sample mean is
 $x_1, x_2, \dots, x_n$ అను యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూపమును మధ్యమము θ మరియు విస్తృతి θ^2 తో కూడిన సాధారణ లోకము నుండి ఎంచుకొనిన ఆ ప్రతిరూప మధ్యమము యొక్క విభాజనము

Options :

1. ✖ $N(\theta, \theta^2)$
2. ✔ $N(\theta, \theta^2/n)$
3. ✖ $N(n\theta, n^2\theta^2)$
4. ✖ $N(\theta, n\theta^2)$

Question Number : 22 Question Id : 3591818399 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The random variable X follows Uniform distribution over $[1, 4]$, then its distribution function $F(x)$ is
యాదృచ్ఛిక చలరాశి X అవిచ్ఛిన్న ఏక రూప విభాజనము $[1, 4]$ తో అనుసరించిన దాని సంచిత విభాజన ప్రమేయము $F(x)$

Options :

1. ✖ $x+3$
2. ✔ $(x-1)/3$
3. ✖ $1/4$
4. ✖ $1/3$

Question Number : 23 Question Id : 3591818400 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The total number of failures before the k^{th} success in the Bernoulli process leads to which distribution

బెర్నౌలి ప్రక్రియలో 'k' వ విజయమును పొందుటకు ముందుగల విఫలముల మొత్తము సంఖ్య ఏ విభాజనమునకు దారితీస్తుంది

Options :

Geometric

1. ✖ జ్యామితీయ

Negative Binomial

2. ✔ ఋణాత్మక ద్విపద

Binomial

3. ✖ ద్విపద

Poisson

4. ✖ పాయిజాన్

Question Number : 24 Question Id : 3591818401 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Let X and Y be two random variables with $f(x,y) = e^{-(x+y)}$; $x, y \geq 0$; The distribution function of X, $F_X(x)$ is

X మరియు Yలు $F_X(x,y) = e^{-(x+y)}$; $x, y \geq 0$ తో కూడిన రెండు యాదృచ్ఛిక చలరాశులు. X యొక్క సంచిత విభాజన ప్రమేయము $F_X(x)$

Options :

1. ✖ e^{-x}

2. ✔ $1 - e^{-x}$

3. ✖ $e^{-x} - 1$

4. ✖ $1 - e^{-(x+y)}$

Question Number : 25 Question Id : 3591818402 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The Cumulant Generating Function of a random variable X is

$$K_X(t) = \mu t + \frac{t^2}{2!\lambda} \mu^3 + \dots \quad \text{then } V(X) \text{ is}$$

యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క క్యుములేంట్ ఉత్పాదక ప్రమేయము

$$K_X(t) = \mu t + \frac{t^2}{2!\lambda} \mu^3 + \dots \quad \text{అయిన } V(X) =$$

Options :

1. ✗ μ
2. ✗ μ^3
3. ✓ μ^3 / λ
4. ✗ $\mu^3 / 2\lambda$

Question Number : 26 Question Id : 3591818403 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The correction factor used in rank correlation when ties occurs in ranks is

కోటి సహసంబంధములో పునరావృత కోటులున్నప్పుడు వాడు సవరణకారకము

Options :

1. ✗ $m(m-1) / 2$
2. ✗ $m(m+1) / 2$
3. ✗ $m(m^2+1) / 12$
4. ✓ $m(m^2-1) / 12$

Question Number : 27 Question Id : 3591818404 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The two regression lines with regression coefficients b_{yx} and b_{xy} are identical, then

ప్రతిగమన గుణకములు b_{yx} మరియు b_{xy} లు రెండు సర్వసమాన ప్రతిగమన రేఖలు అయిన

Options :

1. ✓ $b_{xy} b_{yx} = 1$
2. ✗ $b_{xy} + b_{yx} = 0$
3. ✗ $b_{xy} / b_{yx} = 1$
4. ✗ $b_{xy} - b_{yx} = 0$

Question Number : 28 Question Id : 3591818405 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, 5$ be a set of 5 pairs of observations with $\sum x_i = 20$, $\sum x_i^2 = 60$, $\sum y_i = 40$ and $\sum x_i y_i = 100$. The least square estimates of 'a' and 'b' in fitting the regression line $Y = aX + b$ are
(x_i, y_i), $i = 1, 2, \dots, 5$ అను 5 జతల పరిశీలనల సమితి యొక్క $\sum x_i = 20$, $\sum x_i^2 = 60$, $\sum y_i = 40$ మరియు $\sum x_i y_i = 100$. $Y = aX + b$ ప్రతిగమన రేఖను అను సంధానించుటలో మరియు b యొక్క కనిష్టవర్గ అంచనాలు

Options :

1. ✗ 3, 4
2. ✗ -3, 4
3. ✓ 3, -4
4. ✗ -3, -4

Question Number : 29 Question Id : 3591818406 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be a random sample drawn from a Normal population with mean μ and variance σ^2 . The standard error of sample mean is
 $x_1, x_2, \dots, x_n$ అను యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూపమును మధ్యమము μ మరియు విస్తృతి σ^2 తో గల సాధారణ లోకమునుండి ఎంచుకొనెను. ప్రతిరూపమధ్యమము యొక్క క్రమదోషము

Options :

1. ✗ σ

2. ✖ σ/n

3. ✖ σ^2/n

4. ✔ $\sigma/\sqrt{n}$

Question Number : 30 Question Id : 3591818407 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The random variable X follows Chi-square distribution with $2n$ degrees of freedom then its variance is

యాదృచ్ఛిక చలరాశి X స్వతంత్రతరంగాలు $2n$ తో కూడిన కైవర్గ విభాజనమును అనుసరించిన దాని విస్తృతి

Options :

1. ✖ n

2. ✖ $2n$

3. ✔ $4n$

4. ✖ $2n^2$

Question Number : 31 Question Id : 3591818408 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The distribution of $M_x(t) = (1-2t)^{-n/2}$ is

$M_x(t) = (1-2t)^{-n/2}$ గల విభాజనము

Options :

1. ✔ $\chi^2_{(n)}$

2. ✖ $\chi^2_{(n-1)}$

3. ✖ $t_{(n)}$

4. ✖ $\text{Gamma}(1,1)$

Correct : 1 Wrong : 0

The random variable X follows F - distribution with (m, n) degrees of freedom, then X^{-1} follows

యాదృచ్ఛిక చలరాశి X , స్వతంత్ర అంకాలు (m, n) తో కూడిన విభాజనమును అనుసరించిన, X^{-1} అనుసరించునది

Options :

1. ✖ $1 / F_{m,n}$

2. ✔ $F_{n,m}$

3. ✖ $1/ F_{n, m}$

4. ✖ $F_{m,n}$

Correct : 1 Wrong : 0

T_n be a statistic used to estimate the parameter θ . If $\lim_{n \rightarrow \infty} P [| T_n - \theta | < \varepsilon] \rightarrow 1$ the estimator T_n is

T_n అను సాంఖ్యికము పరామితి θ ను అంచనా వేయుటకు ఉపయోగించిన మరియు

$\lim_{n \rightarrow \infty} P [| T_n - \theta | < \varepsilon] \rightarrow 1$ అయిన T_n అనునది సాంఖ్యిక అంచన

Options :

Unbiased
1. ✖ నిష్పక్షికత

Sufficient
2. ✖ పర్యాప్తత

Consistent
3. ✔ స్థిరత్వం

efficient
4. ✖ సామర్థ్యం

Correct : 1 Wrong : 0

Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be a random sample drawn from a $B(1, \theta)$ then sufficient statistic for θ is

$x_1, x_2, \dots, x_n$ అను యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూపమును $B(1, \theta)$ నుండి తీసుకొనిన, θ కొరకు పర్యాప్తత సాంఖ్యికము

Options :

1. ☒ $\sum x_i$

2. ☐ $\bar{x}$

3. ☐ $\bar{x}/n$

4. ☐ $n \sum x_i$

Question Number : 35 Question Id : 3591818412 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

$P[\text{Accept } H_0 / H_0 \text{ is true}]$ is

$P[H_0 \text{ ను ఆమోదించడం} / H_0 \text{ నిజం}]$

Options :

1. ☐ α

2. ☐ β

3. ☒ $1-\alpha$

4. ☐ $1-\beta$

Question Number : 36 Question Id : 3591818413 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The standard error of standard deviation is

క్రమ విచలనము σ యొక్క క్రమ దోషము

Options :

1. ☐ $\sigma/\sqrt{n}$

2. ✓ $\sigma/\sqrt{2n}$

3. ✗ $\sigma^2/2\sqrt{n}$

4. ✗ $\sigma/2n$

Question Number : 37 Question Id : 3591818414 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The maximum likelihood estimate for the parameter λ of based on the random sample of size n drawn from Poisson distribution is

యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూప పరిమాణము n తో పాయిజాన్ విభాజనము λ నుండి ఎంచుకొనిన ఆదారమూగా పరామితి λ కొరకు గరిష్ఠ సంభవనీయత అంచనా

Options :

1. ✗ $\sum x_i$

2. ✓ $\bar{x}$

3. ✗ $\bar{x}/n$

4. ✗ $n \sum x_i$

Question Number : 38 Question Id : 3591818415 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The distribution of the statistic $\frac{(\bar{X} - \mu)}{S/\sqrt{n}}$ is

$\frac{(\bar{X} - \mu)}{S/\sqrt{n}}$ సాంఖ్యికము యొక్క విభాజనము

Options :

1. ✗ $t_{(n)}$

2. ✗ Z

3. ✓ $t_{(n-1)}$

4. ✖ $t_{(2n)}$

Question Number : 39 Question Id : 3591818416 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The best critical region of size α for testing $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$ can be obtained using

$H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$ ను పరీక్షించుట కొరకు ఉత్తమ సందిగ్ధ ప్రాంతము యొక్క పరిమాణము α ను రాబట్టుటకు ఉపయోగించునది

Options :

Neyman Factorization theorem

1. ✖ నేమాన్ కారక సిద్ధాంతము

Neyman Pearson lemma

2. ✔ నేమాన్ — పియర్సన్ లెమ్మా

Fisher Neyman criterion

3. ✖ ఫిషర్ - నేమాన్ విధానము

Rao-Blackwell theorem

4. ✖ రావు - బ్లాక్వెల్ సిద్ధాంతము

Question Number : 40 Question Id : 3591818417 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

When $N \rightarrow \infty$ and $M/N \rightarrow p$ then the Hyper-geometric distribution tends to
 $N \rightarrow \infty$ మరియు $M/N \rightarrow p$ అయిన అతిగుణోత్తర విభాజనము అవధి రూపము

Options :

Binomial

1. ✔ ద్విపద

Poisson

2. ✖ పాయిజాన్

Geometric

3. ✖ జ్యామితీయ

Negative Binomial

4. ✖ ఋణాత్మక ద్విపద

PART B

Section Id :	359181189
Section Number :	2
Section type :	Online
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	60
Number of Questions to be attempted:	60
Section Marks:	60
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	359181193
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 41 Question Id : 3591818418 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The relation between Yule's Coefficient of Association Q and Coefficient of Colligation Y is

యూల్ సహ చర్య గుణకము Q మరియు కొలీగేషన్ గుణకము Yల మధ్య సంబంధం

Options :

1. ✖ $Y = \frac{2Q}{1+Q^2}$

2. ✔ $Q = \frac{2Y}{1+Y^2}$

3. ✖ $Q = \frac{Y}{1+Y^2}$

4. ✖ $Q = \frac{2Y}{1+2Y^2}$

Correct : 1 Wrong : 0

In testing the hypothesis $H_0: P_1 = P_2 = P$ vs $H_1: P_1 \neq P_2$, the pooled estimate for the population proportion P is

పరీక్షించుటలో లోక అనుపాతము P కొరకు సమిష్టి అంచన

Options :

1. ✖ $\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$

2. ✖ $\frac{n_1 X_1 + n_2 X_2}{n_1 + n_2}$

3. ✔ $\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$

4. ✖ $\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{p_1 + p_2}$

Correct : 1 Wrong : 0

When sample of size n is large, the 99% confidence limits for the proportion of defectives based on sample proportion for defectives (p) and non defectives (q) is
ప్రతిరూప పరిమాణము n పెద్దదైనప్పుడు ($n \geq 30$), అనుపాతము p కొరకు 99% విశ్వసనీయ
అవధులును ప్రతిరూప అనుపాత సాంఖ్యికములు p మరియు q ల ఆధారముగా

Options :

1. ✔ $p \pm 2.58 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

2. ✖ $p \pm 1.96 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

3. ✖ $q \pm 2.58 \sqrt{\frac{pq}{n}}$

$$q \pm 1.96 \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

4. ✖

Question Number : 44 Question Id : 3591818421 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

If the frequencies of attributes A and B are $N = 50$, $(A) = 35$, $(B) = 25$, $(AB) = 15$ then the attributes A and B are said to be

A మరియు B గుణముల యొక్క పౌనః పున్యములు $N = 50$, $(A) = 35$, $(B) = 25$, $(AB) = 15$ ఆగుణములు.

Options :

Independent

1. ✖ స్వతంత్రములు

Associated

2. ✖ సాహచర్యం

Positively Associated

3. ✖ దనాత్మకసాహచర్యం

Negatively Associated

4. ✔ ఋణాత్మక సాహచర్యం

Question Number : 45 Question Id : 3591818422 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In large samples the test statistic used for testing significance difference between two standard deviations is

రెండు క్రమ విచలనముల మధ్య సార్థకత భేదమును పరీక్షించుట కొరకు ఉపయోగించు బృహత్ ప్రతిరూప సాంఖ్యిక పరీక్ష

Options :

$$\frac{s_1 - s_2}{\sqrt{\frac{2\sigma_1^2}{n_1} + \frac{2\sigma_2^2}{n_2}}}$$

1. ✖

2. ✖
$$\frac{s_1 - s_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

3. ✔
$$\frac{s_1 - s_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{2n_1} + \frac{\sigma_2^2}{2n_2}}}$$

4. ✖
$$\frac{s_1^2/n_1}{s_2^2/n_2}$$

Question Number : 46 Question Id : 3591818423 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The class of combination attribute (AB) of attributes A and B is
A మరియు B గుణముల యొక్క సమిష్ట గుణము (AB) యొక్క

Options :

1. ✖ Zero order frequency
శూన్యక్రమ పౌనః పున్యము

2. ✖ First order frequency
మొదటి క్రమ పౌనఃపున్యము

3. ✔ Second order frequency
రెండవ క్రమ పౌనః పున్యము

4. ✖ Third order frequency
మూడవ క్రమ పౌనఃపున్యము

Question Number : 47 Question Id : 3591818424 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Testing of hypothesis was introduced by
పరిక్షణ పరీక్షలను ప్రవేశ పెట్టినవారు

Options :

R.A. Fisher

1. ✖ ఆర్.ఎ. ఫిషర్

J. Neyman

2. ✔ జె.నేమాన్

E. L. Lehman

3. ✖ ఇ.యల్.లెహమాన్

A. Wald

4. ✖ ఎ.వాల్డ్

Question Number : 48 Question Id : 3591818425 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In three attributes case, the total number of all class frequencies

మూడు గుణముల దృష్ట్యా అన్ని తరగతుల మొత్తము పొందః పున్యముల సంఖ్య

Options :

1. ✔ 27

2. ✖ 12

3. ✖ 8

4. ✖ 9

Question Number : 49 Question Id : 3591818426 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In Wilcoxon Signed Rank test, when 'n' is large, the statistic T^+ is distributed with mean

విల్ కోక్సన్ గుర్తుల — కోటి పరీక్షలో బృహత్ ప్రతిరూపాలకు T^+ సాంఖ్యిక విభాజనము
యొక్క మధ్యమము

Options :

1. ✔ $n(n+1)/4$

2. ✖ $n(n+1) / 2$

3. ✖ $n(2n+1) / 4$

4. ✖ $n(n-1) / 4$

Question Number : 50 Question Id : 3591818427 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

In Wald-Wolfowitz run test, the variance of R, when the sample size is large, is

ప్రతిరూప పరిమాణము పెద్ద దైనప్పుడు వాల్డ్ — వుల్ఫ్‌విట్జ్ పరుగు పరీక్షలో R యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ $\frac{2mn(2mn - m - n)}{(m + n)(m + n - 1)}$

2. ✔ $\frac{2mn(2mn - m - n)}{(m + n)^2 (m + n - 1)}$

3. ✖ $\frac{mn(2mn - m - n)}{(m + n)^2 (m + n - 1)}$

4. ✖ $\frac{2mn(2mn - m - n)}{(m + n)(m + n + 1)}$

Question Number : 51 Question Id : 3591818428 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The test statistic used to test $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ is
 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ పరీక్షించుటకు ఉపయోగించు పరీక్ష సాంఖ్యికము

Options :

1. ✖ $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

2. ✖ $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0}$

3. ✔ $\chi^2 = \frac{ns^2}{\sigma_0^2}$

4. ✖ $\chi^2 = \frac{n(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

Question Number : 52 Question Id : 3591818429 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Two types of symbols are assigned equal in number to 10 observations. The maximum number of possible runs are
10 పరీశీలనలకు రెండు రకముల గుర్తులను సమాన సంఖ్యలో కేటాయించిరి. గరిష్ఠ పరుగుల సంఖ్యకు గల అవకాశము.

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 9

3. ✔ 10

4. ✖ 20

Question Number : 53 Question Id : 3591818430 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Errors in a statistical model are always
సాంఖ్యిక నమూనాలోని దోషములు ఎల్లప్పుడు

Options :

1. ✖ Independent
స్వతంత్రములు

2. ✖ follows $N(0, \sigma_e^2)$
 $N(0, \sigma_e^2)$ అనుసరించును

Both (a) and (b)
(a) మరియు (b)

3. ✓

Neither (a) and (b)
(a) మరియు (b) రెండు కాదు

4. ✗

Question Number : 54 Question Id : 3591818431 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

When n_1 and n_2 are large in Mann-Whitney U- test, the mean of U is

మాన్ — విట్నీ U- పరీక్షలో n_1 మరియు n_2 లు పెద్దవైనప్పుడు U యొక్క మధ్యమము

Options :

1. ✗ $(n_1 + n_2) / 2$

2. ✗ $(n_1 - n_2) / 2$

3. ✓ $n_1 n_2 / 2$

4. ✗ $n_1 n_2$

Question Number : 55 Question Id : 3591818432 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Randomization is a process in which the treatments allocated to the experiments units:

యాదృచ్ఛికీకరణ ప్రక్రియలో, ప్రయోగయూనిట్ ఏ ఉపచారాన్ని తీసుకోవడము అనేది

Options :

1. ✗ At the will of investigator
పరిశీలకుని ఇష్టానుసారము

2. ✗ In a sequence
ఒక క్రమములో

3. ✓ With equal probability
సమసంభావ్యతలో

Using ranks

కోటులనుపయోగించి

4. ✖

Question Number : 56 Question Id : 3591818433 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

In a Latin Square Design, let the sums of known observations corresponding Row, Column and Treatment of a missing observation are R' , C' , T' and let G' be the sum of all known values, then the formula for estimating the missing observation is

ఒక లాటిన్ వర్గ రచనలో, అదృశ్యపరిశీలన యొక్క అడ్డవరుస, నిలువు వరుస మరియు ఆ ఉపచారము యొక్క తెలిసిన పరిశీలనల మొత్తములు R' , C' , మరియు T' లు అయిన మరియు అన్ని తెలిసిన పరిశీలన మొత్తము G' అయిన, ఆ అదృశ్య పరిశీలనను అంచనా వేయుట కొరకు సూత్రము

Options :

1. ✖
$$\frac{R' + C' + T' - G'}{(k-1)(k-2)}$$

2. ✔
$$\frac{k(R' + C' + T') - 2G'}{(k-1)(k-2)}$$

3. ✖
$$\frac{k(R' + C' + T' - 2G')}{(k^2 - 1)}$$

4. ✖
$$\frac{k(R' + C' + T') - 2G'}{(k-1)^2(k-2)^2}$$

Question Number : 57 Question Id : 3591818434 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The formula for estimating the missing value in Randomized Block Design using the principle of least squares is given by

యాదృచ్ఛిక ఖండ రచనలోని అదృశ్య పరిశీలన విలువను అంచనా వేయు సూత్రమును కనిష్ఠ వర్గ సూత్రమును ఉపయోగించి ఇచ్చినవారు

Options :

1. ✖ W. G. Cochran
డబ్ల్యు.జి. కాక్రాన్

T. Wishart

2. ✖ టి.విషార్ట్

J. W. Tuckey

3. ✖ జె.డబ్ల్యు.ట్యుకీ

F. Yates

4. ✔ ఎఫ్. యేట్స్

Question Number : 58 Question Id : 3591818435 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

A sample size of n units selected from a population of size N units then the sampling fraction is

N యూనిట్లు గల లోకము నుండి ప్రతిరూప పరిమాణము n యూనిట్లను ఎంచుకొనిన, దాని ప్రతిరూప భిన్నము

Options :

1. ✖ N / n

2. ✖ $1 / N$

3. ✖ $1 / n$

4. ✔ n / N

Question Number : 59 Question Id : 3591818436 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In time series, Linear trend indicates

కాలశ్రేణిలో సరళ ప్రవృత్తిని తెలియచేయునది

Options :

1. ✔ Constant rate of change
స్థిర రేటు యొక్క మార్పు

Constant rate of growth

స్థిర రేటు యొక్క పెరుగుదల

2. ✖

Change in geometric progression

జ్యామితీయ శ్రేణిలో మార్పు

3. ✖

Exponential rate of change

ఘాత రేటు యొక్క మార్పు

4. ✖

Question Number : 60 Question Id : 3591818437 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In three attributes A, B, C, the frequency of (β) in terms of positive attribute frequencies is

A, B, మరియు C అను మూడు గుణములతో (β) యొక్క పానః పున్యము దనాత్మక గుణపానః పున్య పదములతో

Options :

N - (A) - (B) - (C)

1. ✖

N - (A) - (C)

2. ✖

N - (AC)

3. ✖

N - (B)

4. ✔

Question Number : 61 Question Id : 3591818438 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In time series analysis, link relatives remove the influence of

కాలశ్రేణుల విశ్లేషణలో లింకు సాపేక్షపద్ధతి తొలగించునది

Options :

Trend

ప్రవృత్తి

1. ✔

Seasonal Variation

ఋతుసంబంధ చాంచల్యము

2. ✖

Cyclic Variation

చక్రీయసంబంధ చాంచల్యము

3. ✖

Irregular Variation

క్రమ రహిత చాంచల్యము

4. ✖

Question Number : 62 Question Id : 3591818439 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The curve $y = ab^t$ stands for
వక్రము $y = ab^t$

Options :

Exponential curve

ఘాత వక్రము

1. ✔

Gompertz curve

గోంపర్ట్ వక్రము

2. ✖

Logistic curve

లాజిస్టిక్ వక్రము

3. ✖

Power curve

సామర్థ్య వక్రము

4. ✖

Question Number : 63 Question Id : 3591818440 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

$$\frac{\sum_{i=1}^n p_{1i} q_{1i}}{\sum_{i=1}^n p_{0i} q_{1i}} \times 100 \text{ index number formula is}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n p_{1i} q_{1i}}{\sum_{i=1}^n p_{0i} q_{1i}} \times 100 \text{ అను సూచి సంఖ్య}$$

Options :

Laspeyre's

1. ✖ లాస్పియర్

Paasche's

2. ✔ పాశ్చీ

Dorbish-Bowley

3. ✖ డర్బిష్ -బౌలీ

Fishers

4. ✖ ఫిషర్

Question Number : 64 Question Id : 3591818441 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The time reversal test satisfies the condition

సమయ విడర్యయ పరీక్షను తృప్తి పరుచు నియమము

Options :

1. ✔ $P_{01} \times P_{10} = 1$

2. ✖ $P_{01} \times P_{10} = 0$

3. ✖ $P_{01} / P_{10} = 1$

4. ✖ $P_{01} + P_{10} = 1$

Correct : 1 Wrong : 0

Combining of two index number series having different base periods into one series with common base period is known as

రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సూచీ సంఖ్యల శ్రేణులు విభిన్న ఆధార సమయము తో నిర్మించబడిన, ఆశ్రేణులన్నింటిని కలిపి ఒకే శ్రేణిగా వ్రాయడాన్ని అంటారు

Options :

Base Shifting

1. ✖ ఆధారమార్పు

Deflation

2. ✖ ద్రవ్యోల్పణం

Chain base index number

3. ✖ గొలుసుఆధారిత సూచిసంఖ్య

Splicing

4. ✔ జోడించడం

Correct : 1 Wrong : 0

In family budget method the cost of living index number is

కుటుంబ ఆదాయ వ్యయ పద్ధతిలో జీవన వ్యయ సూచిక

Options :

1. ✖ $\sum R_j \times 100; R_j = \frac{P_{ij}}{P_{oj}}$

2. ✖ $\frac{\sum P_{oj} w_j}{\sum w_j}$

3. ✔ $\frac{\sum R_j w_j}{\sum w_j}; R_j = \frac{P_{ij}}{P_{oj}}$

4. ✖
$$\frac{\sum P_{ij} w_j}{\sum w_j}$$

Question Number : 67 Question Id : 3591818444 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The average preferred for index numbers is
సూచీ సంఖ్యల కొరకు ప్రాధాన్యమిచ్చు సరాసరి

Options :

- Arithmetic mean
1. ✖ అంక మధ్యమము
- Geometric mean
2. ✔ గుణమధ్యమము
- Harmonic mean
3. ✖ హార మధ్యమము
- Absolute mean
4. ✖ సంపూర్ణ మధ్యమము

Question Number : 68 Question Id : 3591818445 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

In time series analysis simple average method is used for finding
కాలశ్రేణుల విశ్లేషణలో సరళ సగటు పద్ధతిని _____ కనుగొనుటకు వాడుదురు

Options :

- Trend values
1. ✖ ప్రవృత్తి విలువ
- Cyclic variations
2. ✖ చక్రీయ చాంచల్యము
- Seasonal indices
3. ✔ ఋతుసంబంధ చాంచల్యము

Irregular variations

క్రమ రహిత చాంచల్యము

4. ✖

Question Number : 69 Question Id : 3591818446 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The sales of a departmental store in Dushera and Diwali are associated with the component of a time series

ఏ కాల శ్రేణి అంశము దసర మరియు దీపావళిల నిల్వఉంచు విభాగముల యొక్క అమ్మకములకు సబంధించినది

Options :

Secular trend

1. ✖ దీర్ఘకాల ప్రవృత్తి

Seasonal variation

2. ✔ ఋతుసంబంధ చాంచల్యము

Irregular variation

3. ✖ చక్రీయ చాంచల్యము

Cyclical variation

4. ✖ క్రమ రహిత చాంచల్యము

Question Number : 70 Question Id : 3591818447 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The discrepancies between sample estimate and population parameter is termed as:

ప్రతి రూప అంచన మరియు లోకపరామితిల మధ్యనున్న చాంచల్యమును _____ అంటారు

Options :

Human error

1. ✖ మానవ దోషము

Formula error

2. ✖ సూత్రదోషము

non-sampling error

అప్రతిరూప దోషము

3. ✖

Sampling error

ప్రతిరూపదోషము

4. ✔

Question Number : 71 Question Id : 3591818448 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Systematic sampling means

క్రమానుగత ప్రతిరూపమనగా

Options :

Selection of n continuous units

1. ✖ వరుసగా n యూనిట్లను ఎంచుకొనుట

Selection of n units situated at equal distances

2. ✔ సమదూరముల వద్ద ఉన్న n యూనిట్లను ఎంచుకొనుట

Selection of n largest units

3. ✖ n పెద్ద యూనిట్లను ఎంచుకొనుట

Selection of n middle units in a sequence

4. ✖ క్రమములలోనున్న మధ్య n యూనిట్లను ఎంచుకొనుట

Question Number : 72 Question Id : 3591818449 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Distribution of income is

ఆదాయము యొక్క విభాజనము

Options :

Laplace

1. ✖ లాప్లేస్

Pareto

2. ✔ పారిటో

3. ✖ Cauchy
కోషి

4. ✖ Normal
సాధారణ

Question Number : 73 Question Id : 3591818450 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Laspeyre's index formula uses the weight of the
లాస్పియర్ సూచి సంఖ్యలో వాడు భారము

Options :

1. ✖ Current year
ప్రస్తుత సంవత్సరము

2. ✔ Base year
ఆదార సంవత్సరము

3. ✖ Arbitrarily chosen year
ఏదైన సంవత్సరము

4. ✖ Average weight of number of years
సంవత్సరముల సంఖ్య యొక్క సరాసరి భారము

Question Number : 74 Question Id : 3591818451 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Population consisting of N units, divided into 'k' Strata ($N = \sum_{j=1}^k N_j$). A sample of 'n_j'

units are to be selected from N_j units under proportional allocation is

(Assume $n = \sum_{j=1}^k n_j$)

ఒక లోకము యొక్క N యూనిట్లను k' స్తరాలు గా విభజించబడింది $N = \sum_{j=1}^k N_j$ ప్రతిరూప

పరిమాణము $n = \sum_{j=1}^k n_j$ యూనిట్లను ఎంచుకొనవలెనన్న అనుపాత కేటాయింపు పద్ధతిలో j స్తరం

నుండి n_j యూనిట్లను ఎంచుకొనుటకు సూత్రము

Options :

1. ✖ $n_j = N / n$

2. ✖ $n_j = N / N_j$

3. ✔ $n_j / N_j = n / N$

4. ✖ $n_j \times N_j = N \times n$

Question Number : 75 Question Id : 3591818452 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Fertility rate depends on _____

..... మొద సారవత్వపు రేటు ఆధారపడును

Options :

1. ✖ Total female population
మొత్తము స్త్రీ జనాభా

2. ✖ Total population
మొత్తము జనాభా

3. ✖ Number of newly born babies
కొత్త జననాల సంఖ్య

4. ✔ Female population of child bearing age
శిశువులను కనగలిగిన వయస్సులో నున్న స్త్రీ జనాభా

Question Number : 76 Question Id : 3591818453 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

A life table constructed for a age interval of 5 to 10 years is specifically known as
5 నుండి 10 సంవత్సరముల వయస్సు అంతరముగాగల జీవిత పట్టిక నిర్మాణమును ప్రత్యేకము

..... అంటారు

Options :

Grouped life table

గ్రూపుల జీవిత పట్టిక

1. ✖

Interval life table

అంతరపు జీవిత పట్టిక

2. ✖

Abridged life table

సంక్షిప్త జీవిత పట్టిక

3. ✔

Specific life table

నిర్దిష్ట జీవిత పట్టిక

4. ✖

Question Number : 77 Question Id : 3591818454 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

$D = 19 - 3p - p^2$ and $S = 5p - 1$ are Demand and Supply curves, then equilibrium price is

$D = 19 - 3p - p^2$ మరియు $S = 5p - 1$ లు గిరాకీ మరియు సప్లయ్ వక్రములు అయిన సమతుల్యధర

Options :

1. ✔ $p = 2$

2. ✖ $p = 10$

3. ✖ $p = 5$

4. ✖ $p = 1$

Question Number : 78 Question Id : 3591818455 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

In demand curve $p = a e^{-kx}$, p is the price and x is the demand. The elasticity of demand is

గిరాకీ వక్రము $p = a e^{-kx}$, లో p అనునది ధర మరియు x అనునది గిరాకీ అయిన గిరాకీ యొక్క స్థితిస్థాపకత

Options :

1. ✖ kx

2. ✔ $1/kx$

3. ✖ k^x

4. ✖ x^k

Question Number : 79 Question Id : 3591818456 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Marshall and Edge Worth price index number uses the weight

మార్షల్ — ఎడ్జ్‌వర్త్ ధర సూచి సంఖ్యలో ఉపయోగించు బారము

Options :

Quantities of the base year

1. ✖ ఆధార సంవత్సర పరిమాణము

Quantities of the current year

2. ✖ వర్తమాన సంవత్సర పరిమాణము

Combined quantities of base and current year

3. ✔ ఆధార మరియు వర్తమాన సంవత్సరముల సమిష్టిపరిమాణము

Quantities of some randomly chosen year

4. ✖ యాదృచ్ఛికముగా ఎంచు కొనిన సంవత్సర పరిమాణము

Question Number : 80 Question Id : 3591818457 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Factor Reversal Test permits the interchange of

కారణాంక విపర్యయ పరీక్షలో వేటిని పరస్పరం మార్చటానికి అనుమతిస్తుంది

Options :

Base periods

1. ✖ ఆధార సమయములు

Base and current periods

2. ✖ ఆధార మరియు వర్తమాన సమయములు

Price and quantity

3. ✔ ధర మరియు పరిమాణము

Weights

4. ✖ భారములు

Question Number : 81 Question Id : 3591818458 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

Purchasing power of money is estimated by the formula

ధనము యొక్క కొనుగోలు శక్తిని అంచనావేయు సూత్రము

Options :

Price $\times 100$

1. ✖ ధర $\times 100$

Income $\times 100$ / Consumer price index

2. ✖ ఆదాయము $\times 100$ / వినియోగ ధర సూచి

100 / Price index

3. ✔ 100 / ధర సూచి

Price index / 100

4. ✖ ధర సూచి / 100

Question Number : 82 Question Id : 3591818459 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The death rate obtained for a segment of a population is called _____

జనాభాలో ఒక ప్రాంతానికి గణించు మరణ రేటును ఏమని అంటారు

Options :

Specific death rate

1. ✔ నిర్ణీత మరణరేటు

Crude death rate

2. ✖ ముడి మరణరేటు

Standardized death rate

ప్రామాణిక మరణరేటు

3. ✖

vital index

జీవ రేటు

4. ✖

Question Number : 83 Question Id : 3591818460 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

When NSSO was started in the Finance ministry

ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖలో NSSO ఎప్పుడు ప్రారంభించారు

Options :

1. ✔ 1950

2. ✖ 1956

3. ✖ 1957

4. ✖ 1999

Question Number : 84 Question Id : 3591818461 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

C.S.O, when first time preparing the estimation of National Income, which year is used as base period

వారు మొదటిసారిగా ఏ సంవత్సరమును ఆదారముగా చేసుకొని జాతీయ ఆదాయ అంచనాలను తయారు చేశారు.

Options :

1. ✖ 1947-48

2. ✔ 1948-49

3. ✖ 1949-50

4. ✖ 1964-65

Question Number : 85 Question Id : 3591818462 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The number of possible samples of size 2 units drawn from a population of 4 units using without replacement is

4 యూనిట్లు గల లోకము నుండి 2 యూనిట్ల పరిమాణ ప్రతిరూపములను తిరిగి చేర్చని విధములో తీసుకొను అవకాశముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 6

3. ✖ 8

4. ✖ 16

Question Number : 86 Question Id : 3591818463 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

$$V(\bar{y}_{wsy}) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{k(n-1)}{N} S_{wsy}^2$

2. ✖ $\frac{N-1}{N} S^2 - \frac{n-1}{n} S_{wsy}^2$

3. ✖ $\frac{(N-n)}{N} S^2$

4. ✔ $\frac{N-1}{N} S^2 - \frac{k(n-1)}{n} S_{wsy}^2$

Question Number : 87 Question Id : 3591818464 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

. Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be a random sample of size n drawn from a population with mean μ and variance σ^2 then $E(\bar{x}^2) =$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూపమును మధ్యమము μ మరియు విస్తృతి σ^2 గల లోకము నుండి తీసుకొనిన $E(\bar{x}^2) =$

Options :

1. ✖ σ^2/n

2. ✔ $\mu^2 + \sigma^2/n$

3. ✖ $(\sigma^2/n) - \mu^2$

4. ✖ $\mu^2 + n\sigma^2$

Question Number : 88 Question Id : 3591818465 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Relative efficiency of LSD over RBD is
RBD మీద LSD సాపేక్ష సామర్థ్యము

Options :

1. ✔ $\frac{S_c^2 + (r-1)S_e^2}{rS_e^2}$

2. ✖ $\frac{S_R^2 + S_c^2 + (r-1)S_e^2}{(r+1)S_e^2}$

3. ✖ $\frac{S_t^2 + (r-1)S_e^2}{rS_e^2}$

4. ✖ $\frac{S_R^2 + S_c^2 + (r-1)rS_e^2}{(r+1)S_e^2}$

Question Number : 89 Question Id : 3591818466 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

When analyzing nxn latin square design, after estimating the missing value the degrees of freedom for error sum of squares is
లోపించిన విలువను అంచనా వేసి $n \times n$ లాటిన్ వర్గ రచనను విశ్లేషించినప్పుడు దోషవర్గ మొత్తము యొక్క స్వతంత్ర అంకము

Options :

1. ✖ $n(n-3)$

2. ✖ $(n-1)(n-2)$

3. ✖ $(n-2)(n-3)+1$

4. ✔ $(n-1)(n-2)-1$

Question Number : 90 Question Id : 3591818467 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The probability of survival of a person in the age group x to $(x+n)$ is given by
 x నుండి $(x+n)$ వయస్సు వరకు గల వ్యక్తులు జీవించి ఉండటానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✔ $\frac{l_{x+n}}{l_x}$

2. ✖ $\frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}$

3. ✖ $\frac{l_x - l_{x+n}}{l_{x+n}}$

4. ✖ $\frac{l_x}{l_{x+n}}$

Question Number : 91 Question Id : 3591818468 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The best method for finding seasonal variation is
ఋతు సంబంధ చాంచల్యము ను కనుగొను పద్ధతులలో ఉత్తమమైనది

Options :

1. ✖ Trend
సరళ సగటు పద్ధతి

Ratio to moving average

2. ✓ చలిత మధ్యమాల నిష్పత్తి

Ratio to trend

3. ✗ ప్రవత్తి నిష్పత్తి పద్ధతి

Relative average

4. ✗ లింకు సాపేక్షాల పద్ధతి

Question Number : 92 Question Id : 3591818469 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The Dorbish-Bowley price index formula is the

డర్బిష్ - బౌలి ధర సూచి సంఖ్య

Options :

Geometric mean of Laspeyre's and Paasche's price index formula

1. ✗ లాస్పియర్ మరియు పాశ్చి ధర సూచీల గుణమధ్యమము

Arithmetic mean of Laspeyre's and Paasche's price index formula

2. ✓ లాస్పియర్ మరియు పాశ్చి ధర సూచీల అంకమధ్యమము

Weighted mean of Laspeyre's and Paasche's price index formula

3. ✗ లాస్పియర్ మరియు పాశ్చి ధర సూచీల భార మధ్యమము

Harmonic mean of Laspeyre's and Paasche's price index formula

4. ✗ లాస్పియర్ మరియు పాశ్చి ధర సూచీల హార మధ్యమము

Question Number : 93 Question Id : 3591818470 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

If the population of the two consecutive censuses is known then the formula for population estimate $\hat{P}_t$ in the inter censal year 't' is

రెండు వరుస జనాభా లెక్కలలో జనాభా తెలిసినప్పుడు లోకపు అంచన $\hat{P}_t$, 't' అంతర జనాభాలెక్కల సంవత్సరములో అంచనా వేయుటకు సూత్రము

Options :

1. ✗ $\hat{P}_t = P_0 + \frac{N}{n}(P_1 - P_0)$

2. ✖ $\hat{P}_t = P_1 + \frac{n}{N}(P_1 - P_0)$

3. ✖ $\hat{P}_t = P_0 + \frac{N}{n}(P_0 - P_1)$

4. ✔ $\hat{P}_t = P_0 + \frac{n}{N}(P_1 - P_0)$

Question Number : 94 Question Id : 3591818471 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

If l_x is the number of persons living at the age in the mid of x and $(x+1)$ years then the relation between l_x and L_x

l_x అనునది x నుండి $x+1$ సంవత్సరముల మధ్యవయస్సు గల వ్యక్తులు జీవించ ఉన్న సంఖ్య అయిన l_x మరియు L_x మధ్య సంబంధము

Options :

1. ✔ $L_x = \frac{1}{2}(l_x + l_{x+1})$

2. ✖ $L_x = \frac{x}{2} + l_x$

3. ✖ $L_x = l_{x+1/2}$

4. ✖ $L_x = \frac{l_x}{2}$

Question Number : 95 Question Id : 3591818472 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

A trend is linear iff

ప్రవృత్తిని సరళమని ఎప్పుడు అంటారు

Options :

The growth or decay rate is constant

పెరుగుదల లేదా క్షీణత రేటు స్థిరము

1. ✔

The growth or decay follows geometric law

2. ✖ పెరుగుదల లేదా క్షీణతలు జ్యామితీయ నియమాన్ని అనుసరించును

Change is constant in the beginning but stops after some time

3. ✖ మొదలులో స్థిరమార్పు కాని తరువాత కొంతకాలానికి ఆగిపోతుంది

The growth or decay rate follows exponential law

4. ✖ పెరుగుదల లేదా క్షీణత రేటు ఘాతనియమాన్ని అనుసరించును

Question Number : 96 Question Id : 3591818473 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

In the computation of moving average a group of period considers

చలిత మధ్యమాలను గణించేటప్పుడు సమయ సమూహాలను తీసుకుంటారు

Options :

1. ✖ 2 years
2 సంవత్సరములు

2. ✖ 3 years
3 సంవత్సరములు

3. ✖ 5 years
5 సంవత్సరములు

4. ✔ the period forms a cycle
సమయము ఒక చక్రమును ఏర్పడువిధంగా

Question Number : 97 Question Id : 3591818474 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

The distribution involved in the sign test is

గుర్తుల పరీక్షలో దాని ఉన్న విభాజనము

Options :

1. ✖ Normal
సాధారణ

2. ✖ t

Chi-square

3. ✖ కై - వర్గ

Binomial

4. ✔ ద్విపద

Question Number : 98 Question Id : 3591818475 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Ordered statistics is a sequence of
క్రమ సాంఖ్యికాలు అనేవి వీటి యొక్క క్రమము

Options :

Observations

1. ✔ పరిశీలనల

ranks

2. ✖ కోటులు

natural numbers

3. ✖ సహజసంఖ్యలు

integers

4. ✖ పూర్ణాంకములు

Question Number : 99 Question Id : 3591818476 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical
Correct : 1 Wrong : 0

Let the sample mean be $\bar{y}$ used to estimate the population mean $\bar{Y}$ under with
and without replacements of simple random sampling then

లోక మధ్యమము $\bar{y}$ ను అంచనా వేయుటకు ఉపయోగించు ప్రతిరూప మధ్యమము $\bar{y}$ ను సరళ
యాదృచ్ఛిక ప్రతిరూపము తిరిగి చేర్చుమరియు చేర్చని విధముగా తీసుకొనిన

Options :

1. ✖ $V(\bar{y})_{\text{srswr}} = V(\bar{y})_{\text{srswor}}$

2. ✖ $V(\bar{y})_{\text{srswr}} \leq V(\bar{y})_{\text{srswor}}$

3. ✔ $V(\bar{y})_{\text{srswr}} \geq V(\bar{y})_{\text{srswor}}$

4. ✖ $V(\bar{y})_{\text{srswor}} = 1/V(\bar{y})_{\text{srswr}}$

Question Number : 100 Question Id : 3591818477 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Correct : 1 Wrong : 0

The sample size for the j^{th} stratum n_j , for fixed n , under optimum allocation is
j వ స్తరము యొక్క ప్రతిరూప పరిమాణము j ను n స్థిరమైనపుడు అత్యనుకూల కేటాయింపు

Options :

1. ✔
$$\frac{nW_jS_j}{\sum_{j=1}^k W_jS_j}$$

2. ✖
$$\frac{W_jS_j}{\sum_{j=1}^k S_j}$$

3. ✖
$$\frac{nW_jS_j^2}{\sum_{j=1}^k W_jS_j^2}$$

4. ✖
$$\frac{nW_jS_j}{\sum_{j=1}^k W_jS_j^2}$$