

● કાર્બનિક સંયોજનોમાં વધારાનાં તત્ત્વો (N, S હેલોજન)ની પરખ

કાર્બનિક સંયોજનો કાર્બન, હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજન આ ત્રણ કાયમ માટે ધરાવે છે. આ સિવાય કાર્બનિક સંયોજનોમાં વધારાનાં નાઈટ્રોજન, સલ્ફર, હેલોજન અને ફોસ્ફરસ જેવા તત્ત્વો પણ હોય છે. આ બધા જ તત્ત્વોને વધારાનાં તત્ત્વો કહે છે.

લેસાઈન કસોટી વડે N, S, P અને X (હેલોજન)ની પરખ સરળતાથી થઈ શકે છે, જે નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે :


● લેસાઈન કસોટીનો હેતુ

તત્ત્વોની કસોટી મોટે ભાગે આયન સ્વરૂપે થતી હોય છે. પરંતુ કાર્બનિક સંયોજનો સ્વભાવે સહસંયોજક હોવાથી તેમનું આયનીકરણ થતું નથી. પરિણામે કાર્બનિક સંયોજનોમાં રહેલાં હાજર તત્ત્વોને આયન સ્વરૂપે ફેરવવા માટે તેમને સોડિયમ ધાતુ સાથે તોડવામાં (Fused) આવે છે.

● લેસાઈન દ્રાવણની બનાવટ


સૌપ્રથમ પોર્સેલિન ડિશમાં નિસ્કંદિત પાણી લો. ત્યાર બાદ નાની ફ્યુઝન નળીમાં શુદ્ધ સોડિયમ ધાતુનો નાનો ટુકડો મૂકી ગરમ કરો. સોડિયમ ધાતુ પીગળે એટલે તેમાં થોડો કાર્બનિક પદાર્થ ઉમેરી મિશ્રણને પ્રથમ ધીમેથી અને પછી ઊંચા તાપમાને લાલચોળ થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરો. ત્યાર બાદ તરત જ તેને નિસ્કંદિત પાણીભરેલી પોર્સેલિન ડિશમાં નાખો કે જેથી તે ફૂટશે. આવી બે-ત્રણ ફ્યુઝન નળીનું પુનરાવર્તન કરી પોર્સેલિન ડિશમાંના દ્રાવણને આશરે બે મિનિટ ઉકળવા દો. ઉકાળેલા દ્રાવણને ગાળી લો. ગાળણથી મળતા દ્રાવણને લેસાઈન દ્રાવણ કહે છે.

ફ્યુઝન પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં N, S અને X એ અનુક્રમે NaCN, Na₂S અને NaXમાં ફેરવાય છે.




● નાઈટ્રોજનની પરખ

લેસાઈન દ્રાવણને એક કસનળીમાં લઈ થોડું ગરમ કરી તેમાં FeSO₄નું તાજું બનાવેલું દ્રાવણ ઉમેરવાથી સોડિયમ ફેરોસાયનાઈડ બને છે. ફેરોસાયનાઈડના દ્રાવણને વધુ ગરમ કરવાથી કેટલાક ફેરસ આયનનું ફેરિક આયનમાં રૂપાંતર થાય છે. ત્યાર બાદ દ્રાવણને મંદસલ્ફ્યુરિક એસિડ વડે તટસ્થ કરવામાં આવે છે. અહીં ફેરિક આયનની ફેરોસાયનાઈડ સાથેની પ્રક્રિયાથી પ્રુસિયન વાદળી રંગનો ફેરિક-ફેરોસાયનાઈડ મળે છે, જે કાર્બનિક પદાર્થમાં નાઈટ્રોજનની હાજરી દર્શાવે છે.



જ્યારે નાઈટ્રોજન અને સલ્ફર બંનેની હાજરી હોય, ત્યારે ફેરિક થાયોસાનેટ બનવાથી લોહી જેવો લાલ રંગ ઉદ્ભવે છે જે કાર્બનિક સંયોજનમાં N અને S બંનેની હાજરી સૂચવે છે.




● સલ્ફરની પરખ

લેસાઈન દ્રાવણની મદદથી સલ્ફરની પરખ નીચેની બે કસોટીઓ દ્વારા થાય છે :


(a) સોડિયમ નાઈટ્રોપ્રુસાઈડ કસોટી :

- લેસાઈન દ્રાવણમાં તાજા બનાવેલા સોડિયમ નાઈટ્રોપ્રુસાઈડના થોડાં ટીપાં ઉમેરવાથી સોડિયમ થાયોનાઈટ્રો બનવાથી જાંબલી રંગ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સલ્ફરની હાજરી દર્શાવે છે.



(b) લેડ એસિટેટ કસોટી :



- લેસાઈન દ્રાવણમાં એસિટિક એસિડ અને લેડ એસિટેટનું દ્રાવણ ઉમેરવાથી કાળા રંગના અવક્ષેપ મળે છે જે સલ્ફરની હાજરી દર્શાવે છે.




● હેલોજનની પરખ

- (a) હેલોજનની લેસાઈન કસોટી કરતાં પહેલાં જો લેસાઈન દ્રાવણમાં સાયનાઈડ કે સલ્ફાઈડ હાજર હોય, તો તેને દૂર કરવા જરૂરી છે. લેસાઈન દ્રાવણમાં નાઈટ્રિક એસિડ એસિડ ઉમેરી, ગરમ કરતાં સાયનાઈડ અને સલ્ફાઈડ આયનો અનુક્રમે હાઈડ્રોજન સાયનાઈડ અને હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ વાયુ સ્વરૂપે દ્રાવણમાંથી દૂર થાય છે.


- ત્યાર બાદ આ દ્રાવણમાં સિલ્વર નાઈટ્રેટનું દ્રાવણ ઉમેરવાથી, જો સફેદ અવક્ષેપ મળે અને તે એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડના દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થાય, તો ક્લોરિન હાજર છે.



- જો આછા પીળા રંગના અવક્ષેપ મળે અને તે એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડના દ્રાવણમાં મુશ્કેલીથી થોડા પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય થાય, તો બ્રોમિન હાજર છે.
- જો પીળા રંગના અવક્ષેપ મળે અને તે એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડના દ્રાવણમાં અદ્રાવ્ય રહે, તો આયોડિન હાજર છે.



- (b) હેલોજનની પરખ બીજી કસોટી દ્વારા પણ કરી શકાય છે. લેસાઈન દ્રાવણમાં નાઈટ્રિક એસિડ ઉમેર્યા બાદ તેમાં કાર્બનિક દ્રાવક ક્લોરોફોર્મ અથવા કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઈડનાં થોડાં ટીપાં ઉમેરી મિશ્રણને હલાવો, ઉત્પન્ન થતો હેલોજન કાર્બનિક દ્રાવકમાં શોષાવાથી કાર્બનિક દ્રાવક રંગીન બનશે. કાર્બનિક દ્રાવક જો રંગવિહીન રહે, તો ક્લોરિન હાજર, જો બદામી રંગ મળે, તો બ્રોમિન હાજર અને જો જાંબલી રંગ મળે, તો આયોડિન હાજર છે.



- નીચેનામાંથી કયો હેલોજન બાઈલસ્ટાઈન કસોટી પ્રત્યે નિષ્ક્રિય છે ?
(A) F (B) Cl (C) Br (D) I
- નાઈટ્રોજન, સલ્ફર અને ક્લોરિન ધરાવતા એક કાર્બનિક સંયોજનને વધુ પ્રમાણમાં સોડિયમ સાથે તોડતાં, લેસાઈન દ્રાવણમાં નીચેનામાંથી કયું સંયોજન હાજર હશે નહિ ?
(A) Na_2S (B) NaCN (C) NaCl (D) NaCNS
- કાર્બનિક સંયોજનમાં વધારાનાં તત્વોની પરખ માટેની લેસાઈન કસોટીમાં નીચેનામાંથી કયું સંયોજન ફેરિક આયન સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા લોહી જેવો લાલ રંગ આપશે ?
(A) NaCN (B) Na_2S (C) NaCNS (D) NaCNO
- લેડ એસિટેટ કસોટી વડે સલ્ફરની પરખ માટે લેસાઈન દ્રાવણને કોના વડે એસિડિક કરવામાં આવે છે ?
(A) મંદ H_2SO_4 (B) મંદ HCl (C) એસિટિક એસિડ (D) ત્રણેયમાંથી ગમે તે
- હેલોજનની કસોટી કરતાં પહેલાં લેસાઈન દ્રાવણને કોની સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે ?
(A) મંદ HCl (B) NaOH (C) સાંદ્ર HNO_3 (D) ત્રણેયમાંથી ગમે તે.
- CCl_4 ધરાવતા લેસાઈન દ્રાવણમાં Cl_2 વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે. જો લેસાઈન દ્રાવણ NaBr અને NaI બંને ધરાવતું હોય, તો CCl_4 ના સ્તર પર પ્રથમ કયો રંગ દેખાશે ?
(A) જાંબલી રંગ (B) બ્રાઉન રંગ (C) લીલો રંગ (D) પીળો રંગ
- કયા ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ AgNO_3 સાથે સફેદ અવક્ષેપ આપે છે, જે વધારે NH_4OH માં દ્રાવ્ય છે.
(A) Cl^- (B) Br^- (C) I^- (D) NO_3^-
- ફેરિક આયન એ પ્રુસિયન વાદળી રંગના અવક્ષેપ કયા કારણે બનાવે છે ?
(A) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (B) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (C) KMnO_4 (D) $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- લેસાઈન દ્રાવણ સાથે એક સંયોજન નાઈટ્રોજનની ધન કસોટી આપે છે, તો તે કાર્બનિક સંયોજન કયું હશે ?
(A) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ (B) $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
(C) $\text{Fe}(\text{CN})_3$ (D) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$
- સલ્ફાનિલિક એસિડને સોડિયમ ધાતુ સાથે ફોડવાથી લેસાઈન દ્રાવણ નીચેનામાંથી શું ધરાવશે છે ?
(A) માત્ર NaCN (B) Na_2S
(C) NaCN અને Na_2S (D) NaCN , NaCNS અને Na_2S


જવાબો : 1. (A), 2. (D), 3. (C), 4. (C), 5. (C), 6. (A), 7. (A), 8. (B), 9. (A), 10. (D)

- કાર્બનિક સંયોજનોમાં નીચેના ક્રિયાશીલ સમૂહોની પરખ-હાઈડ્રોક્સિલ (આલ્કોહોલિક અને ફિનોલીક), કાર્બોનિલ-(આલ્ડીહાઈડ અને કિટોન), કાર્બોક્સિલ અને એમિનો

જુદા જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહોની પરખ માટેની કસોટીઓ નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે.


- આલ્કોહોલિક ($-\text{OH}$) સમૂહ

(a) સોડિયમ કસોટી : એક કસનળીમાં થોડું કાર્બનિક સંયોજન લઈ, તેમાં સોડિયમ ધાતુનો નાનો ટુકડો ઉમેરો. આથી હાઈડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થવાથી ધૂંધળું સ્તર રચાશે.




(b) એસ્ટર કસોટી :

- (i) કાર્બનિક સંયોજનને સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં એસિટિક એસિડ સાથે ગરમ કરવાથી તેમાં એસ્ટર બનવાથી ફળ જેવી મીઠી વાસ જોવા મળશે.



- (ii) આલ્કોહોલ એ 3, 5-ડાયનાઇટ્રો બેન્ઝોઇલ સથે સ્ફટિકમય એસ્ટર આપે છે.



સ્ફટિકમય ઈથર


(c) લ્યુકાસ કસોટી :

- આ કસોટી પ્રયોગશાળામાં પ્રાથમિક (1°), દ્વિતીયક (2°) અને તૃતીયક (3°) આલ્કોહોલની પરખ માટે ઉપયોગી છે.
- આ કસોટીમાં આલ્કોહોલના નમૂનામાં નિર્જળ ઝિંક ક્લોરાઇડ અને સાંદ્ર હાઇડ્રોકલોરિક એસિડ ઉમેરી મિશ્રણને બરાબર હલાવી સહેજ ગરમ કરીને થોડી વાર રાખવામાં આવે છે.
- જો મિશ્રણની સપાટી ઉપર ખૂબ જ થોડા સમયમાં તૈલબિંદુ મુક્ત થાય તો 3° આલ્કોહોલ.
- જો પાંચ મિનિટમાં દ્રાવણ દૂધિયું થાય તો 2° - આલ્કોહોલ.
- જો મિશ્રણ પ્રક્રિયા થયા વિના ચોખ્ખું રહે તો 1° - આલ્કોહોલ.

● ફિનોલિક ($-OH$) સમૂહ



(a) ફેરિક ક્લોરાઇડ કસોટી :

- કાર્બનિક સંયોજનના જલીય અથવા આલ્કોહોલિક દ્રાવણમાં થોડાંક ટીપાં ફેરિક ક્લોરાઇડ ($FeCl_3$)ના ઉમેરવાથી લીલો, ભૂરો અથવા જાંબલી રંગ ફિનોલની હાજરી દર્શાવે છે.



(b) લિબરમેન નાઇટ્રોસો પ્રક્રિયા :



- $NaNO_2$ ના સ્ફટિક ધરાવતી એક કસનળીમાં થોડા પ્રમાણમાં કાર્બનિક પદાર્થ ઉમેરી કસનળીને ઠંડી કરી, તેમાં 1 મિલિ સાંદ્ર H_2SO_4 ઉમેરવાથી લીલામય વાદળી રંગ ઉદ્ભવે છે. જેમાં વધારે પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરતાં લાલ જલીય દ્રાવણ ફરીથી ડાર્ક લીલો અથવા ભૂરામાં ફેરવાય છે, જ્યારે તેને $NaOH$ વડે બેઝિક કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ફિનોલની હાજરી દર્શાવે છે.



ઓયોડોફિનોલ (વાદળી)

(c) પ્થેલિન કસોટી :

- જ્યારે ફિનોલને સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં પ્થેલિક એસિડ સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે રંગવિહીન સંયોજન ફિનોપ્થેલિન આપે, છે જે બેઝિક માધ્યમમાં ગુલાબી બને છે.




- ફિનોપ્થેલિન એસિડ બેઈઝ અનુમાપનમાં સૂચક તરીકે વપરાય છે, જે એસિડિક માધ્યમમાં રંગવિહીન અને બેઝિક માધ્યમમાં ગુલાબી હોય છે.

● આલ્ડિહાઇડ (-CHO) સમૂહ


(a) ટોલેન્સ કસોટી (રજતદર્પણ કસોટી)

- આલ્ડિહાઇડ અને તાજા બનાવેલા એમોનિયાયુક્ત સિલ્વર નાઈટ્રેટના દ્રાવણ (ટોલેન્સ પ્રક્રિયક)ને હલાવી સહેજ ગરમ કરી થોડી વાર મૂકી રાખવામાં આવે છે. અહીં ટોલેન્સ પ્રક્રિયકનું રિડક્શન સિલ્વર ધાતુમાં થાય છે. જે ક્સનળીની અંદરની દીવાલ પર જમા થતાં, તેનો ચળકાટ અરીસા જેવો દેખાય છે, જે કાર્બનિક પદાર્થમાં આલ્ડિહાઇડ સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.




(b) ફેલ્ડિંગ કસોટી :

- ફેલ્ડિંગ દ્રાવણ A ($CuSO_4$ દ્રાવણ) અને ફેલ્ડિંગ દ્રાવણ B (આલ્કલીયુક્ત સોડિયમ-પોટેશિયમ ટાર્ટ્રેટ)ને સરખા પ્રમાણમાં મિશ્ર કરો. મિશ્રણને આલ્ડિહાઇડ સાથે ગરમ કરતાં, ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડના લાલ અવક્ષેપ મળે છે, જે સંયોજનમાં આલ્ડિહાઇડની હાજરી દર્શાવે છે.




(c) સ્કિફની કસોટી :

- સ્કિફના પ્રક્રિયકમાં કાર્બનિક પદાર્થનાં થોડાં ટીપાં ઉમેરીને, તેને બરાબર હલાવો. આથી તેમાં થોડા જ સમયમાં ઘાટો લાલ અથવા જાંબલી રંગ ઉદ્ભવશે, જે આલ્ડિહાઇડ સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.



સ્કિફ પ્રક્રિયક (રંગવિહીન)




(d) બેનેડિક્ટ કસોટી :

- કાર્બનિક સંયોજનને 2-3 મિલિ બેનેડિક્ટ દ્રાવણ સાથે ઉકાળો. જો થોડા જ સમયમાં લાલ-પીળા અવક્ષેપ ઉદ્ભવે તો સંયોજનમાં આલ્ડિહાઇડ સમૂહની હાજરી નક્કી છે. આ કસોટી માત્ર એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ આપે છે.

• કિટોન (>C=O) સમૂહ

(a) 2, 4 ડાયનાઇટ્રો ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝાઇન કસોટી :

- એક કસનળીમાં કાર્બનિક સંયોજનનાં થોડાં ટીપાં લઈ તેમાં 2 મિલિ પ્રક્રિયક અને એક ટીપું સાંદ્ર H_2SO_4 નું ઉમેરી હલાવો અને પાંચ મિનિટ મૂકી રાખો. જો સંયોજન કાર્બોનિલ સમૂહ ધરાવતું હશે, તો પીળા અથવા નારંગી અવક્ષેપ હાઇડ્રેઝોન બનવાથી ઉદ્ભવશે.



કાર્બનિક સંયોજન

2, 4 ડાયનાઇટ્રો

ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝાઇન

પીળા અથવા નારંગી અવક્ષેપ

(b) સોડિયમ બાયસલ્ફાઇટ કસોટી :

- 1 મિલિ પ્રમાણિત સોડિયમ બાયસલ્ફાઇટના દ્રાવણમાં ખૂબ જ થોડા પ્રમાણમાં કાર્બનિક સંયોજન ઉમેરી હલાવવાથી સફેદ અવક્ષેપ મળે છે, જે સંયોજનમાં કાર્બોનિલ સમૂહની હાજરી સૂચવે છે.



સફેદ સ્ફટિકમય અવક્ષેપ

(c) સોડિયમ નાઇટ્રોપ્રુસાઇડ કસોટી :

- સોડિયમ નાઇટ્રોપ્રુસાઇડ ($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$)ના દ્રાવણમાં થોડું કાર્બનિક સંયોજન ઉમેરી તેને બેઝિક બનાવવા માટે 2-3 ટીપાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ઉમેરવાથી લાલ અથવા પર્પલ (Purple) રંગની હાજરી કિટોનની હાજરી દર્શાવે છે.

● કાર્બોક્સિલિક (–COOH) સમૂહ

(a) લિટમસ પેપર કસોટી :

- વાદળી લિટમસ પેપરને સંયોજનના દ્રાવણમાં બોળવાથી તે લાલમાં ફેરવાય છે, જે કાર્બોક્સિલિક સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.

(b) સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ કસોટી :

- એક કસનળીમાં કાર્બનિક સંયોજનનો થોડોક જથ્થો લઈ તેમાં સોડિયમ બાયકાર્બોનેટનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ઉમેરવાથી, CO₂ વાયુના ઉભરા ઉદ્ભવે જે –COOH સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.




બેન્ઝોઈક એસિડ

સોડિયમ બેન્ઝોએટ

(c) એસ્ટર બનવું :


- કાર્બનિક સંયોજનના થોડાક જથ્થામાં ઈથાઈલ આલ્કોહોલ અને થોડી માત્રામાં સાંદ્ર H₂SO₄ ઉમેરીને દ્રાવણને ઠંડું પાડી, પાણીભરેલા પાત્રમાં ઉમેરવાથી, ફળ જેવી મીઠી વાસ એસ્ટર બનાવાથી આવશે, જે કાર્બોક્સિલિક સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.



● પ્રાથમિક એમાઈન (–NH₂) સમૂહ


(a) કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી :

- એલિફેટિક અને એરોમેટિક પ્રાથમિક એમાઈને ક્લોરોફોર્મ (CHCl₃) અને આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ હાઈડ્રોસાઈડ (KOH) સાથે ગરમ કરતાં ખરાબ વાસ ધરાવતો ઝેરી આઈસો સાયનાઈડ (કાર્બાઈલ એમાઈન) બને છે, જે કાર્બનિક સંયોજનમાં પ્રાથમિક એમાઈનની હાજરી દર્શાવે છે.




(b) ડાય કસોટી :

- થોડા કાર્બનિક પદાર્થને મંદ HClમાં ઓગાળીને ઠંડું પાડો, ત્યાર બાદ તેમાં 10 % જલીય NaOHનું દ્રાવણ ઉમેરો. આ સમગ્ર મિશ્રણને બેઝિક β-નેપ્થોલ ધરાવતા બીકરમાં ઉમેરો. આથી લાલ અથવા નારંગી ડાય ઉદ્ભવશે, જે સંયોજનમાં એરોમેટિક પ્રાથમિક એમાઈન સમૂહની હાજરી દર્શાવે છે.



એનિલિન

બેન્ઝિન ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઈડ




બેન્ઝિન ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઈડ β-નેપ્થોલ

ફિનાઈલ એઝો β-નેપ્થોલ (લાલ ડાય)

- પ્રાથમિક (1°), દ્વિતીયક (2°) અને તૃતીયક (3°) એમાઈનનું અલગીકરણ નાઈટ્રસ એસિડ કસોટી અને હિન્સબર્ગની કસોટી દ્વારા થઈ શકે છે.

11. એક સંયોજન NaHCO_3 સાથેની પ્રક્રિયાથી CO_2 વાયુ મુક્ત કરે છે, તો તે સંયોજન કયો સમૂહ ધરાવતું હશે ?
 (A) $-\text{CHO}$ સમૂહ (B) ફિનોલિક $-\text{OH}$ સમૂહ (C) $-\text{NH}_2$ સમૂહ (D) $-\text{COOH}$ સમૂહ
12. એસિટોન અને α -હાઇડ્રોક્સિ એસિટોનને જુદા પાડવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કસોટી ઉપયોગી છે ?
 (A) ટોલેન્સ કસોટી (B) આયોડોફોર્મ કસોટી (C) A અને B બંને. (D) એક પણ નહિ.
13. કાર્બનિક પૃથક્કરણમાં 2, 4-ડાયનાઇટ્રો ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝાઇન પ્રક્રિયક નીચેનામાંથી કયા ક્રિયાશીલ સમૂહની પરખ માટે ઉપયોગી છે ?
 (A) આલ્કોહોલ (B) એસિડ (C) આલ્ડિહાઇડ (D) એમાઇન
14. એક કાર્બનિક સંયોજન ધન આયોડોફોર્મ કસોટી અને ટોલેન્સ કસોટી આપે છે, તો તે સંયોજન કયું હશે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (C) CH_3CHO (D) CH_3COCH_3
15. એક સંયોજન NaHCO_3 સાથે CO_2 વાયુ મુક્ત કરે છે તેમજ તટસ્થ FeCl_3 સાથે રંગ આપે છે તો તે સંયોજન કયું હશે ?



16. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં આલ્કોહોલિક સમૂહની પરખ કોના દ્વારા થઈ શકે છે.
 (A) સિરિક એમોનિયમ નાઇટ્રેટ (B) સોડિયમ ધાતુ
 (C) એસ્ટર નિર્માણ કસોટી (D) આપેલ ત્રણેય
17. એક કાર્બનિક સંયોજન કે જે ટોલેન્સ પ્રક્રિયક કે ફેલ્ડિંગ દ્રાવણ વડે રિડક્શન પામતું નથી, પરંતુ સિરિક એમોનિયમ નાઇટ્રેટ દ્રાવણ સાથે લાલ રંગ આપે છે, તો તે સંયોજન કયું હશે ?
 (A) ફિનોલ (B) આલ્ડિહાઇડ (C) કિટોન (D) આલ્કોહોલ
18. ફિનોલ્ફથેલીન માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) તે પ્થેલિનડાય છે.
 (B) તે એસિડ-બેઇઝ સૂચક તરીકે ઉપયોગી છે.
 (C) તે ફિનોલની પ્થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં થતી સંઘનન પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવાય છે.
 (D) તે બેઝિક માધ્યમમાં રંગવિહીન, પરંતુ એસિડિક માધ્યમમાં ગુલાબી હોય છે.
19. ફળ જેવી મીઠી વાસ ઉદ્ભવે છે જ્યારે...
 (A) પ્રાથમિક એમાઇનની એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે.
 (B) આલ્કોહોલની ગ્લેસિયલ એસિટિક એસિડ સાથે સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે.
 (C) આલ્ડિહાઇડની હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે.
 (D) કાર્બોક્સિલિક એસિડની NaHCO_3 ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે.
20. એસિટો ફિનોનમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડને અલગ પાડવા માટે નીચેનામાંથી કયો પ્રક્રિયક ઉપયોગી છે ?
 (A) સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ (B) સોડિયમ બાયસલ્ફાઇટ (C) સોડિયમ બાયસલ્ફેટ (D) સોડિયમ સલ્ફાઇટ


21. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) ફેલ્ડિંગ A દ્રાવણ એ જલીય CuSO_4 નું દ્રાવણ છે.
 (B) ફેલ્ડિંગ B દ્રાવણ એ રોશેલ-ક્ષારનું બેઝિક દ્રાવણ છે.
 (C) રોશેલ ક્ષારનું કાર્ય બેઝિક માધ્યમમાં Cu^{2+} આયનને દ્રાવણ સ્થિતિમાં રાખવાનું છે.
 (D) એલિફેટિક અને એરોમેટિક એમ બંને પ્રકારના આલ્કિલાઇડ ફેલ્ડિંગ દ્રાવણનું રિડક્શન કરીને Cu_2O ના લાલ અવક્ષેપ આપે છે.
22. એસિટોનમાંથી એસિટાલ્કિલાઇડને કોના દ્વારા જુદા પાડી શકાય છે ?
 (A) NaHSO_3 (B) 2, 4-ડાયનાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રેઝાઇન
 (C) NaOI (D) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\text{OH}^-$
23. એક કાર્બનિક સંયોજન NaHCO_3 ના દ્રાવણ સાથે ઊભરા આપે છે. તેને NaOH માં ઓગાળીને જ્યારે તેમાં મંદ HCl ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે અવક્ષેપન પામે છે, તો તે સંયોજન કયું હશે ?
 (A) એસિટિક એસિડ (B) બેન્ઝોઇક એસિડ (C) ઓક્ઝેલિક એસિડ (D) ફોર્મિક એસિડ
24. એક કાર્બનિક સંયોજન કે જે મંદ HCl માં ઓગાળીને કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી આપે છે, તો તે સંયોજન કયું હશે ?
 (A) 1° - એમાઇન (B) 2° - એમાઇન (C) 3° - એમાઇન (D) કાર્બોક્સિલિક એસિડ
25. કાર્બનિક સંયોજનને એઝોડાય કસોટી આપવા માટે કયા કાર્બનિક સંયોજનોની જરૂર પડે છે ?
 (A) 1° - એલિફેટિક એમાઇન અને CHCl_3 (B) 1° - એરોમેટિક એમાઇન અને 1-નેપ્થોલ
 (C) 1° - એરોમેટિક એમાઇન અને ફિનોલ (D) 3° - એલિફેટિક એમાઇન અને β -નેપ્થોલ
26. P-એમિનો એસિટોફિનોનમાં હાજર ક્રિયાશીલ સમૂહની કસોટી કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કસોટી કરવી પડે ?
 (A) એઝોડાય કસોટી અને NaHCO_3 કસોટી (B) FeCl_3 કસોટી અને એઝોડાય કસોટી
 (C) કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી (D) કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી અને એઝોડાય કસોટી
27. નીચેનામાંથી કોણ ફેલ્ડિંગ દ્રાવણ સાથે Cu_2O ના લાલ અવક્ષેપ આપશે ?
 (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CHO}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$
28. કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટીમાં ખરાબ અને ઝેરી વાસ ઉદ્ભવવાનું કારણ કયું સંયોજન બનવાને લીધે છે ?
 (A) નાઇટ્રાઇલ (B) ક્લોરો સંયોજન (C) નાઇટ્રોસો એમાઇન (D) આઇસો સાયનાઇડ

જવાબો : 11. (D), 12. (A), 13. (B), 14. (C), 15. (B), 16. (D), 17. (D), 18. (D), 19. (B), 20. (B),
 21. (D), 22. (B), 23 (B), 24 (A), 25 (B), 26. (C), 27 (A), 28 (D)


કેટલાંક અકાર્બનિક અને કાર્બનિક સંયોજનોની બનાવટ માટેનું રસાયણ

● અકાર્બનિક સંયોજનો

(i) મોહર ક્ષાર અથવા ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ :




- તે દ્વિ-ક્ષાર છે. જ્યારે ફેરસ સલ્ફેટ અને એમોનિયમ સલ્ફેટનાં દ્રાવણોને મિશ્ર કરી બાષ્પાયન પ્રક્રિયા અને ઠંડા પાડવાથી આછા લીલા રંગના મોહર ક્ષારના સ્ફટિક ઉદ્ભવે છે.



- અહીં ફેરસ સલ્ફેટનું દ્રાવણ બનાવતી વખતે તેનું જળવિભાજન થતું રોકવા માટે, ગરમ પાણીમાં થોડી માત્રામાં મંદ H_2SO_4 દ્રાવણ ઉમેરવું જરૂરી છે. એટલે કે ફેરસ સલ્ફેટનું ફેરસ હાઈડ્રોક્સાઈડમાં થતું રૂપાંતર અટકાવી શકાય છે.

(ii) પોટાશ એલમ (ફટકડી) $[K \cdot Al \cdot (SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$:

- તે પણ દ્વિ-ક્ષાર છે. તેની બનાવટ માટે K_2SO_4 અને $Al_2(SO_4)_3$ ના સમતુલ્ય પદાર્થોને થોડાં ટીપાં સાંદ્ર H_2SO_4 ધરાવતા પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે. જેને ઠંડું પાડવાથી પોટાશ એલમના રંગવિહીન સ્ફટિકો જુદા પાડે છે.




● કાર્બનિક સંયોજનો

(i) એસિટાનિલાઈડ $NHCOCH_3$:

- તેની બનાવટ માટે સમાન કદ ધરાવતા એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ અને એસિટિક એસિડનો ઉપયોગ કરીને એનિલિનના સીધેસીધા એસિટીલેશન દ્વારા બનાવી શકાય છે.
- $-NH_2$ અથવા $>NH$ સમૂહ ધરાવતા એમાઈન એ સીધેસીધા એસિટીલેશન પામે છે. તેમાંનો સક્રિય હાઈડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન એસિટાઈલ સમૂહ ($-COCH_3$) વડે કરવાથી એસિટાઈલ વ્યુત્પન્નો જેવા કે, $R - NHCOCH_3$ અને R_2NCOCH_3 આપે છે.




● ક્રિયાવિધિ :





પ્રક્રિયા દરમિયાન એનિલિનનું ઓક્સિડેશન થતું રોકવા માટે તેમજ તેમાં હાજર રંગવિહીન અશુદ્ધિઓનું રિડક્શન કરવા માટે પ્રક્રિયા-મિશ્રણમાં થોડા પ્રમાણમાં ઝિંક ઉમેરવો જરૂરી છે.

(ii) P-નાઈટ્રો એસિટાનિલાઈડ :




- તેની બનાવટ એસિટાનિલાઈડના નાઈટ્રેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે.
- એસિટાનિલાઈડને ગ્લેસિયલ એસિટિક એસિડમાં ઓગાળીને તેમાં સાંદ્ર H_2SO_4 સતત હલાવતા રહીને ઉમેરો. આ દરમિયાન પ્રક્રિયા-મિશ્રણનું તાપમાન 10° સે કરતાં નીચું રહેવું જરૂરી છે. ત્યાર બાદ ફ્યુઝિંગ HNO_3 ટીપે-ટીપે ઉમેરવાથી P-નાઈટ્રો એસિટાનિલાઈડ થોડી માત્રામાં O-આઈસોમર સાથે ઉદ્ભવે છે.
- આ પ્રક્રિયામાં સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં ફ્યુઝિંગ HNO_3 એ નાઈટ્રોનિયમ આયન (NO_2^+) આપે છે. જે એસિટાનિલાઈડ ઉપર આક્રમણ કરીને P-નાઈટ્રો એસિટાનિલાઈડ આપે છે.




એસિટાનિલાઈડ


P-નાઈટ્રોએસિટાનિલાઈડ



(iii) એનિલિન યલો/P-એમિનો એઝોબેન્ઝિન :





- તે ડાયએઝો એમિનો બેન્ઝિનમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
- જ્યારે 40° સે તાપમાને ડાયએઝો એમિનો બેન્ઝિન અને એનિલિનને થોડી માત્રામાં એનિલિન હાઈડ્રોકલોરાઈડ સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે થોડા સમયમાં તે ખૂબ જ સારી માત્રામાં P-એમિનો એઝો બેન્ઝિન અથવા એનિલિન યલો આપે છે.







(iv) આયોડોફોર્મ (CHI_3) :

- તે એસિટોનમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
- જ્યારે એસિટોનની પ્રક્રિયા પોટેશિયમ આયોડાઈડ અને સોડિયમ હાઈપોકલોરાઈડ ($NaOCl$) સાથે કરવામાં આવે, ત્યારે આયોડોફોર્મ બને છે.





29. ફટકડી (એલમ)ને જલીય એક સંયોજક ધનાયન $[\text{M}(\text{H}_2\text{O})]^{+}$, ત્રિસંયોજક ધનાયન $[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ અને SO_4^{2-} છે તો તેમનો ગુણોત્તર કયો હશે ?
 (A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 2 : 3 (C) 1 : 3 : 2 (D) 1 : 1 : 2
30. 40° તાપમાને એનિલિન હાઈડ્રોકલોરાઈડ એ ડાયએઝો એમિનો બેન્ઝિન સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા શું આપે છે ?
 (A) એનિલિન યલો (B) હાઈડ્રોજો સંયોજનો (C) એઝોબેન્ઝિન (D) કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી
31. એનિલિનમાંથી એસિટાનિલાઈડની બનાવટ દરમિયાન પ્રક્રિયા-મિશ્રણમાં થોડી માત્રામાં ઝિંક ઉમેરવામાં આવે છે. કારણ કે...
 (A) ઝિંક અવક્ષેપનમાં વધારો કરે છે.
 (B) ઝિંક એ પ્રક્રિયા દરમિયાન એનિલિનનું રિડક્શન થતું અટકાવે છે.
 (C) ઝિંક એ પ્રક્રિયા દરમિયાન એનિલિનનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવે છે. તેમજ એનિલિનમાં રહેલી રંગવિહીન અશુદ્ધિઓનું રિડક્શન કરે છે.
 (D) ઝિંક એ એનિલિન સાથે સફેદ સ્ફટિકમય સંકીર્ણ બનાવે છે.
32. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન આયોડોફોર્મની બનાવટમાં ઉપયોગી નથી ?
 (A) CH_3CHO (B) CH_3COCH_3 (C) HCHO (D) 1-પ્રોપોનોલ
33. એનિલિન યલો માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?
 (A) તે કેન્સર જન્ય છે. (B) તેને P-એમિનો એઝોબેન્ઝિન પણ કહે છે.
 (C) તે એસિડાઇ છે. (D) તેને 4-ફિનાઈલ એઝો એનિલિન પણ કહે છે.
34. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન મોહર ક્ષારની બનાવટમાં ઉપયોગી નથી ?
 (A) ફેરસ સલ્ફેટ (B) એમોનિયમ સલ્ફેટ (C) મંદ સલ્ફ્યુરીક એસિડ (D) બધા જ ઉપયોગી
35. P-નાઈટ્રો એસિટાનિલાઈડની બનાવટમાં નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે ?
 (A) સાંદ્ર $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ વડે એનિલિનનું નાઈટ્રેશન અને ત્યાર બાદ એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ વડે એસિટીલેશન
 (B) એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ સાથે નાઈટ્રોબેન્ઝિનની ફિડલ-કાફ્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા
 (C) એનિલિનનું એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ વડે એસિટીલેશન વડે
 (D) એક પણ નહિ.
36. એનિલિન યલોની બનાવટ દરમિયાન મળતા ડાયએઝો એમિનો બેન્ઝિનનું બંધારણીય સૂત્ર કયું યોગ્ય છે ?
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
37. એસિટોનમાંથી આયોડોફોર્મની બનાવટ માટે આપણને શેની જરૂર પડશે ?
 (A) KI (B) KI_3 (C) KOI (D) KIO_3

38. એનિલિન યલો માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) તે એઝોડાય છે.
 (B) તે બેઝિક ડાય છે.
 (C) તેની બનાવટ ડાયએઝો એમિનો બેન્ઝિનને એનિલિન અને એનિલિન હાઇડ્રોકલોરાઇડ સાથે ગરમ કરીને કરવામાં આવે છે.
 (D) તેની બનાવટ બેઝિક માધ્યમમાં ફિનોલની ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઇડ સાથેની સંયુગ્મન પ્રક્રિયાથી કરવામાં આવે છે.
39. એનિલિન અને નાઇટ્રોબેન્ઝિનના મિશ્રણમાંથી એનિલિનને અલગ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો પ્રક્રિયક ઉપયોગી છે ?
 (A) ઈથર (B) જલીય HCl (C) જલીય NaOH (D) જલીય NaHCO₃
40. મોહર ક્ષારની બનાવટ દરમિયાન મંદ સલ્ફ્યુરીક એસિડ શા માટે ઉમેરવામાં આવે છે ?
 (A) ફેરસ સલ્ફેટનું જળવિભાજન થતું રોકવા માટે. (B) ક્ષારની દ્રાવ્યતામાં વધારો કરવા માટે.
 (C) ધાતુના કાર્બોનેટનું અવક્ષેપન થતું રોકવા માટે. (D) એમોનિયમ ક્ષારના તટસ્થીકરણ માટે.
41. પોટાશ એલમના સ્ફટિક એ કયા સ્વરૂપે સ્ફટિકીકરણ પામે છે ?
 (A) મોનોક્લિનિક આકાર (B) અષ્ટલકીય આકાર (C) ટેટ્રાગોનલ આકાર (D) ચતુષ્ફલકીય આકાર
42. આયોડોફોર્મની બનાવટ માટે શરૂઆતના પદાર્થ તરીકે નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ ઉપયોગી નથી ?
 (A) CH₃CHOHCH₃ (B) CH₃CH₂CH₂OH (C) CH₃COCH₂CH₃ (D) C₆H₅COCH₃

જવાબો : 29. (D), 30. (A), 31. (C), 32. (C), 33. (C), 34. (D), 35. (C), 36. (C), 37. (C), 38. (D), 39. (C), 40. (A), 41. (B), 42. (B)

● અનુમાપન (Titration)

‘કદમાપક પૃથક્કરણમાં અજ્ઞાત સાંદ્રતાવાળા ચોક્કસ કદના પદાર્થના દ્રાવણ માટે તેની સાથે સંપૂર્ણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી શકે તેવા જ્ઞાત સાંદ્રતાવાળા પદાર્થના દ્રાવણનું કેટલું કદ જોઈએ તે નક્કી કરવાની ક્રિયાને અનુમાપન કહે છે.’

● પ્રમાણિત દ્રાવણ

કદમાપક પૃથક્કરણ પદ્ધતિમાં એક અથવા વધુ પ્રમાણિત દ્રાવણ પ્રક્રિયક તરીકે વપરાય છે કે જેમની સાંદ્રતા સંપૂર્ણ જ્ઞાત હોય, એસિડ-બેઇઝ અનુમાપનમાં મોટે ભાગે પ્રમાણિત દ્રાવણ તરીકે પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઇઝના દ્રાવણો વપરાય છે. દા.ત. HCl, H₂SO₄, NaOH, KOH અને Ba(OH)₂ વગેરે. બેઇઝ એ એસિડની જેમ કાયમ પ્રમાણિત માટે ઉપયોગી નથી. કારણ તેઓ જ્યારે હવાના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે CO₂ વાયુનું શોષણ કરે છે.

● સૂચકના ઉપયોગ દ્વારા એસિડ-બેઇઝ અનુમાપન

દ્રાવણોની સાંદ્રતા નક્કી કરવાની વિવિધ પ્રાયોગિક પદ્ધતિઓમાંની એક પદ્ધતિ એસિડ-બેઇઝ અનુમાપન છે.

આ પદ્ધતિમાં કોઈ એક દ્રાવણનું નિશ્ચિત કદ લઈ તેમાં રહેલા પ્રક્રિયક સાથેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા માટે તેના તુલ્ય પ્રમાણમાં બીજા પ્રક્રિયકનો જરૂરી જથ્થો ઉમેરવા તે પ્રક્રિયકના દ્રાવણનું કેટલું કદ જરૂરી છે તે શોધવામાં આવે છે.

અનુમાપન પદ્ધતિમાં વપરાતાં બે દ્રાવણોનાં કદનાં મૂલ્યો અને એક દ્રાવણની જાણીતી સાંદ્રતાના આધારે, બીજા દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.

એસિડ-બેઇઝ અનુમાપનમાં એસિડ અથવા બેઇઝના જલીય દ્રાવણનું પિપેટ વડે નિશ્ચિત કદ લઈ, તેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા કરવા માટે બીજા પ્રક્રિયકનું દ્રાવણ બ્યુરેટમાંથી ધીમે-ધીમે પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉમેરવામાં આવે છે.

આ પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણતા પારખવા માટે યોગ્ય સમયે રંગ-પરિવર્તન કરી શકે, તેવા પદાર્થના દ્રાવણમાં બે કે ત્રણ ટીપાં નિશ્ચિત કદ લીધેલા દ્રાવણમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આ રંગપરિવર્તન અનુભવતા પદાર્થને સૂચક કહે છે.

એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનની સફળતા યોગ્ય સૂચકની પસંદગી ઉપર ખૂબ જ આધારિત છે.

સૂચકની પસંદગી અનુમાપનના અંતિમ તબક્કામાં દ્રાવણની pHમાં થતો ઝડપી ફેરફાર કેટલી મર્યાદામાં થાય છે તેના ઉપર અવલંબે છે.

ફિનોલ્ફથેલિન અને મિથાઈલ ઓરેન્જ એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનમાં વપરાતાં અગત્યના સૂચકો છે.

● pH વિસ્તાર અને કેટલાક સામાન્ય સૂચકોના રંગ

ક્રમ	સૂચક	pH વિસ્તાર	એસિડ દ્રાવણમાં રંગ	બેઝિક દ્રાવણમાં રંગ
1.	થાયમોલ બ્લ્યૂ	1.2-2.8	લાલ	પીળો ચલો
2.	બ્રોમોફિનોલ બ્લ્યૂ	3.1-4.6	પીળો	પર્પલ
3.	મિથાઈલ ઓરેન્જ	3.1-4.5	લાલ	પીળો
4.	મિથાઈલ રેડ	4.2-6.3	લાલ	પીળો
5.	બ્રોમોથાયમોલ બ્લ્યૂ	6.0-7.5	નારંગી	વાદળી
6.	ફિનોલ રેડ	6.4-8.2	પીળો	લાલ
7.	થાયમોલ બ્લ્યૂ (બેઈઝ)	8.1-9.6	પીળો	વાદળી
8.	ફિનોલ્ફથેલિન	8.0-9.8	રંગવિહીન	ગુલાબી
9.	થાયમોથેલિન	9.3-10.5	રંગવિહીન	વાદળી
10.	એલિઝારિન ચલો R	10.1-12.1	પીળો	લિલાક

● એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનના સૂચકો

ક્રમ	એસિડ-બેઈઝ અનુમાપન	સૂચક
1.	પ્રબળ એસિડ-પ્રબળ બેઈઝ અનુમાપન	બ્રોમોથાયમોલ બ્લ્યૂ, ફિનોલ્ફથેલિન, મિથાઈલ ઓરેન્જ, થાયમોથેલિન
2.	પ્રબળ એસિડ-નિર્બળ બેઈઝ અનુમાપન	મિથાઈલ ઓરેન્જ, મિથાઈલ રેડ, બ્રોમોક્રેસોલ ગ્રીન
3.	નિર્બળ એસિડ-પ્રબળ બેઈઝ અનુમાપન	ફિનોલ્ફથેલિન, થાયમોલ્ફથેલિન
4.	નિર્બળ એસિડ-નિર્બળ બેઈઝ અનુમાપન	ફિનોલ રેડ

● કદમાપક પૃથક્કરણમાં આવતાં કેટલાંક પદોની જાણકારી

નોર્માલિટી (સપ્રમાણતા) : 1 ગ્રામ તુલ્યદળ ધરાવતા પદાર્થને ઓગાળી 1 લિટર દ્રાવણ બનાવતાં બનતા દ્રાવણને 1 સપ્રમાણ દ્રાવણ કહેવાય અથવા દ્રાવણની સપ્રમાણતા 1 છે.

$$\text{સપ્રમાણતા (નોર્મલિટી) (N)} = \frac{\text{ગ્રામલિટર}^{-1}}{\text{તુલ્ય દળ}}$$

$$= \frac{\text{દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં}}{\text{તુલ્ય દળ} \times \text{દ્રાવણનું કદ (લિટરમાં)}}$$

$$\bullet \quad \text{એસિડનો તુલ્યભાર} = \frac{\text{એસિડનું આણ્વિયદળ(ગ્રામમોલ}^{-1}\text{)}}{\text{એસિડની બેઝિકતા}}$$

$$\bullet \quad \text{બેઈઝનો તુલ્યભાર} = \frac{\text{બેઈઝનું આણ્વિયદળ (ગ્રામમોલ}^{-1}\text{)}}{\text{બેઈઝની એસિડિકતા}}$$

● મોલારિટી (M)

1 ગ્રામ મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થ ધરાવતા એક લિટર દ્રાવણને 1 મોલર દ્રાવણ કહે છે અથવા આ દ્રાવણની મોલારિટી 1 છે.

$$\text{મોલારિટી (M)} = \frac{\text{ગ્રામલિટર}^{-1}}{\text{આણ્વિયદળ}}$$

$$= \frac{\text{દ્રાવણનું વજન ગ્રામમાં}}{\text{આણ્વિયદળ} \times \text{દ્રાવણનું કદ લિટરમાં}}$$

$$\text{અથવા મોલારિટી} = \frac{\text{સપ્રમાણતા} \times \text{તુલ્યદળ}}{\text{આણ્વિયદળ}}$$

● રેડોક્ષ અનુમાપન

KMnO₄ અને K₂Cr₂O₇ જેવા ઓક્સિડેશનકર્તા વડે એસિડિક, બેઝિક અથવા તટસ્થ માધ્યમમાં Fe, Fe²⁺, H₂O₂, CaCl₂ અને MnO₂ જેવા રિડક્શનકર્તાનું અનુમાપનની પદ્ધતિમાં રેડોક્ષ અનુમાપન કહે છે. આ પ્રકારના અનુમાપનમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એમ બંને પ્રકારની ક્રિયાઓ સમાયેલી છે.



આપેલ પ્રક્રિયામાં MnO₄⁻નું Mn²⁺માં રિડક્શન થાય છે. રિડક્શન, ઓક્સિડેશનકર્તાનું થાય છે. તેથી MnO₄⁻ ઓક્સિડેશનકર્તા કહેવાય છે.



તેમજ Fe²⁺નું Fe³⁺માં ઓક્સિડેશન થાય છે. ઓક્સિડેશન, રિડક્શનકર્તાનું થાય છે. તેથી Fe²⁺ને રિડક્શનકર્તા કહેવાય છે.

બધા જ કિસ્સામાં N₁V₁ = N₂V₂ પરંતુ M₁V₁ ≠ M₂V₂

● રેડોક્ષ અનુમાપનના કેટલાક અગત્યના ઉદાહરણ


(i) KMnO₄ વિરુદ્ધ ઓક્સેલિક એસિડ અનુમાપન :

આ એક રેડોક્ષ અનુમાપનનું ઉદાહરણ છે, કે જેમાં ઓક્સેલિક એસિડ-રિડક્શનકર્તાનું અનુમાપન ઓક્સિડેશનકર્તા-KMnO₄ના પ્રમાણિત દ્રાવણ વડે કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા આયનોની સંયોજકતાના ફેરફારના આધાર પર રચાયેલ છે. આ પ્રકારના અનુમાપનમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એમ બંને પ્રક્રિયાઓ એકસાથે થાય છે. એટલે કે એકનું ઓક્સિડેશન અને બીજાનું રિડક્શન થાય છે.



અથવા

આયનિક સમીકરણ :








આ પ્રકારના અનુમાપનમાં અંતિમ બિંદુએ KMnO_4 સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે છે.

આ અનુમાપન એ HCl અથવા H_2SO_4 ની હાજરીમાં શક્ય બની શકે છે. જ્યારે HNO_3 ની હાજરીમાં શક્ય બની શકતું નથી, કારણ કે તે પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા હોવાથી તે KMnO_4 ની ઓક્સિડેશન ક્રિયામાં અવરોધ કરે છે.

KMnO_4 વિરુદ્ધ ઓક્સેલિક એસિડના અનુમાપનમાં ઓક્સેલિક એસિડના દ્રાવણને મંદ H_2SO_4 સાથે $70-80^\circ$ સે તાપમાને ગરમ કરવું પડે છે.


(ii) KMnO_4 વિરુદ્ધ મહોર ક્ષાર $[\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ અનુમાપન :

આ અનુમાપનમાં સક્રિય ઘટક ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ કે જે ફેરસ સલ્ફેટ સ્વરૂપે રહેલો છે, તો એસિડિક KMnO_4 વડે ફેરિક સલ્ફેટમાં ઓક્સિડેશન પામે છે.



અથવા

● આયનિક સમીકરણ



આ અનુમાપનમાં અંતિમ બિંદુએ KMnO_4 સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે છે.

આ અનુમાપન ઓરડાના તાપમાને જ કરવામાં આવે છે. કારણ કે મહોર ક્ષારનું હવા વડે જ ઓક્સિડેશન થાય છે.

અનુમાપન દરમિયાન જો H_2SO_4 પ્રમાણ વધારે હોય, તો MnO_2 બનવાને કારણે કથ્થાઈ રંગના અવક્ષેપ ઉદ્ભવે છે.

43. ઘણાં બધા છોડ અને શાકભાજીમાં ઓક્સેલિક એસિડ ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) હાજર છે. જો 100 ગ્રામ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ના અનુમાપન માટે અંતિમ બિંદુએ 24 મિલિ 0.01 M KMnO_4 નું દ્રાવણ જરૂરી હોય, તો તે નમૂનામાં $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ની વજનથી ટકાવારી કેટલી હશે ?

- (A) 0.54 % (B) 5.4 % (C) 1.54 % (D) 0.054 %

44. ઓક્સેલિક એસિડ વિરુદ્ધ પોટેશિયમ પરમેંગેનેટના અનુમાપનમાં, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ એ કેવી રીતે વર્તે છે ?

- (A) બાહ્ય સૂચક (B) સ્વયં સૂચક (C) રિડક્શનકર્તા (D) B અને C બંને

45. મહોર ક્ષારનું N/20 250 મિલિ દ્રાવણ બનાવવા માટે મહોર ક્ષારનો કેટલો જથ્થો જરૂરી પડશે ?

- (A) 9.8 ગ્રામ (B) 4.9 ગ્રામ (C) 19.6 ગ્રામ (D) 3.2 ગ્રામ

46. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ અને KMnO_4 ના 0.5 ગ્રામ મિશ્રણની પ્રક્રિયા એસિડિક માધ્યમમાં વધુ પ્રમાણમાં KI સાથે કરવામાં આવે છે. આથી મુક્ત થતા I_2 ના અનુમાપન માટે 0.15 N Na_2SO_4 ના દ્રાવણના 100 સેમી³ની જરૂર પડે છે, તો મિશ્રણમાં $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ની ટકાવારી કેટલી હશે ?

- (A) 85.36 % (B) 14.64 % (C) 58.63 % (D) 26.14 %

47. એસિડિક માધ્યમમાં KMnO_4 ની ઓક્સેલેટ સાથેની પ્રક્રિયામાં MnO_4^- નું રિડક્શન Mn^{2+} માં અને $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ નું ઓક્સિડેશન CO_2 માં થાય છે તો, 0.04 M KMnO_4 નું 50 મિલિ દ્રાવણ નીચેનામાંથી કોને તુલ્ય હશે ?

- (A) 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ નું 100 મિલિ દ્રાવણ (B) 0.2 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ નું 50 મિલિ દ્રાવણ
(C) 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ નું 25 મિલિ દ્રાવણ (D) 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ નું 50 મિલિ દ્રાવણ

48. એસિડિક માધ્યમમાં 126 ગ્રામ ઓક્સેલિક એસિડ ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$)નું ઓક્સિડેશન નીચેનામાંથી કોણ કરશે ?
 (A) $\frac{1}{3}$ મોલ $K_2Cr_2O_7$ (B) 2 મોલ $K_2Cr_2O_7$ (C) $\frac{1}{3}$ મોલ $KMnO_4$ (D) $\frac{5}{2}$ મોલ $KMnO_4$
49. 3.92 ગ્રામ ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ (મોદૂર ક્ષાર)ની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા 50 મિલિ $\frac{N}{10}$ $KMnO_4$ ના દ્રાવણ વડે થાય છે, તો નમૂનાની શુદ્ધતાની ટકાવારી કેટલી હશે ?
 (A) 50 (B) 78.4 (C) 80 (D) 39.2
50. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) એસિડિક $K_2Cr_2O_7$ નું દ્રાવણ એ આયોડાઈડમાંથી ઓયોડિન છુટું પાડે (Liberates) છે.
 (B) એસિડિક દ્રાવણમાં ડાયક્રોમેટ આયનો એ ક્રોમેટ આયનમાં ફેરવાય છે.
 (C) $(NH_4)_2 Cr_2O_7$ ને ગરમ કરવાથી ઉષ્માક્ષેપક વિઘટન દ્વારા Cr_2O_3 આપે છે.
 (D) Fe^{2+} આયનના એસ્ટિમેશન માટે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ એ અનુમાપક તરીકે વપરાય છે.
51. 6.3 ગ્રામ ઓક્સેલિક એસિડ ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$)નું 250 મિલિ જલીય દ્રાવણ બનાવવામાં આવેલ છે. આ દ્રાવણના 10 મિલિનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ કરવા માટે 0.1N NaOHના દ્રાવણના કેટલા કદની જરૂર પડશે ?
 (A) 40 મિલિ (B) 20 મિલિ (C) 10 મિલિ (D) 4 મિલિ
52. $KMnO_4$ ના અનુમાપનમાં કેટલીક વખત જલીય MnO_2 ના કથ્થાઈ અવક્ષેપ જોવા મળે છે. તેનું કારણ કયું છે ?
 (A) મંદ H_2SO_4 ના ઓછા જથ્થાથી $KMnO_4$ ના અપૂર્ણ રિડક્શનને લીધે.
 (B) દ્રાવણને વધુ ગરમ કરવાને કારણે.
 (C) સતત ઠલાવતા રહીને ટીપે-ટીપે $KMnO_4$ ઉમેરવાથી
 (D) હાઈડ્રોકલોરિક એસિડ ઉમેરવાથી
53. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
 (A) મોદૂર ક્ષારના દ્રાવણનું $KMnO_4$ સાથે અનુમાપન કરતાં પહેલાં તેને ગરમ કરવામાં આવતું નથી.
 (B) $KMnO_4$ અને મોદૂર ક્ષાર વચ્ચેની પ્રક્રિયા ઠંડા દ્રાવણમાં શક્ય છે.
 (C) મોદૂર ક્ષારમાં હાજર ફેરસ સલ્ફેટને ગરમ કરવાથી તેનું હવા દ્વારા ફેરિક સલ્ફેટમાં ઓક્સિડેશન થાય છે.
 (D) મોદૂર ક્ષારના દ્રાવણનું $KMnO_4$ વડે અનુમાપનમાં તેને જો 60°-70° તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે, તો એક્યુરેટ પરિણામ આપે.
54. $KMnO_4$ ના અનુમાપનમાં મંદ H_2SO_4 ના સ્થાને મંદ HCl વાપરી શકાતો નથી. કારણ કે નીચેનામાંથી કયું ખોટું ?
 (A) $KMnO_4$ એ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્લોરિન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે.
 (B) HCl સાથેની પ્રક્રિયામાં કેટલોક $KMnO_4$ વપરાઈ જાય છે.
 (C) જેટલો જરૂર હોય તેના કરતાં થોડો વધારે $KMnO_4$ ની જરૂર પડે છે.
 (D) HCl એ $KMnO_4$ સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી.
55. આપેલ જલીય પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?

$$KI + K_3[Fe(CN)_6] \xrightarrow{\text{મંદ } H_2SO_4} \text{કથ્થાઈ પીળું દ્રાવણ}$$

$$\downarrow ZnSO_4$$
 રંગવિહીન દ્રાવણ $\leftarrow$ કથ્થાઈ પીળું ગાળણ + સફેદ અવક્ષેપ
 (A) પ્રથમ પ્રક્રિયા એ રેડોક્ષ પ્રક્રિયા છે.
 (B) સફેદ અવક્ષેપ એ $Zn_3[Fe(CN)_6]_2$ ના છે.
 (C) ગાળણમાં સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ ઉમેરવાથી તે પીળો રંગ આપે છે.
 (D) સફેદ અવક્ષેપ એ NaOHના દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય છે.

56. 0.6 M મોલર ક્ષારના 750 સેમી³ દ્રાવણનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટના સ્ફટિકોનું કેટલું દળ જરૂરી હશે ? (આણ્વિકદળ : પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ = 294; મોલર ક્ષાર = 392)
- (A) 0.49 ગ્રામ (B) 0.45 ગ્રામ (C) 22.05 ગ્રામ (D) 2.2 ગ્રામ
57. 0.1 M 40.0 મિલિ Fe^{2+} દ્રાવણનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે 0.02 M MnO_4^- દ્રાવણના કેટલા કદની જરૂર પડશે ?
- (A) 200 મિલિ (B) 100 મિલિ (C) 40 મિલિ (D) 20 મિલિ
58. જ્યારે KMnO_4 ના દ્રાવણને ઓક્સેલિક એસિડના દ્રાવણમાં ઉમેરતા, શરૂઆતમાં તેનો રંગ ધીમે-ધીમે દૂર થાય છે. પરંતુ થોડા સમય પછી ત્વરિત રંગ દૂર થાય છે. કારણ કે....
- (A) નીપજ તરીકે CO_2 ઉદ્ભવે છે. (B) પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે.
- (C) MnO_4^- પ્રક્રિયાને ઉદ્દિપિત કરે છે. (D) Mn^{2+} એ ઓટો (સ્વયંમ) ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે.

જવાબો : 43. (B), 44. (B), 45. (B), 46. (B), 47. (C), 48. (A), 49. (A), 50. (B), 51. (A), 52. (A), 53. (D), 54. (D), 55. (B), 56. (C), 57. (C), 58. (D)

● ગુણાત્મક પૃથક્કરણ

“આપેલ પદાર્થમાં રહેલાં જુદા-જુદા હાજર ઘટકોની ઓળખ અથવા ચકાસણી કરવી એટલે ગુણાત્મક પૃથક્કરણ.”

દા. ત. ઝિંકબ્લેન્ડ એ Zn^{2+} અને S^{2-} સ્વરૂપે ઝિંક અને સલ્ફર ધરાવે છે.

ગુણાત્મક પૃથક્કરણ પદ્ધતિસર (Systematic)ની પ્રક્રિયા નીચેના ત્રણ તબક્કાઓ પર આધારિત છે :

(1) પ્રાથમિક કસોટીઓ (2) ધનાયનની ભીની કસોટી અને (3) ઋણાયનની ભીની કસોટીઓ.

(1) પ્રાથમિક કસોટી :

(a) રંગ :

ક્રમ	અવલોકન	અનુમાન
(1)	વાદળી, તેનું જલીય દ્રાવણ પણ વાદળી	ક્યુપ્રિક ક્ષાર (Cu^{2+})
(2)	લીલો, તેનું જલીય દ્રાવણ પણ લીલું	નિકલ ક્ષાર (Ni^{2+})
(3)	ઘાટો લીલો રંગ	ક્રોમિયમ ક્ષાર (Cr^{2+})
(4)	જાંબલી-ગુલાબી, તેનું જલીય દ્રાવણ ગુલાબી	કોબાલ્ટ ક્ષાર (Co^{2+})
(5)	આછો ગુલાબી, તેનું જલીય દ્રાવણ રંગવિહીન	મેંગેનિઝ ક્ષાર Mn^{2+} , Mn^{3+}
(6)	કથ્થઈ લાલ	Fe_2O_3
(7)	લાલ	HgO , HgI_2 , Pb_3O_4 , Cu_2O
(8)	કાળો	CuO , NiO , SnO , FeS , CuS , HgS , PbS , CoS , FeO , CuS
(9)	નારંગી લાલ	Sb_2S_3
(10)	પીળો	As_2S_3 , CdS , Bi_2O_3 , As_2S_5
(11)	પીળો-લીલો, જલીય દ્રાવણ ઘાટું લીલું	Fe^{2+} ના ક્ષાર
(12)	પીળો-કથ્થઈ, જલીય દ્રાવણ પીળું	Fe^{3+} ના ક્ષાર
(13)	પર્પલ (Purple)	કેટલાક Cr^{3+} ક્ષાર

(b) ગરમીની અસર :

એક સૂકી અને ચોખ્ખી કસનળીમાં આપેલ પદાર્થને લઈ પહેલાં તેને ધીમેથી અને ત્યાર બાદ વધુ ગરમ કરવાથી નીચે મુજબનાં અવલોકનો જોવા મળશે :

ક્રમ	અવલોકન	અનુમાન
(1)	પદાર્થ પીગળી જાય	આલ્કલી ધાતુ ક્ષાર, Hg, Ag અને Pbના ક્લોરાઇડ
(2)	પદાર્થ કેક થઈ જાય	Pb(NO ₃) ₂ , Ba(NO ₃) ₂ , NaCl અને KI
(3)	સ્વેલ્સ (Swells)	ફટકડી, ફોસ્ફેટ અને બોરેટના ક્ષાર
(4)	પદાર્થને ગરમ કરતાં સબલાઈમ બને છે તથા સબલાઈમનો રંગ સફેદ પીળો કાળો ભૂરો, પીળો અથવા જાંબલી બાષ્પ ગ્રે (ગાર્લિક રંગ)	HgCl ₂ , AS ₂ O ₃ , Hg ₂ Cl ₂ , AlCl ₃ , Sb ₂ O ₃ NH ₃ ના હેલાઈડ AS ₂ S ₃ અને HgI ₂ Hg, Sb અને Asના સલ્ફાઈડ આયોડાઈડ
(5)	ગરમ કરતાં વધેલ અવશેષનો રંગ સફેદ લાલ-કથ્થઈ પીળા-કથ્થઈ-ગરમ હોય ત્યારે તથા ઠંડા થાય ત્યારે કથ્થઈ કાળા ઘાટ્ટો નારંગી-લાલ સફેદ ગરમ કરતાં પીળા વાદળી અથવા લીલા ગરમ કરતાં સફેદ	Ca, Ba, Sr, Mg, Zn અને Alના ઓક્સાઈડ Fe ₂ O ₃ SnO ₂ NiO, MnO ₂ અને CuO HgO ZnO CuSO ₄ ·5H ₂ O
(6)	ઉદ્ભવતા વાયુઓનું અવલોકન દહન પોષક O ₂ CO ₂ વાયુ જે ચૂનાના નીતર્યા પાણીને દૂધિયું બનાવે H ₂ S-વાયુ-સડેલા ઈંડાં જેવી વાસ, HCl-વાયુ સાથે સફેદ ધુમાડા, NH ₃ -લાલ લિટમસને ભૂરું બનાવે, SO ₂ -બળેલા સલ્ફર જેવી વાસ, Cl ₂ -પીળો લીલો વાયુ, I ₂ -જાંબલી વાયુ, Br ₂ -લાલ-કથ્થઈ વાયુ NO ₂ -કથ્થઈ વાયુ	Na અને Kના નાઈટ્રેટ કાર્બોનેટ અને ઓક્ઝેલેટ સલ્ફાઈડ જલીય ક્લોરિન ક્ષાર એમોનિયમ ક્ષાર સલ્ફાઈડ અને થાયોસલ્ફેટ ક્લોરાઈડ આયોડાઈડ બ્રોમાઈડ ભારે ધાતુના નાઈટ્રેટ અને નાઈટ્રાઈટ

(c) સંયોજનની વાસ :

સંયોજનની વાસ પણ ક્ષારમાં હાજર રેડિકલ માટેનો આઈડિયા આપે છે.

વાસ	અનુમાન
એમોનિયેકલ વાસ	એમોનિયમ ક્ષાર
વિનેગાર જેવી વાસ	એસિડેટ
ક્લોરિન જેવી વાસ	હાઈપોક્લોરાઈટ

(d) ક્ષારની દ્રાવ્યતા :

ક્ષારનો પ્રકાર	અવલોકન
નાઈટ્રેટ અને નાઈટ્રાઈટ	બધા જ ધાત્વિક ક્ષાર પાણીમાં દ્રાવ્ય
એસિડેટ	બધા જ ધાત્વિક એસિડેટ પાણીમાં દ્રાવ્ય
ક્લોરાઈડ	AgCl, Hg ₂ Cl ₂ અને PbCl ₂ સિવાયના બધા જ ક્લોરાઈડ પાણીમાં દ્રાવ્ય
બ્રોમાઈડ	AgBr, Hg ₂ Br ₂ અને PbBr ₂ સિવાયના બધા જ બ્રોમાઈડ પાણીમાં દ્રાવ્ય
આયોડાઈડ	Hg ₂ I ₂ , HgI ₂ અને PbI ₂ સિવાયના બધા જ આયોડાઈડ પાણીમાં દ્રાવ્ય
સલ્ફાઈડ	સમૂહ-I અને સમૂહ-IIની ધાતુઓ તથા એમોનિયમ આયન સિવાયના બધા જ સામાન્ય સલ્ફાઈડ પાણીમાં અદ્રાવ્ય
કાર્બોનેટ	સમૂહ Iના કાર્બોનેટ અને (NH ₄) ₂ CO ₃ સિવાયના બધા જ સામાન્ય કાર્બોનેટ પાણીમાં અદ્રાવ્ય
સલ્ફેટ	PbSO ₄ , Hg ₂ SO ₄ , BaSO ₄ , CaSO ₄ અને Ag ₂ SO ₄ અલ્પ દ્રાવ્ય છે જ્યારે બધા જ સામાન્ય સલ્ફેટ પાણીમાં દ્રાવ્ય
ફોસ્ફેટ	સમૂહ Iના ફોસ્ફેટ અને (NH ₄) ₃ PO ₄ સિવાયના બધા જ સામાન્ય ફોસ્ફેટ પાણીમાં અદ્રાવ્ય
હાઈડ્રોક્સાઈડ	સમૂહ Iના હાઈડ્રોક્સાઈડ અને Ba(OH) ₂ , Sr(OH) ₂ અને Ca(OH) ₂ સિવાયના બધા જ સામાન્ય હાઈડ્રોક્સાઈડ પાણીમાં અદ્રાવ્ય





(e) જ્યોત કસોટી :

પદાર્થ/ક્ષારની સાંદ્ર HClમાં પેસ્ટ બનાવી નિમ્ન ઓક્સિડાઈઝિંગ જ્યોતમાં, જ્યોત દ્વારા ઉદ્ભવતા રંગનું અવલોકન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સમૂહ – (IV) (Ba²⁺, Sr²⁺, Ca²⁺)ને જ્યોતના રંગ વડે ઓળખી શકાય છે.

રંગ	ધનાયન
સોનેરી પીળો	Na ⁺
જાંબલી	K ⁺
લાલશ પડતો કથ્થઈ	Li ⁺
બ્રિક લાલ	Ca ²⁺
સફરજન જેવો લીલો	Ba ²⁺ , M _O ²⁺
લીલો	Cu ²⁺ , BO ₃ ³⁻ , Ti ³⁺
ક્રિમશન લાલ	Sr ²⁺
વાદળી	Cu ²⁺ , As ³⁺ , Sb ³⁺ , Bi ³⁺

(f) કોલસા કસોટી :

જ્યારે ક્ષારની સૂકા Na_2CO_3 સાથે મિશ્ર કરી અથવા ઓક્સિડાઈઝિંગ મિશ્રણને રિડ્યુસિંગ જ્યોતમાં કોલસા ઉપર મૂકતાં, પ્રથમ ધાત્વિક કાર્બોનેટ અને અંતમાં ધાત્વિક ઓક્સાઈડ ઉદ્ભવે છે.



આ ધાત્વિક ઓક્સાઈડ રિડ્યુસિંગ જ્યોતમાં રહેલાં કાર્બન વડે ધાતુમાં રિડક્શન પામે છે અને ઠંડા પાડતાં મણકો રચે છે.




● કોલસા કેવિટી કસોટીમાં રંગ :




ક્રમ	મણકો	કસ્ટ (સ્તર)	અવલોકન
(1)	સફેદ-ગ્રે પોચો મણકો જેના વડે પેપર ઉપર માર્ક કરી શકાય.	કથ્થઈ-ઠંડો પાડતાં પીળો	Pb^{2+}
(2)	લયકીય સફેદ મણકો	—	Ag^+
(3)	સફેદ-કથ્થઈ મણકો	નારંગી-ઠંડો પાડતાં પીળો	Bi^{3+}
(4)	ગાર્લિક વાસના ધુમાડા મણકો બનતો નથી.	—	As^{3+}
(5)	—	લાલ-કથ્થઈ અવક્ષેપ કે જે સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાય	Cd^{2+}
(6)	એમોનિયાની વાસ	લાલ	NH_4^+
(7)	—	સફેદ અવક્ષેપ	$\text{Fe}^{3+}, \text{Co}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$

(g) બોરેક્ષ મણકા-કસોટી :

જો બોરેક્ષ ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)ને પ્લેટિનમ વાયર ઉપર ગરમ કરવામાં આવે, તો પારદર્શક, રંગવિહીન, કાચ જેવો સોડિયમ મેટાબોરેટ (NaBO_2) અને બોરિક એનહાઈડ્રાઈડ (B_2O_3)નો મણકો મળે છે.



Cu , Fe , Cr , Mn , Co અને Ni ના ક્ષાર સાથે ઉપર્યુક્ત રંગવિહીન મણકો જુદા-જુદા રંગ ઉત્પન્ન કરે છે. મણકાના રંગનો આધાર તેને કેવા પ્રકારના જ્યોતમાં ગરમ કરવામાં આવેલો છે, તેના પર રહેલો છે.



● બોરેક્ષ મણકા-કસોટીમાં રંગ

ઓક્સિડાઈઝિંગ જ્યોત			રિડ્યુસિંગ જ્યોત		મણકો
ક્રમ	ગરમ	ઠંડો	ગરમ	ઠંડો	
(1)	લીલો	વાદળી	રંગવિહીન	ઓપેક્યુ-લાલ-કથ્થઈ	Cu
(2)	પીળાશપડતો કથ્થઈ	પીળો	લીલો	લીલો	Fe
(3)	પીળો	લીલો	લીલો	લીલો	Cr
(4)	જાંબલી	Amethyst	રંગવિહીન	રંગવિહીન	Mn
(5)	વાદળી	વાદળી	વાદળી	વાદળી	Co
(6)	જાંબલી	કથ્થઈ-લાલ	ગ્રે	ગ્રે	Ni
(7)	પીળો	રંગવિહીન	કથ્થઈ	કથ્થઈ	Mo
(8)	ગુલાબ જેવો જાંબલી	ગુલાબ જેવો જાંબલી	લાલ	જાંબલી	Au
(9)	પીળો	રંગવિહીન	પીળો	પીળાશપડતો કથ્થઈ	W
(10)	પીળો	આછો પીળો	લીલો	બોટલ જેવો લીલો	U
(11)	પીળો	લીલો-પીળો	કથ્થઈ	લીલો	V
(12)	પીળો	રંગવિહીન	ગ્રે	આછો જાંબલી	Ti
(13)	નારંગી-લાલ	રંગવિહીન	રંગવિહીન	રંગવિહીન	Ce

$PbSO_4$ એ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. જ્યારે Cu^{2+} ના સલ્ફેટ દ્રાવ્ય છે.

(2) ધનાયનની ભીની કસોટીઓ :

(બેઝિક આયનો અથવા ધનાયનોની નિર્ણાયક કસોટીઓ)

સામાન્ય રીતે ગુણાત્મક પૃથક્કરણમાં ઉપયોગી ધનાયનોનું વર્ગીકરણ છ સમૂહોમાં કરવામાં આવેલું છે. તે એકબીજાથી જુદા પડે છે. તેનું કારણ એ છે કે દરેક ધનાયનોનો સમૂહ એ કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રક્રિયક વડે અવક્ષેપિત થાય છે, જેને સમૂહ પ્રક્રિયક કહેવાય છે.

● પ્રથમ સમૂહ (સિલ્વર સમૂહ)

- આ સમૂહમાં ત્રણ બેઝિક મૂલકો (આયનો) Pb^{2+} , Ag^+ અને Hg_2^{2+} છે.
- આ સમૂહનો પ્રક્રિયક મંદ HCl છે. આથી આ સમૂહના આયનો એ ક્લોરાઈડ સ્વરૂપે અવક્ષેપિત થાય છે.
- $PbCl_2$ એ ગરમ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે ઠંડા પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. તેવી જ રીતે $AgCl$ અને Hg_2Cl_2 બંને પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે.
- $PbCl_2$ એ K_2CrO_4 અને KI સાથે અનુક્રમે $PbCrO_4$ અને PbI_2 બનાવવાને કારણે પીળા અવક્ષેપ આપે છે.
- $AgCl$ એ NH_4OH સાથે $(Ag(NH_3)_2Cl)$ નામનો સંકીર્ણ બનાવે છે. આથી તેમાં દ્રાવ્ય છે જ્યારે $HgCl_2$ એ NH_4OH સાથે $Hg + HgNH_2Cl$ બનાવવાને કારણે કાળો અવક્ષેપ આપે છે.
- જો ક્ષાર ઠંડા અને મંદ HCl માં દ્રાવ્ય હોય, તો Pb^{2+} ગેરહાજર છે.

● દ્વિતીય સમૂહ

- આ સમૂહમાં કુલ પાંચ બેઝિક આયનો : Hg^{2+} , Pb^{2+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} રહેલાં છે. જેને II-A અથવા કૉપર સમૂહ કહે છે.

- તેવી જ રીતે II-B અથવા આર્સેનિક સમૂહના As^{3+} , Sb^{3+} અને Sn^{2+} અથવા Sn^{4+} રહેલાં છે.
- આ સમૂહનો સમૂહ પ્રક્રિયક મંદ HClની હાજરીમાં H_2S છે. આથી આયનો તેમના સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે અવક્ષેપિત થાય છે.

● સમૂહ-IIના બેઝિક આયનોના સલ્ફાઇડના રંગ




PbS અને CuS → કાળા

CdS, As_2S_3 અને SnS_2 → પીળા

Sb_2S_3 → નારંગી

SnS → કથ્થઈ

- Pb^{2+} , Cu^{2+} અને Cd^{2+} ના સલ્ફાઇડ એ 50 % HNO_3 સાથે તેમના નાઈટ્રેટ બનાવવાને કારણે તેમાં દ્રાવ્ય છે.
- એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઇડ એ H_2S માંથી H^+ દૂર કરીને H_2S ના આયનીકરણમાં વધારો કરે છે અને આયનીકરણ ન પામે તેવું પાણી બનાવે છે.



આ પરિસ્થિતિમાં વધુ પ્રમાણમાં S^{-2} આયનો હાજર હોવાથી સમૂહ IVના સલ્ફાઇડનું અવક્ષેપન થશે.

● તૃતીય સમૂહ (આયર્ન સમૂહ)

- આ સમૂહમાં ત્રણ બેઝિક આયનો Fe^{3+} , Al^{3+} અને Cr^{3+} છે.
- આ સમૂહનો સમૂહ પ્રક્રિયક NH_4Cl ની હાજરીમાં NH_4OH છે. આથી આ સમૂહના આયનો તેમના હાઈડ્રોક્સાઇડ અથવા દ્રાવણમાં બાકી રહેલ અન્ય ધાતુના હાઈડ્રોક્સાઇડ સ્વરૂપે અવક્ષેપિત થાય છે. કારણ કે તેમનો દ્રાવ્યતા ગુણાકાર ઊંચો છે.

$Fe(OH)_3$ → લાલાશપડતા કથ્થઈ અવક્ષેપ

$Al(OH)_3$ → જિલેટિન જેવા સફેદ અવક્ષેપ

$Cr(OH)_3$ → મેલા થયા હોય તેવા લીલા અવક્ષેપ

- આ સમૂહના પૃથક્કરણ વખતે સમાન આયન અસરને કારણે પ્રથમ NH_4Cl ઉમેર્યા બાદ જ NH_4OH ઉમેરવામાં આવે છે.
- અહીં, NH_4Cl ના સ્થાને $(NH_4)_2SO_4$ અને NH_4NO_3 વાપરી શકાતો નથી. કારણ કે SO_4^{2-} આયનો એ Ba^{2+} આયનોને $BaSO_4$ સ્વરૂપે અવક્ષેપિત કરે છે.
- $Al(OH)_3$ ના અવક્ષેપ વધુ $NaOH$ માં દ્રાવ્ય છે. જ્યારે $Fe(OH)_3$ અને $Cr(OH)_3$ ના અવક્ષેપ અદ્રાવ્ય છે.
- Fe^{3+} આયનો એ પોટેશિયમ થાયોસાયનેટ (KCNS) સાથે $Fe(CNS)_3$ અથવા $[Fe(SCN)_6]^{3-}$ આયનો બનાવવાને લીધે લોહી જેવો લાલ રંગ આપે છે. જ્યારે પોટેશિયમ ફેરોસાયનાઈડ $[K_4(Fe(CN)_6)]$ સાથે ફેરો-ફેરી સાયનાઈડ ($Fe_4[Fe(CN)_6]$) બનાવવાને કારણે પર્સિયન વાદળી રંગના અવક્ષેપ આપે છે.

● ચતુર્થ સમૂહ (ઝિંક સમૂહ)

- આ સમૂહમાં ચાર બેઝિક આયનો Co^{+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} અને Zn^{2+} રહેલાં છે.
- આ સમૂહનો સમૂહ પ્રક્રિયક H_2S ની હાજરીમાં NH_4OH છે. આથી આ સમૂહના આયનો એ તેમના સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે અવક્ષેપિત થાય છે, જે NH_4OH માં અદ્રાવ્ય છે.


CoS, NiS → કાળા અવક્ષેપ

MnS → આછા ગુલાબી (બફ) અવક્ષેપ

ZnS → આછા સફેદ અવક્ષેપ

(c) સલ્ફાઈટની કસોટીઓ :


- (i) સલ્ફાઈટ એ મંદ H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરીને SO_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. જે એસિડિક પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટના દ્રાવણને લીલું બનાવે છે, કારણ કે તેમાં ડાયક્રોમેટનું ક્રોમિયમ સલ્ફેટમાં રિડક્શન થાય છે જે લીલું છે.



- (ii) સલ્ફાઈટ એ બેરિયમ ક્લોરાઈડ દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરીને બેરિયમ સલ્ફાઈડના સફેદ અવક્ષેપ આપે છે, જે મંદ HClમાં દ્રાવ્ય થઈને SO_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે.


(d) થાયોસલ્ફેટની કસોટીઓ :

- (i) થાયોસલ્ફેટ એ મંદ H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરીને SO_2 વાયુ અને કલિલમય સલ્ફર ઉત્પન્ન કરે છે.
- (ii) થાયોસલ્ફેટ એ સિલ્વરનાઈટ્રેટના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરીને સિલ્વર થાયોસલ્ફેટના સફેદ અવક્ષેપ આપે છે. જેનું વિઘટન થવાથી તેનો રંગ ધીમે-ધીમે પીળો, નારંગી, કથ્થઈ અને અંતમાં કાળામાં બદલાઈ જાય છે. કારણ કે તેમાં સિલ્વર સલ્ફાઈડ બને છે.



(e) નાઈટ્રાઈટની કસોટીઓ :

- (i) નાઈટ્રાઈટ એ મંદ H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરીને નાઈટ્રસ એસિડ બનાવે છે, જે વિઘટનથી કથ્થઈ રંગનો NO_2 વાયુ આપે છે.



- આ વાયુ ફેરસ સલ્ફેટ સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા $FeSO_4 \cdot NO$ અથવા $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$ સૂત્ર ધરાવતો સંકીર્ણ બનાવવાને કારણે કાળું દ્રાવણ ઉત્પન્ન કરે છે.


- (ii) નાઈટ્રાઈટ એ મંદ H_2SO_4 સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા નાઈટ્રસ એસિડ બનાવે છે. જેની પોટેશિયમ આયોડાઈડ (KI) સાથેની પ્રક્રિયાથી આયોડિન મુક્ત થાય છે. આ આયોડિન સ્ટાર્ચના દ્રાવણને વાદળી-જાંબલીમાં ફેરવે છે.

(f) ક્લોરાઈડની કસોટીઓ :

- (i) ક્લોરાઈડને જ્યારે સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે HCl વાયુ આપે છે, જે $AgNO_3$ ના દ્રાવણ સાથે $AgCl$ ના સફેદ અવક્ષેપ આપે છે.

- (ii) ક્લોરાઈડને જ્યારે $K_2Cr_2O_7$ અને સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે લાલાશપડતો (reddish) કોમાઈલ ક્લોરાઈડ (CrO_2Cl_2) વાયુ આપે છે. આ વાયુ NaOH સાથેની પ્રક્રિયાથી સોડિયમ ક્રોમેટ બનવાને કારણે પીળું દ્રાવણ આપે છે.

નોંધ : કોમાઈલ ક્લોરાઈડ કસોટી કરતી વખતે માત્ર સૂકી કસનળીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારણ કે જો પાણીની હાજરી હોય, તો કોમાઈલ ક્લોરાઈડનું નીચે મુજબ જળવિભાજન થાય છે :



(g) બ્રોમાઈડની કસોટીઓ :

- (i) બ્રોમાઈડને જ્યારે સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે લાલાશપડતો કથ્થઈ બ્રોમિન આપે છે. જે સ્ટાર્ચ આયોડાઈડ પેપરને વાદળી બનાવે છે.

- (ii) બ્રોમાઈડનો ક્લોરિન જળ સાથેની પ્રક્રિયાથી બ્રોમિન મુક્ત થાય છે, જે CS_2 સ્તર ઉપરનો કથ્થઈ રંગ દૂર કરે છે.

(h) આયોડાઈડની કસોટીઓ :

- (i) આયોડિનને જ્યારે સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે જાંબલી આયોડિન વાયુ આપે છે, જે સ્ટાર્ચ પેપરને વાદળી બનાવે છે.

- (ii) આયોડિનના દ્રાવણને ક્લોરિન જળ સાથે હલાવવાથી આયોડિન છૂટું પાડે છે જે CS_2 ના સ્તરને જાંબલી બનાવે છે.

નોંધ : સરળતાથી ક્લોરિન જળ બનાવવા માટે $KMnO_4$ ના થોડા દ્રાવણમાં ટીપે-ટીપે સાંદ્ર HCl ઉમેરવામાં આવે કે જ્યાં સુધી $KMnO_4$ નો જાંબલી રંગ દૂર થઈ જાય.

(i) નાઈટ્રેટની કસોટીઓ :

- (i) જ્યારે નાઈટ્રેટને સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે નાઈટ્રિક એસિડ બને છે. કૉપરના ભૂકા સાથે કથ્થઈ રંગના NO_2 વાયુની બાષ્પ બનાવે છે.
- (ii) વિંટી કસોટી : નાઈટ્રેટની જ્યારે સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં તાજા બનાવેલા $FeSO_4$ ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે બંને પ્રવાહીઓના સંગમ સાથે $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$ સંકીર્ણ બનાવાને લીધે કથ્થઈ રંગની વિંટી આપે છે.

(j) સલ્ફેટની કસોટીઓ :

- (i) દ્રાવ્ય સલ્ફેટની $BaCl_2$ ના દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયાથી $BaSO_4$ ના સફેદ અવક્ષેપ આપે છે, જે બધા જ એસિડમાં અદ્રાવ્ય છે.

-
59. બોરેક્સ મણકા-કસોટીમાં નીચેના પૈકી કયું સંયોજન બને છે ?
(A) મેટાબોરેટ (B) ટેટ્રાબોરેટ (C) આર્થોબોરેટ (D) આપેલા ત્રણેય
60. નીચેનામાંથી કયો ક્ષાર $AgNO_3$ અને મંદ H_2SO_4 સાથે સફેદ અવક્ષેપ આપશે તેમજ જ્યોત કસોટીમાં લીલી જ્યોત પણ આપશે ?
(A) $CuCl_2$ (B) $BaCl_2$ (C) $PbCl_2$ (D) $Cu(NO_3)_2$
61. ફોસ્ફેટ આયન એ એમોનિયમ મોલિબ્ડેનેટ સાથે કયા રંગના અવક્ષેપ આપે છે ?
(A) જાંબલી (B) ગુલાબી (C) પીળા (D) લીલા
62. નીચેનામાંથી કયો આયન એસિડિક $KMnO_4$ નો રંગ દૂર કરશે ?
(A) SO_4^{2-} (B) S_2^{2-} (C) NO_3^- (D) CH_3COO^-
63. Fe^{2+} આયનની હાજરીની કસોટી કયા પ્રક્રિયકથી કરી શકાય છે ?
(A) H_2S (B) NH_4CNS (C) $K_4[Fe(CN)_6]$ (D) $K_3[Fe(CN)_6]$
64. NO_3^- ની કસોટીમાં ફેરસ નાઈટ્રોસોસલ્ફેટ બનવાને કારણે કથ્થઈ વિંટી ઉદ્ભવે છે. આ કસોટી શેના પર આધારિત છે ?
(A) નાઈટ્રેટનું નાઈટ્રિકઑક્સાઈડમાં રિડક્શન થવાથી
(B) નાઈટ્રિક ઑક્સાઈડનું નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડમાં ઑક્સિડેશન થવાથી
(C) ફેરસ સલ્ફેટનું આયર્નમાં રિડક્શન થવાથી
(D) સલ્ફુરિક એસિડની ઑક્સિડાઈસિંગ ક્ષમતા
65. બેઝિક મુક્ત મુલકોના વર્ગીકરણમાં કયો સિદ્ધાંત સમાયેલો છે ?
(A) સમાન આયન અસર (B) દ્રાવ્યતા ગુણાકાર (C) આયનોની સંયોજકતા (D) ક્ષારની પ્રબળતા
66. $CuSO_4$ ના દ્રાવણમાં KCN ઉમેરતાં, નીચેનામાંથી કઈ નીપજ બનવાથી તે રંગવિહીન બને છે ?
(A) $[Cu(CN)_4]^{2-}$ (B) $[Cu(CN)_4]^{3-}$ (C) $Cu(CN)_2$ (D) $CuCN$
67. સાંદ્ર H_2SO_4 માં ક્લોરાઈડ ક્ષાર ઉમેરતાં રંગવિહીન ધુમાડા ઉદ્ભવે છે પરંતુ આયોડાઈડ ક્ષારના કિસ્સામાં જાંબલી ધુમાડા નીકળે છે. કારણ કે...
(A) H_2SO_4 એ HI નું I_2 માં રિડક્શન કરે છે. (B) HI જાંબલી રંગનો છે.
(C) HI નું I_2 માં ઑક્સિડેશન થવાથી. (D) HI એ KIO_3 માં ફેરવવાથી.
-

68. એસિડિક માધ્યમમાં KMnO_4 ની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં એસિડિક માધ્યમ બનાવવા માટે HCl શા માટે વાપરી શકાતો નથી ?
- (A) HCl અને KMnO_4 બંને ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વર્તે છે.
 (B) KMnO_4 એ HCl નું Cl_2 માં ઓક્સિડેશન કરે છે, તે પણ ઓક્સિડેશનકર્તા છે.
 (C) KMnO_4 એ HCl કરતાં નિર્બળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે.
 (D) HCl ની હાજરીમાં KMnO_4 એ રિડક્શનકર્તા તરીકે વર્તે છે.
69. સોડિયમ નાઈટ્રોપ્રુસાઈડ $[\text{Na}_2(\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO})]$ એ કયા તત્વની પરખ માટે વપરાય છે ? તેમજ કયું સંયોજન બને છે ?
- (A) સલ્ફર, $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$ (B) નાઈટ્રોજન, $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
 (C) સલ્ફર, $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_4\text{NOS}]$ (D) સલ્ફર, $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})\text{NOS}]$
70. 0.1 M Fe^{2+} ના 40.0 મિલિ દ્રાવણના ઓક્સિડેશન માટે 0.02 M MnO_4^- ના દ્રાવણનું કેટલું કદ જરૂરી હશે ?
- (A) 200 મિલિ (B) 100 મિલિ (C) 40 મિલિ (D) 20 મિલિ
71. નેસ્લરનો પ્રક્રિયક એ નીચેનામાંથી કયા આયનની પરખ માટે ઉપયોગી છે ?
- (A) CrO_4^{2-} (B) PO_4^{3-} (C) MnO_4^- (D) NH_4^+
72. ધાતુ ઓક્સાઈડ કે જે ગરમ હોય ત્યારે પીળો અને ઠંડો હોય ત્યારે સફેદ છે, તો તે ધાતુ ઓક્સાઈડ કયો હશે ?
- (A) ZnO (B) CuO (C) PbO (D) બધા જ
73. ક્ષારનું એસિડિક દ્રાવણ કે જે સ્ટાર્ચ આયોડાઈડના દ્રાવણ સાથે ઘેરો વાદળી રંગ આપે છે, તો તે ક્ષાર કયો હશે ?
- (A) ક્લોરાઈડ (B) નાઈટ્રાઈટ (C) એસિટેટ (D) બ્રોમાઈડ
74. લેડનું સ્થાન સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 બંનેમાં છે કારણ કે....
- (A) તે એક અને બે એમ બે સંયોજકતા ધરાવે છે. (B) તે અદ્રાવ્ય PbCl_2 ઉત્પન્ન કરે છે.
 (C) તે લેડ સલ્ફાઈડ ઉત્પન્ન કરે છે. (D) તેના ક્લોરાઈડ પ્રાણીમાં આંશિક દ્રાવ્ય છે.
75. સમૂહ IIIના આયનોનાં પૃથક્કરણ માટે NH_4Cl ના સ્થાને નીચેનામાંથી કોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?
- (A) NH_4NO_3 (B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (C) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (D) NaCl
76. જલીય માધ્યમમાં Na_2S , CuS અને ZnS ના દ્રવ્યતાને સાચો ક્રમ ઓળખો :
- (A) $\text{CuS} > \text{ZnS} > \text{Na}_2\text{S}$ (B) $\text{ZnS} > \text{Na}_2\text{S} > \text{CuS}$
 (C) $\text{Na}_2\text{S} > \text{CuS} > \text{ZnS}$ (D) $\text{Na}_2\text{S} > \text{ZnS} > \text{CuS}$

જવાબો : 59. (A), 60. (B), 61. (C), 62. (B), 63. (D), 64. (A), 65. (B), 66. (B), 67. (C), 68. (B),
 69. (A), 70. (C), 71. (D), 72. (A), 73. (B), 74. (D), 75. (A), 76. (D).