

ફોસ્ફરસના ઍકસોઍસિડ

ક્રમ	નામ	અણુસૂત્ર	Pનો ઍક્સિડેશન આંક	બંધપ્રકાર અને બંધસંખ્યા	બેઝિકતા
(1)	હાઈપો ફોસ્ફરસ ઍસિડ (ફોસ્ફિનિક ઍસિડ)	H_3PO_2	+1	$P - OH \rightarrow 1$ $P - H \rightarrow 2$ $P = O \rightarrow 1$	મોનો
(2)	ઍર્થો ફોસ્ફરસ ઍસિડ (ફોસ્ફોનિક ઍસિડ)	H_3PO_3	+3	$P - OH \rightarrow 2$ $P - H \rightarrow 1$ $P = O \rightarrow 1$	ડાય
(3)	પાયરો ફોસ્ફરસ ઍસિડ	$H_4P_2O_5$	+3	$P - OH \rightarrow 2$ $P - H \rightarrow 2$ $P = O \rightarrow 2$ $P - O - P \rightarrow 1$	ડાય
(4)	હાઈપો ફોસ્ફોરિક ઍસિડ	$H_4P_2O_6$	+4	$P - OH \rightarrow 4$ $P = O \rightarrow 2$ $P - P \rightarrow 1$	ટેટ્રા
(5)	ઍર્થો ફોસ્ફોરિક ઍસિડ	H_3PO_4	+5	$P - OH \rightarrow 3$ $P = O \rightarrow 1$	ટ્રાય
(6)	મેટા ફોસ્ફોરિક ઍસિડ • સાઈક્લો ટ્રાય મેટાફોસ્ફોરિક ઍસિડ • રેખીય ટ્રાય મેટા ફોસ્ફોરિક ઍસિડ	HPO_3 $(HPO_3)_3$ $(HPO_3)_n$	+5 +5 +5	$P - OH \rightarrow 3$ $P = O \rightarrow 3$ $P - O - P \rightarrow 3$ $P = O \rightarrow 1$ $P - OH \rightarrow 1$ $P - O - P \rightarrow 1$	ટ્રાય મોનો
(7)	પાયરો ફોસ્ફોરિક ઍસિડ	$H_4P_2O_7$	+5	$P - OH \rightarrow 4$ $P = O \rightarrow 2$ $P - O - P \rightarrow 1$	ટેટ્રા
(8)	પેરોક્ષો મોનો ફોસ્ફોરિક ઍસિડ	H_3PO_5	+5	$P - O - O - H \rightarrow 1$ $O - H \rightarrow 2$ $P = O \rightarrow 1$	ટ્રાય
(9)	પેરોક્ષો ડાયફોસ્ફોરિક ઍસિડ	$H_4P_2O_8$	+5	$O - H \rightarrow 4$ $P = O \rightarrow 2$ $P - O - O - P \rightarrow 1$	ટેટ્રા

● ફોસ્ફરસ અને તેનાં સંયોજનો

64. નીચે પૈકી કયા મિશ્રણને વિદ્યુતભટ્ટીમાં ગરમ કરતા ફોસ્ફરસનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે ?
 (A) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2$ (B) $\text{SiO}_2 + \text{C}$ (C) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{C}$ (D) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 + \text{C}$
65. $\text{P}_{4(s)} + 3\text{NaOH}_{(aq)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{PH}_{3(g)} + \boxed{\text{X}}$ આપેલ પ્રક્રિયામાં Xને ઓળખો.
 (A) Na_3PO_4 (B) Na_2HPO_4 (C) NaH_2PO_4 (D) NaH_2PO_2
66. નીચે પૈકી કોના સંપર્કમાં ફોસ્ફિન આવતાં ધડાકો થાય છે ?
 (A) HNO_3 (B) Cl_2 (C) Br_2 (D) આપેલા બધા જ
67. હોલ્મ્સ સિગ્નલમાં ઉપયોગી ફોસ્ફરસનું સંયોજન કયું છે ?
 (A) PH_3 (B) P_2O_5 (C) Ca_3P_2 (D) P_2O_3
68. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયામાં ફોસ્ફિન ઉત્પન્ન થતો નથી ?
 (A) સફેદ Pને NaOH સાથે ગરમ કરતાં (B) લાલ Pને NaOH સાથે ગરમ કરતાં
 (C) Ca_3P_2 ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી (D) P_4O_6 ની પાણી સાથે ગરમ કરતાં
69. P_4O_6 માં પ્રત્યેક P પરમાણુ સાથે જોડાયેલા O પરમાણુની સંખ્યા તથા P_4O_{10} માં ટુંકા P—O બંધની સંખ્યા અનુક્રમે કેટલી હોય છે ?
 (A) 1.5, 2 (B) 2, 1 (C) 3, 4 (D) 4, 3
70. $\text{P}_{4(s)} + 8\text{SOCl}_{2(l)} \rightarrow 4\boxed{\text{X}} + 4\boxed{\text{Y}} + 2\boxed{\text{Z}}$ આપેલ પ્રક્રિયામાં X, Y, Z અનુક્રમે શું છે ?
 (A) PCl_5 , SO_2 , S_2Cl_2 (B) POCl_3 , SO_2 , SOCl_2 (C) PCl_3 , SO_3 , S_2Cl_2 (D) PCl_3 , SO_2 , S_2Cl_2
71. PCl_5 અણુનો આકાર અને સંકરણ અનુક્રમે કયા છે ?
 (A) ત્રિકોણીય દ્વિ-પિરામિડ, sp^3d (B) પિરામિડલ, dsp^3
 (C) ત્રિકોણીય દ્વિ-પિરામિડ, sp^3 (D) સમતલીય ત્રિકોણ, sp^3d^2
72. દીવાસળીની પેટીની બંને બાજુ શેનું કોર્ટિંગ લગાવેલું હોય છે ?
 (A) પોટેશિયમ ક્લોરેટ અને લાલ લેડ (B) પોટેશિયમ ક્લોરેટ અને એન્ટિમની સલ્ફાઈડ
 (C) એન્ટિમની સલ્ફાઈડ અને લાલ ફોસ્ફરસ (D) એન્ટિમની સલ્ફાઈડ અને લાલ લેડ
73. નીચેની પ્રક્રિયામાં ફોસ્ફોરિક એસિડનું તુલ્ય દળ કેટલું છે ?
 $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 (A) 25 (B) 49 (C) 59 (D) 98
74. ચક્રીય મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડમાં P—O—P બંધની સંખ્યા કેટલી છે ?
 (A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4
75. નીચે પૈકી કોની હાજરીને લીધે PH_3 સ્વયંભૂ દહનનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?
 (A) P_4 ની બાષ્પ (B) P_2H_4 ની બાષ્પ (C) P_2H_6 ની બાષ્પ (D) ભેજ

76. નીચે પૈકી શેમાં P—O—P બંધ આવેલો નથી ?

- (A) આઈસો હાઈપો ફોસ્ફોરિક એસિડ (B) ડાય ફોસ્ફરસ એસિડ
(C) ડાય ફોસ્ફોરિક એસિડ (D) હાઈપો ફોસ્ફોરિક એસિડ

77. નીચે પૈકી કયો ટ્રાય બેઝિક એસિડ છે ?

- (A) H_4PO_2 (B) H_3PO_4 (C) $H_4P_2O_7$ (D) H_3PO_3

78. પોલિમેટા ફોસ્ફોરિક એસિડમાં પુનરાવર્તિત થતો ભાગ કયો છે ?

- (A) HPO_3 (B) H_3PO_2 (C) H_3PO_3 (D) HPO_2

79. યોગ્ય જોડ ન હોય તેને ઓળખો :

- (A) ઓર્થો ફોસ્ફરસ એસિડ — ડાયબેઝિક — Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +3
(B) ડાય ફોસ્ફોરિક એસિડ — ટેટ્રા બેઝિક — Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +5
(C) હાઈપોફોસ્ફોરિક એસિડ — ટેટ્રા બેઝિક — Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +4
(D) ફોસ્ફોનિક એસિડ — ડાયબેઝિક — Pનો ઓક્સિડેશન આંક = +1

80. ફોસ્ફરસના નીચેના ઓક્સો એસિડ પૈકી પ્રબળ રિડક્શનકર્તા કયો છે ?

- (A) હાઈપો ફોસ્ફરસ એસિડ (B) ફોસ્ફરસ એસિડ
(C) હાઈપો ફોસ્ફોરિક એસિડ (D) પાયરો ફોસ્ફરસ એસિડ

જવાબો : 64. (D), 65. (D), 66. (D), 67. (C), 68. (B), 69. (C), 70. (D), 71. (A), 72. (C),
73. (D), 74. (C), 75. (B), 76. (D), 77. (B), 78. (A), 79. (D), 80. (A)

● સમૂહ 16 (ચાલ્કોજન સમૂહ)

સામાન્ય માહિતી, e^- રચના, પ્રાપ્તિસ્થાન, ઓક્સિડેશન અવસ્થા તથા ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો :

● સમૂહ 16માં ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને પોલોનિયમ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. આ તત્વોને ઓક્સિજન સમૂહનાં તત્વો અથવા ચાલ્કોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

● ઇલેક્ટ્રોનીય રચના : સમૂહ-16નાં તત્વોની સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ns^2np^4 છે.

● પ્રાપ્તિસ્થાન :

● ઓક્સિજન પૃથ્વી પર સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મળી આવતું તત્વ છે.

● પૃથ્વીના પોપડામાં દળથી 46.6 % જેટલું ઓક્સિજન સૂકી હવામાં કદથી 20.946 % જેટલું ઓક્સિજન

● પૃથ્વીના પોપડામાં દળથી 0.03-0.1 % જેટલો સલ્ફર હોય છે, જે સંયોજિત સ્વરૂપે જોવા મળે છે.

સલ્ફેટ સંયોજનો $\rightarrow$ જિપ્સમ ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)

$\rightarrow$ ઇપ્સમ સોલ્ટ ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$)

$\rightarrow$ બેરાઈટ ($BaSO_4$)

- સલ્ફાઈડ સંયોજનો → ગેલિના (PbS)
→ ઝિંક-બ્લેન્ડ (ZnS)
→ કોપર પાઈરાઈટ્સ (CuFeS₂) સ્વરૂપે મળે છે.

● ઓક્સિડેશન-અવસ્થા

તત્વો	0	S	Se	Te	Po
ઓક્સિડેશન-અવસ્થા	-2, -1, +1, +2	-2, +2, +4, +6	-2, +2, +4, +6	-2, +2, +4, +6	+2, +4

- (-2) ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયિતા સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઘટે છે.
- પોલોનિયમ (-2) ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવતું નથી.
- OF₂ માં ઓક્સિજનની ઓક્સિડેશન-અવસ્થા (+2) છે.
- સમૂહ-16માં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં +6 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયિતા ઘટે છે અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયિતા વધે છે.

● ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા

ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા :

- સમૂહ-16માં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણ્વિય અને આયનીય ત્રિજ્યા વધે છે. (અપવાદ : ઓક્સિજન)
- સમૂહ-16માં નીચે તરફ જતાં આયનીકરણ એન્ટાલ્પીનું મૂલ્ય ઘટે છે.
- સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુતઋણતા ઘટે છે.

● રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા

- સમૂહ-16નાં બધાં તત્વો હાઈડ્રોજન તત્વ સાથે પ્રક્રિયા કરી H₂M (જ્યાં M = S, Se, Te, Po) પ્રકારના હાઈડ્રાઈડ બનાવે છે. સમૂહમાં H₂O થી H₂Te તરફ જતાં હાઈડ્રાઈડ સંયોજનોનો એસિડિક ગુણધર્મ વધતો જાય છે.
- સમૂહ-16નાં બધાં તત્વો ઓક્સિજન તત્વ સાથે પ્રક્રિયા કરી MO₂ અને MO₃ પ્રકારના ઓક્સાઈડ બનાવે છે.
- ડાયોક્સાઈડ સંયોજનોનો રિડક્શનકર્તા તરીકેનો ગુણધર્મ SO₂ થી TeO₂ તરફ જતાં ઘટે છે. SO₂ રિડક્શનકર્તા છે, જ્યારે TeO₂ ઓક્સિડેશનકર્તા છે. આ બધા ઓક્સાઈડ એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે છે.
- સમૂહ-16નાં તત્વો માટે હેલાઈડ સંયોજનોની સ્થાયિતાનો ક્રમ F⁻ > Cl⁻ > Br⁻ > I⁻ છે. હેક્ઝાહેલાઈડ સંયોજનો પૈકી માત્ર હેક્ઝાફ્લોરાઈડ સંયોજનો સ્થાયી માલૂમ પડ્યા છે.

81. સમૂહ-16નું કયું તત્વ -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું નથી ?

- (A) ટેલુરિયમ (B) સેલેનિયમ (C) પોલોનિયમ (D) સલ્ફર

82. બેરિયમની સલ્ફેટયુક્ત ખનીજ કઈ છે ?

- (A) બેરાઈટ (B) ગેલીના (C) ઝિંકાઈટ (D) જિપ્સમ

83. સમૂહ-16માં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં હાઈડ્રાઈડ સંયોજનોમાં બંધકોણ ઘટે છે. કારણ કે,

- (A) બંધકારક યુગ્મ-બંધકારક યુગ્મ વચ્ચેનું અપાકર્ષણ વધે છે.
- (B) બંધકારક યુગ્મ-બંધકારકયુગ્મ વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઘટે છે.
- (C) મધ્યસ્થી પરમાણુની વિદ્યુતઋણતા ઘટે છે.
- (D) મધ્યસ્થી પરમાણુની વિદ્યુતઋણતા વધે છે.

84. નીચે પૈકી કોની ચુંબકીય ચાકમાત્રા સૌથી વધુ છે ?



- (A) H_2O (B) H_2S (C) H_2Se (D) H_2Te

જવાબો : 81. (C), 82. (A), 83. (C), 84. (D)





● ઓક્સિજન

● ડાયઑક્સિજન વાયુની બનાવટ :


- (i) $KClO_3$ અને $KMnO_4$ જેવાં ઓક્સિજનયુક્ત સંયોજનોના ઉષ્મીય વિઘટન અથવા એસિડમય પાણીના વિદ્યુતવિભાજનથી મેળવાય છે.



- (ii) કેટલીક ધાતુઓના ઓક્સાઈડના ઉષ્મીય વિઘટનથી ડાયઑક્સિજન વાયુ મળે છે.



- (iii) મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઈડની હાજરીમાં H_2O_2 નું વિઘટન થઈ ડાયઑક્સિજન વાયુ મળે છે.





● ડાયઑક્સિજન વાયુના ગુણધર્મો અને ઉપયોગો

(i) ભૌતિક ગુણધર્મો :

- ડાયઑક્સિજન રંગવિહીન અને ગંધવિહીન વાયુ છે તે અનુચુંબકીય છે.
- તે ત્રણ સમસ્થાનિકો ^{16}O , ^{17}O , ^{18}O ધરાવે છે જે સ્થાયી છે.
- 293K તાપમાને $100cm^3$ પાણીમાં $3.08cm^3$ જેટલો ડાયઑક્સિજન વાયુ દ્રાવ્ય થાય છે, જે દરિયાઈ અને જલીય સજીવોના જીવન ટકાવી રાખવા પૂરતો છે.
- તે 90K તાપમાને પ્રવાહીમાં તથા 55K તાપમાને ઠંડું પછી ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે છે.

(ii) રાસાયણિક ગુણધર્મો :

ડાયઑક્સિજન વાયુ કેટલીક નિષ્ક્રિય ધાતુઓ (દા.ત., Au, Pt) અને ઉમદા વાયુ તત્ત્વો સિવાયના મોટા ભાગનાં ધાતુ તત્ત્વો અને અધાતુ તત્ત્વો સાથે પ્રક્રિયા કરે છે.



● ઉપયોગ

- ડાયઑક્સિજન વાયુ શ્વસનક્રિયામાં, દહન પ્રક્રિયામાં, સ્ટીલની બનાવટમાં ઓક્સિ, એસિટિલિન જ્યોતમાં અને ધાતુના વેલ્ડિંગ કાર્યમાં વપરાય છે.
- ડાય ઓક્સિજન વાયુના સિલિન્ડર હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સારવાર માટે તથા પર્વતારોહણે અને પાણીમાં ઊંડે જતા મરજીવાઓની તથા વિમાનમાં બેઠેલા યાત્રીઓની શ્વસનક્રિયા માટે ઉપયોગી છે.
- ઓક્સિજન તત્ત્વની સંયોજકતા કક્ષામાં d-કક્ષકો પ્રાપ્ય નથી. તેથી તે નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ (−2, −1, 1, 2) ધરાવે છે. જ્યારે સમૂહનાં અન્ય તત્ત્વોમાં d-કક્ષકો પ્રાપ્ય હોવાને કારણે સંયોજકતા કક્ષાનું વિસ્તરણ થઈ શકે છે. તેથી આ તત્ત્વો ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ (−2, 2, 4, 6) ધરાવે છે.

● ઓક્સિજનમાં સંયોજનો

(i) સાદા ઓક્સાઇડ : ઓક્સિજન બીજા તત્ત્વ સાથે સંયોજાઈ દ્વિઅંગી સંયોજન બનાવે છે તેને ઓક્સાઇડ કહે છે.

- જે ઓક્સાઇડ સંયોજનો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી એસિડ આપે છે તેને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહે છે. દા.ત., SO_2 , Cl_2O_7 , CO_2 , N_2O_5 , HClO_4 , P_4O_{10}
- સામાન્ય રીતે અધાતુના ઓક્સાઇડ એસિડિક હોય છે.

અપવાદ : ધાતુના છતાં એસિડિક હોય તેવા ઓક્સાઇડ

દા.ત., Mn_2O_7 , CrO_3 , V_2O_5


- જે ઓક્સાઇડ સંયોજનો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી બેઈઝ આપે છે તેને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહે છે. દા.ત., Na_2O , CaO , BaO , Fe_2O_3 , MgO
- કેટલાક ઓક્સાઇડ એસિડિક અને બેઝિક એમ બંને સ્વભાવ ધરાવતા હોય છે. આ ઓક્સાઇડને ઊભયગુણી ઓક્સાઇડ કહે છે. દા. ત. Al_2O_3 .
- કેટલાક ઓક્સાઇડ એસિડિક કે બેઝિક પૈકીનો એક પણ સ્વભાવ ધરાવતા નથી. આ ઓક્સાઇડને તટસ્થ ઓક્સાઇડ કહે છે. દા.ત., CO , NO અને N_2O .

(ii) ઓઝોન :

- ઓઝોન ઓક્સિજનનું અપરરૂપ છે. દરિયાની સપાટીથી 20 કિલોમીટર ઊંચાઈએ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં વાતાવરણના ઓક્સિજનમાંથી ઓઝોન વાયુ બને છે.

બનાવટ :

- ઓદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે સિમેન્સ અને હેલેસ્કેનું ઓઝોનાઈઝર વપરાય છે. સિમેન્સના ઓઝોનાઈઝરમાં ઠંડા, શુષ્ક ઓક્સિજનને શાંત વિદ્યુત વીજભારની હાજરીમાં પસાર કરતાં ઓઝોન મળે છે.






- એલ્યુમિનિયમના સળિયાઓ વચ્ચે 8000થી 10000 વોલ્ટ વિદ્યુતદબાણ વપરાય છે. વિદ્યુતવિભાજન પદ્ધતિમાં એસિડિક પાણીમાં પ્લેટિનમ ધ્રુવોનો ઉપયોગ કરી એનોડ પર મળતાં વાયુમાં 95 % ઓઝોન અને 5% ઓક્સિજન વાયુ હોય છે.

● ભૌતિક ગુણધર્મો

- ઓઝોન વાયુ-સ્વરૂપમાં આછો ભૂરો રંગ, પ્રવાહી સ્વરૂપમાં ઘેરો ભૂરો રંગ અને ઘન સ્વરૂપમાં ઘેરો જાંબલી રંગ ધરાવે છે.
- ઓઝોન લાક્ષણિક વાસ ધરાવે છે.
- ઓઝોનનું ઓછું પ્રમાણ નુકસાનકારક નથી પરંતુ તેનું પ્રમાણ 100 ppm કરતાં વધી જાય, તો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. તેને પરિશામે માથાનો દુખાવો અને ગૂંગળામણનો અનુભવ થાય છે.

● રાસાયણિક ગુણધર્મો

- ઓઝોન પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે. તેથી ઓઝોન વાયુ લેડ સલ્ફાઇડનું લેડ સલ્ફેટમાં અને આયોડાઇડ આયનનું આયોડિનમાં ઓક્સિડેશન કરે છે.
- સુપરસોનિક જેટ વિમાનના એક્ઝોસ્ટ દ્વારા બહાર નીકળતા વાયુઓમાંના નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ સાથે ઓઝોન પ્રક્રિયા કરીને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બનાવે છે.
- આ જ પ્રમાણે ભેજયુક્ત સલ્ફર, ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક સાથે ઓક્સિડેશન કરી ઓક્સિએસિડ સંયોજનો બનાવે છે.



ઉપયોગો :

- પીવાના પાણીને જીવાણુમુક્ત કરવા ઓઝોન વાયુનો ઉપયોગ થાય છે.
- તે વિવિધ તેલ, લોટ અને સ્ટાર્ચની વિરંજન ક્રિયામાં વિરંજક તરીકે ઉપયોગી છે.
- તે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટના ઉત્પાદનમાં ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે ઉપયોગી છે.

85. નીચે પૈકી કયું સંયોજન ગરમ કરતાં ડાય ઓક્સિજન આપશે નહીં ?

- (A) HgO (B) KMnO₄ (C) (NH₄)₂Cr₂O₇ (D) KClO₃

86. ઓક્સિજન તત્વ નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે કારણ કે,

- (A) સંયોજકતા કક્ષામાં d કક્ષકો પ્રાપ્ય નથી. (B) સંયોજકતા કક્ષાનું વિસ્તરણ થાય છે.
(C) તે વાયુ સ્વરૂપે છે. (D) આપેલા બધાં જ

87. નીચે પૈકી કયો ઓક્સાઇડ એસિડિક ઓક્સાઇડ નથી ?

- (A) SO₂ (B) CrO₃ (C) Cl₂O₇ (D) Fe₂O₃

88. નીચે પૈકી તટસ્થ ઓક્સાઇડ કયો છે ?

- (A) CO (B) NO (C) NO₂ (D) આપેલા બધાં જ

89. નીચે પૈકી કયું સંયોજન ઓઝોન સાથેની પ્રક્રિયાથી ડાયઑક્સિજન ઉત્પન્ન કરતો નથી ?

- (A) PbS (B) H₂S (C) SO₂ (D) Hg

90. પ્રયોગશાળામાં નીચે પૈકી કઈ પદ્ધતિથી ઓઝોન બનાવવામાં આવે છે ?

- (A) હવામાં UV કિરણો પસાર કરવાથી (B) નીચા તાપમાને F₂ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી
(C) SO₂ ની H₂O₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી
(D) શુષ્ક ઓક્સિજનને શાંત વિદ્યુત વીજભારની હાજરીમાં પસાર કરતાં

91. યોગ્ય જોડકું જોડો :

વિભાગ-I

વિભાગ-II

(P) ZnO

(T) બેઝિક

(A) (P)-(U), (Q)-(V), (R)-(T), (S)-(V), (W)

(Q) V₂O₅

(U) ઊભયગુણી

(B) (P)-(V), (W), (Q)-(U), (R)-(V), (S)-(T)

(R) Fe₂O₃

(V) એસિડિક

(C) (P)-(T), (Q)-(V), (W), (R)-(U), (S)-(V)

(S) H₂S

(W) રિડક્શનકર્તા

(D) (P)-(V), (Q)-(T), (R)-(V), (W), (S)-(U)

જવાબો : 85. (C), 86. (A), 87. (D), 88. (D), 89. (C), 90. (D), 91. (A)

● સલ્ફર

● સલ્ફરનાં અપરરૂપો :


સલ્ફરનાં વિવિધ અપરરૂપોમાં રૂહોમ્બિક (α-સલ્ફર) અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર (β-સલ્ફર) સૌથી અગત્યના છે.

(i) રૂહોમ્બિક સલ્ફર (α-સલ્ફર) :


- ઓરડાના તાપમાને સલ્ફરનું સ્થાયી સ્વરૂપ રૂહોમ્બિક સલ્ફર છે.
- તે પીળા રંગનું હોય છે અને તેનું ગલન બિંદુ 385.8 K છે.
- સલ્ફરના CS₂માં બનાવેલા દ્રાવણનું બાષ્પીભવન કરતાં રૂહોમ્બિક સલ્ફર દ્રાવ્ય છે.
- તે પાણીમાં અદ્રાવ્ય પણ બેન્ઝિન, આલ્કોહોલ જેવા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય છે.

(ii) મોનોક્લિનિક સલ્ફર (β-સલ્ફર) :

- સલ્ફરને 369 K તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે મોનોક્લિનિક સલ્ફરમાં રૂપાંતર પામે છે.
- મોનોક્લિનિક સલ્ફર CS₂માં દ્રાવ્ય છે. તેનું ગલનબિંદુ 393 K છે.
- રૂહોમ્બિક સલ્ફરને એક ડિશમાં પીગાળીને ઠંડું પાડતાં મોનોક્લિનિક સલ્ફર મળે છે.
- મોનોક્લિનિક સલ્ફર 369 K કરતા ઊંચા તાપમાને સ્થાયી છે અને તેનાથી નીચા તાપમાને રૂહોમ્બિક સલ્ફરમાં ફેરવાય છે.
- 369 K તાપમાને બંને અપરરૂપો સ્થાયી છે. આ તાપમાનને સંક્રાંતિ તાપમાન પણ કહે છે.
- આ બંને અપરરૂપો S₈ અણુ ધરાવે છે. આ બંને સ્વરૂપોમાં S₈ અણુઓ કાઉન સ્વરૂપે રહેલા હોય છે.
- S₆ અણુની ચક્રીય રચના ખુરશી સ્વરૂપની રચના ધરાવે છે.



S₈ અણુ




S₆ અણુ

● સલ્ફરનાં સંયોજનો

(1) સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ :


- (i) બનાવટ : સલ્ફરનું જ્યારે હવા અથવા ઓક્સિજન વાયુ સાથે (6 થી 8 % જેટલા સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ સાથે) દહન કરવામાં આવે છે ત્યારે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળે છે.



- પ્રયોગશાળામાં સોડિયમ સલ્ફાઇટની હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મેળવી શકાય છે.



- ઉદ્યોગોમાં સલ્ફાઇડ ખનીજના ભૂંજન દરમિયાન સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઉપનીપજ તરીકે મળે છે.



આ રીતે મેળવેલા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુને (dry) સૂકો કરી દબાણ હેઠળ પ્રવાહી સ્થિતિમાં લાવીને સ્ટીલના સિલિન્ડરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.


(ii) ગુણધર્મો :

ભૌતિક ગુણધર્મો :



- સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ રંગવિહીન તીવ્ર વાસવાળો અને દાહક અસર ઉપજાવતો વાયુ છે. તે પાણીમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય છે.
- ઓરડાના તાપમાને અને 2 બાર દબાણે તેનું પ્રવાહીકરણ થાય છે. તેનું ઉત્કલનબિંદુ 263 K છે.
- સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અણુ કોણીય છે.

રાસાયણિક ગુણધર્મો :



- સલ્ફર ડાયોક્સાઇડને પાણીમાં પસાર કરતાં સલ્ફ્યુરસ એસિડનું દ્રાવણ મળે છે.



- તે NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી પ્રથમ તબક્કામાં સોડિયમ સલ્ફાઇટ બનાવે છે. જે વધુ પ્રમાણમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇટ બનાવે છે.



- ચારકોલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, ક્લોરિન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડ (SO_2Cl_2) બનાવે છે. વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન થતાં સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ બને છે.



- ઍસિડિક $KMnO_4$ ના દ્રાવણને રંગવિહીન કરે છે. આમ તે રિડક્શનકર્તા તરીકે વર્તે છે.



(iii) ઉપયોગો :

- તે પેટ્રોલિયમ અને ખાંડના શુદ્ધીકરણમાં, ઊન અને રેશમને બ્લિચ કરવામાં ઉપયોગી છે.
- કેટલાક કાર્બનિક અને અકાર્બનિક પદાર્થોને દ્રાવ્ય કરવા માટે પ્રવાહી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ દ્રાવક તરીકે વપરાય છે.
- સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સોડિયમ, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ અને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઉપયોગી છે.

(2) સલ્ફ્યુરિક એસિડ H_2SO_4 :


(i) ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન : સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉત્પાદનની સંપર્કવિધિમાં મુખ્યત્વે ત્રણ તબક્કાનો સમાવેશ થાય છે.

(1) સલ્ફર અથવા સલ્ફાઇડ ખનીજનું હવામાં દહન કરી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ મેળવવો.




(2) વેનેડિયમ પેન્ટાકેસાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુનું સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વાયુમાં ઓક્સિજનની મદદથી રૂપાંતર કરવું.

(3) આ રીતે પ્રાપ્ત થયેલા સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વાયુને સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં શોષી ધુમાયમાન સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા ઓલિયમ ($H_2S_2O_7$) મેળવી શકાય છે.



આ રીતે પ્રાપ્ત થયેલા સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વાયુને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં શોષી લેવામાં આવે છે. પરિણામે ધુમાયમાન સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા ઓલિયમ ($H_2S_2O_7$) મળે છે. આ ઓલિયમનું પાણી વડે મંદન કરી જરૂરી સાંદ્રતાવાળો સલ્ફ્યુરિક એસિડ મેળવી શકાય છે.




સંપર્કવિધિથી 96 થી 98 % શુદ્ધતાવાળો H_2SO_4 મેળવી શકાય છે.

● ભૌતિક ગુણધર્મો :

- સલ્ફ્યુરિક એસિડ રંગવિહીન ઘટ્ટ તૈલી પ્રવાહી છે.
- તેની વિશિષ્ટ ઘનતા 298K તાપમાને 1.84 છે.
- તેનું ઠારબિંદુ 283K અને ઉત્કલનબિંદુ 611K છે.


● રાસાયણિક ગુણધર્મો :

- નીચી બાષ્પશીલતાના કારણે તે અન્ય એસિડની બનાવટમાં વપરાય છે.





(જ્યાં M ધાતુ આયન અને $X = F^-, Cl^-, NO_3^-$)

- સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રબળ ભેજશોષક પદાર્થ છે. ભેજવાળા વાયુઓને સાંદ્ર H_2SO_4 માંથી પસાર કરતાં તે સૂકા બને છે. (આ વાયુઓ H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરતા ન હોવા જોઈએ.) તે કાર્બનિક સંયોજનોમાંથી પાણી દૂર કરે છે.



આ ચેરિંગ પ્રક્રિયાથી ખાંડ કાળી પડી જાય છે.

- ગરમ સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વર્તે છે. ધાતુ અને અધાતુઓનું સાંદ્ર H_2SO_4 વડે ઓક્સિડેશન થાય છે અને સલ્ફ્યુરિક એસિડનું રિડક્શન થઈ SO_2 માં રૂપાંતર થાય છે.




ઉપયોગો :

- મોટા ભાગના રાસાયણિક પદાર્થો જેવા કે ખાતર, રંગ, સાંશ્લેષિત રેસા, સાબુ અને ડિટરજન્ટની બનાવટમાં તથા પેટ્રોલિયમ શુદ્ધીકરણ અને ધાતુ કર્મવિધિમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ વિશેષ ઉપયોગી હોવાથી તેને ‘રસાયણોનો રાજા’ કહેવામાં આવે છે.
- તે પ્રયોગશાળામાં પ્રક્રિયક તરીકે પણ વપરાય છે.

(3) સલ્ફરના ઓક્સો એસિડ :


(i) સલ્ફ્યુરસ એસિડ

- અણુસૂત્ર : H_2SO_3
- Sનો ઓક્સિડેશન આંક = +4
- બંધારણ :




(ii) સલ્ફ્યુરિક એસિડ

- અણુસૂત્ર : H_2SO_4
- Sનો ઓક્સિડેશન આંક = +6
- બંધારણ :




(iii) થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ :

- અણુસૂત્ર : $H_2S_2O_3$
- Sનો ઓક્સિડેશન આંક : +6, -2
- બંધારણ :



(iv) પેરોક્ષો મોનો સલ્ફ્યુરિક એસિડ (કેરોઝ એસિડ)

- અણુસૂત્ર : H_2SO_5
- Sનો ઓક્સિડેશન આંક : +6
- બંધારણ :




(v) પેરોક્ષો ડાય સલ્ફ્યુરિક એસિડ (માર્શલ એસિડ) : (vi) ડાય થાયોનિક એસિડ :

● અણુસૂત્ર : $H_2S_2O_8$

● Sનો ઓક્સિડેશન : +6


● બંધારણ :



● અણુસૂત્ર : $H_2S_2O_6$

● Sનો ઓક્સિડેશન : +6

● બંધારણ :




(vii) પાયરોસલ્ફ્યુરિક એસિડ (ઓલિયમ) :

● અણુસૂત્ર : $H_2S_2O_7$

● Sનો ઓક્સિડેશન આંક : +6

● બંધારણ :



92. નીચે પૈકીનાં વિધાનો ને α -સલ્ફરની લાક્ષણિકતાને આધારે સત્યાર્થતા નક્કી કરો :

(i) α -સલ્ફર પીળા રંગનું હોય છે.

(ii) તેનું ગલનબિંદુ 385.8K છે.

(iii) પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.

(iv) બેન્ઝિન, આલ્કોહોલ જેવા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય છે.

(A) TTTT

(B) TTFT

(C) TTTF

(D) FFFT

93. કયા તાપમાને સલ્ફરનાં બંને અપરરૂપો સ્થાયી છે ?

(A) 369K

(B) 393K

(C) 396K

(D) 339K

94. સંપર્કવિધિમાં આર્સેનિકની અશુદ્ધિ શેના દ્વારા દૂર થાય છે ?

(A) Fe_2O_3

(B) $\text{Fe}(\text{OH})_3$

(C) $\text{Al}(\text{OH})_3$

(D) $\text{Cr}(\text{OH})_3$

95. H_2SO_4 ના ઉત્પાદન માટેની સંપર્કવિધિ માટે શું સાચું નથી ?

(A) સલ્ફરનું હવામાં દહન થતા SO_2 વાયુ બને.

(B) SO_2 નું ઉદ્દીપકીય ઓક્સિડેશન થતાં SO_3 બને.

(C) SO_3 ને પાણીમાં દ્રાવ્ય કરતાં 100% H_2SO_4 બને.

(D) સંપર્કવિધિથી પ્રાપ્ત થતા H_2SO_4 ની શુદ્ધતા લેડએમ્બર વિધિ કરતાં વધારે હોય છે.

96. આયોડોમેટ્રિક અનુમાપનમાં સલ્ફરનું નીચે પૈકી કયું સંયોજન વપરાય છે ?

(A) Na_2SO_3

(B) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

(C) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

(D) NaHSO_3

97. હાઈપોની પ્રક્રિયા સિલ્વર નાઈટ્રેટના દ્રાવણ સાથે કરતાં અંતે મળતા કાળા અવક્ષેપ કોના હોય છે ?

(A) $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$

(B) Ag_2SO_3

(C) Ag_2S

(D) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$

98. મંદ HCl અને કયો આયન ધરાવતા જલીય દ્રાવણને ગરમ કરતાં તીવ્રવાસવાળો વાયુ અને પીળા અવક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય છે ?

(A) થાયો સલ્ફેટ આયન (B) સલ્ફેટ આયન (C) સલ્ફાઈડ આયન (D) સલ્ફાઈટ આયન

99. નીચે પૈકી કયો મોનો બેઝિક એસિડ છે ?

(A) H_2SO_3 (B) H_2SO_4 (C) H_2SO_5 (D) $H_2S_2O_8$

100. એસિડિક $K_2Cr_2O_7$ ના દ્રાવણમાં SO_2 વાયુ પસાર કરતાં.....

(A) દ્રાવણ વાદળી બને છે. (B) દ્રાવણ રંગવિહીન બને છે.
(C) SO_2 ઉત્પન્ન થાય છે. (D) $Cr_2(SO_4)_3$ લીલા રંગનો પદાર્થ બને છે.

101. લેડ ચેમ્બર વિધિમાં નાઈટ્રોજનના કયા ઓક્સાઈડનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?

(A) NO (B) NO_2 (C) N_2O_3 (D) N_2O_5

102. પેરોક્ષી બંધ ધરાવતો એસિડ કયો છે ?


(A) સલ્ફ્યુરસ એસિડ (B) પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ (C) ડાય થાયોનિક એસિડ (D) કેરોલ એસિડ

103. યોગ્ય જોડકું જોડો.

વિભાગ-I	વિભાગ-II
(P) $H_2S_2O_2$	(T) S—O—S લિંકેજ
(Q) $H_2S_2O_3$	(U) ડાય પ્રોટીક
(R) $H_2S_2O_4$	(V) S = S લિંકેજ
(S) $H_2S_2O_7$	(W) S — S લિંકેજ

(A) (P)-(U), (W), (Q)-(T),(U), (R)-(U), (V), (S)-(U), (V)
(B) (P)-(U), (V), (Q)-(U), (V), (R)-(U), (W), (S)-(T), (U)
(C) (P)-(T), (U), (Q)-(U), (V), (R)-(U), (V), (S)-(U), (W)
(D) (P)-(U), (W), (Q)-(U), (V), (R)-(T), (U), (S)-(U), (V)

104.



(A) પેરોક્ષો ડાય સલ્ફ્યુરિક એસિડ (B) પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ
(C) સલ્ફ્યુરસ એસિડ (D) કેરોલ એસિડ

105. ફોર્મિક એસિડની સાંદ્ર H_2SO_4 સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પાદન થાય છે.

(A) CO (B) NO (C) CO_2 (D) NO_2

106. CO_2 , CuO, CaO, H_2O માટે એસિડિક પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

(A) $CaO < CuO < H_2O < CO_2$ (B) $H_2O < CuO < CaO < CO_2$
(C) $CaO < H_2O < CuO < CO_2$ (D) $H_2O < CO_2 < CaO < CuO$

107. SF_2 , SF_4 , SF_6 માં S પરમાણુનું સંકરણ અનુક્રમે છે.

(A) sp^2 , sp^3 , sp^3d^2 (B) sp^3 , sp^3 , sp^3d^2 (C) sp^3 , sp^3d , sp^3d^2 (D) sp^3 , sp^3d^2 , d^2sp^3

જવાબો : 92. (B), 93. (A), 94. (B), 95. (C), 96. (B), 97. (C), 98. (A), 99. (C), 100. (A),
101. (A), 102. (C), 103. (B) 104. (B), 105. (A), 106. (A), 107. (C).

● સમૂહ-17 હેલોજન સમૂહ

- આવર્ત કોષ્ટકમાં આવેલા સમૂહ-17માં ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન તથા એસ્ટેટાઈનનો સમાવેશ થાય છે.
- સમૂહ-17નાં બધાં જ તત્ત્વો અધાતુઓ છે તથા તે હેલોજન્સ તરીકે ઓળખાય છે.
- સમૂહનો પ્રથમ સભ્ય ફ્લોરિન છે. જે સૌથી વધુ ક્રિયાશીલ અને વિદ્યુતઋણ તત્ત્વ છે. આથી તેને સુપર હેલોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
- એસ્ટેટાઈન એ રેડિયો એક્ટિવ અને ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થતું સમૂહનું છેલ્લું તત્ત્વ છે.

● ભૌતિક ગુણધર્મો :

- સમૂહ 17નાં તત્ત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના ns^2np^5 (જ્યાં $n = 2$ થી 6) પ્રકારની જોવા મળે છે. આદર્શ વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે ફક્ત એક જ ઇલેક્ટ્રોનની ઊણપ જોવા મળે છે.
- સમૂહ-17નાં તત્ત્વોની વિદ્યુતઋણતાનો ક્રમ $F > Cl > Br > I$ પ્રમાણે જોવા મળે છે.
- બધાં જ હેલોજન તત્ત્વોની ઓક્સિડેશન અવસ્થા -1 હોય છે. કેટલાક હેલોજનના ઓક્સાઈડ અને ઓક્સોએસિડ $+4$ અને $+6$ ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ ધરાવતા હોય છે.
- બધાં જ હેલોજન તત્ત્વો અધાતુપણાનો ગુણધર્મ તેની ઊંચી આયનીકરણ એન્ટાલ્પી અને ઊંચી વિદ્યુતઋણતાને કારણે ધરાવે છે.
- બંધલંબાઈનો ક્રમાંક $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ પ્રકારે જોવા મળે છે.
- ઉત્કલનબિંદુનો ક્રમાંક પણ $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ પ્રમાણે જોવા મળે છે.

108. બ્રોમિનમાં S અને P ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અનુક્રમે છે.

- (A) 15, 18 (B) 12, 17 (C) 8, 17 (D) 4, 19

109. નીચેના પૈકી કોની બેઝિકતા સૌથી વધુ છે ?

- (A) F (B) Cl (C) Br (D) I

110. નીચેના પૈકી કોની બંધ-વિયોજન ઉષ્મા ઓછી છે ?

- (A) C – Cl (B) C – F (C) C – Br (D) C – I

111. નીચેના પૈકી કયો ક્રમ યોગ્ય નથી ?

- (A) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$: વિદ્યુતઋણતા (B) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ બંધ-વિયોજન ઊર્જા
(C) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ આયનીકરણ એન્ટાલ્પી (D) આપેલા બધાં

112. નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં બે વિધાનો આપેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

વિધાન (A) : ફ્લોરિનની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી છે.

કારણ (R) : F – F બંધની વિયોજન ઊર્જા બીજા હેલોજનના પ્રમાણમાં ઓછી છે.

- (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સમજૂતી આપે છે.
(B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે. કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સમજૂતી આપતું નથી.
(C) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.
(D) વિધાન (A) ખોટું છે, જ્યારે કારણ (R) સાચું છે.

113. સમૂહ 17માં ઉપરથી નીચે તરફ જતાંમાં વધારો થાય છે.

- (A) વિદ્યુતઋણતા (B) બાષ્પશીલ સ્વભાવ (C) ઓક્સિડેશનકર્તાનો ગુણ (D) આયનીકરણ ત્રિજ્યા

114. નીચેનામાંથી કયો સંયોજન આંશિક હેલાઈડ છે ?

- (A) Cl^- (B) CN^- (C) ICl_2^- (D) ICI

115. એસિડિક પ્રબળતાનો કયો ક્રમ યોગ્ય નથી ?

- (A) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ (B) $\text{HIO}_4 > \text{HBrO}_4 > \text{HClO}_4$
(C) $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_2$ (D) $\text{HF} > \text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3$

116. ધાત્વિક હેલાઈડમાં આયનિક વર્તણૂક જણાવો.

- (A) $\text{MF} < \text{MCl} < \text{MBr} < \text{MI}$ (B) $\text{MF} > \text{MCl} > \text{MBr} > \text{MI}$
(C) $\text{MF} < \text{MCl} < \text{MBr} < \text{MI}$ (D) $\text{MCl} > \text{MF} > \text{MBr} > \text{MI}$

117. હેલોજન સમૂહનાં તત્વોનો પ્રમાણિત રિડક્શન-પોટેન્શિયલનો સાચો ક્રમ જણાવો.

- (A) $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{I}_2 > \text{Br}_2$ (B) $\text{Cl}_2 > \text{F}_2 > \text{I}_2 > \text{Br}_2$ (C) $\text{I}_2 > \text{Br}_2 > \text{Cl}_2 > \text{F}_2$ (D) $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

118. નીચે આપેલાં વિધાનોની સત્યતા ચકાસી સાચા જવાબ માટેનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (A) વિદ્યુતઋણતાનો ક્રમ $\text{I} < \text{Br} < \text{Cl} < \text{F}$ છે.
(B) ઈલેક્ટ્રોનપ્રાપ્તિ એન્ટાલ્પીનો ક્રમ $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$ છે.
(C) કાયોલાઈટ ખનીજ ક્લોરિન પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય ખનીજ છે.
(D) વધુ વિદ્યુતઋણતાવાળું હેલોજન ઓછી વિદ્યુતઋણતા ધરાવતા હેલોજન સાથે BrI_2 જેવાં આંતરહેલોજન સંયોજન બનાવે છે.
(E) ક્લોરિનમાં પ્રવેશતો e^- 3P-કક્ષકમાં જતાં $e^- - e^-$ વચ્ચે આકર્ષણ ફ્લોરિનમાં 2P-કક્ષકમાં પ્રવેશતા e^- કરતાં વધારે હોવાથી Cl કરતાં F ની e^- પ્રાપ્તિ એન્ટાલ્પી વધારે છે.
(F) હેલોજન સમૂહમાંના છેલ્લું તત્વ એસ્ટેટિન રેડિયોસક્રિય તત્વ છે.

- (A) TTFFFT (B) TFTFFT (C) TFFFFT (D) TTFFTT

119. HF ની ઊંચી સ્નિગ્ધતા અને ઊંચું ઉત્કલનબિંદુ એ ને કારણે જોવા મળે છે.

- (A) F_2 અણુની નીચી વિયોજન ઊર્જાને (B) હાઈડ્રોજન બંધના કારણે સુયોજિત સ્વભાવને
(C) HF ના આયોનિક સ્વભાવ (D) ફ્લોરિનની ઊંચી વિદ્યુતઋણતાને

120. હેલોજન બાષ્પશીલ છે કારણ કે,

- (A) તેઓ બધા સહસંયોજક ગુણ છે. (B) તેઓ ઊંચું ઉત્કલનબિંદુ ધરાવે છે.
(C) તેઓ નીચું ઉત્કલનબિંદુ ધરાવે છે. (D) તેઓ ઓરડાના તાપમાને સ્થાયી હોય છે ?

જવાબો : 108. (C), 109. (D), 110. (D), 111. (B), 112. (D), 113. (D), 114. (B), 115. (B),
116. (B), 117. (D), 118. (D), 119. (B), 120. (C)

● રાસાયણિક ગુણધર્મો

(1) ક્રિયાશીલતા :



બધાં જ હેલોજન તત્વો રાસાયણિક રીતે ક્રિયાશીલ હોય છે. હેલોજનની ક્રિયાશીલતા પરમાણ્વિય-ક્રમાંકના વધવા સાથે ઘટે છે. આથી ફ્લોરિન સૌથી વધુ પ્રબળ ક્રિયાશીલ અને આયોડિન સૌથી નિર્બળ ક્રિયાશીલ છે. ક્રિયાશીલતાનો ક્રમ $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$ પ્રમાણે છે.

(2) ... :



- હેલોજન તત્વો બધા જ પ્રકારનાં તત્વો જેવા કે He , Ne અને Ar સાથે જોડાઈને હેલાઈડ્સ ઉત્પન્ન કરે છે.
- હેલાઈડ આયનો (X^-) રિડક્શનકર્તા તરીકે ઉપયોગી છે તેની રિડક્શનકર્તાનો ક્રમાંક $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$ પ્રમાણે જોવા મળે છે.

(3) હાઈડ્રોજન હેલાઈડ :

- હેલોજન તત્વો હાઈડ્રોજન સાથે સીધા જ જોડાઈને હાઈડ્રોજન હેલાઈડ આપે છે.
- HF અને HClની બનાવટ માટેની પ્રક્રિયાઓ :





- HBr અને HIની બનાવટની પ્રક્રિયાઓ :





(4) ઓક્સાઈડ :

હેલોજન તત્વો ઓક્સિજન સાથે જોડાતા નથી. ઓક્સિજનના હેલોજન સાથેનાં સંયોજનો આડકતરી પદ્ધતિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.

- ફ્લોરિનના ઓક્સિજન સાથેનાં ફક્ત બે સંયોજનો દા.ત., ઓક્સિજન ડાયફ્લોરીન અને ઓક્સિજન ફ્લોરાઈડ જાણીતા છે.
- જ્યારે ક્લોરિન ખૂબ વિશાળ પ્રમાણમાં ઓક્સાઈડ બનાવે છે. દા.ત., Cl_2O , ClO_2 , Cl_2O_6 અને Cl_2O_7
- આયોડીન ફક્ત એક જ ઓક્સાઈડ આપે છે. દા.ત., I_2O_5
- બ્રોમીનના ત્રણ ઓક્સાઈડ જાણીતા છે. દા.ત., Br_2O , BrO_2 , અને BrO_3
- બધાં જ હેલોજન ઓક્સાઈડ પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વર્તે છે.
- ઓક્સિડેશનકર્તાનો ક્રમ $\text{Cl}_2\text{O} > \text{ClO}_2 > \text{Cl}_2\text{O}_6 > \text{Cl}_2\text{O}_7$ પ્રમાણે જોવા મળે છે.
- ઓક્સિજન ફ્લોરાઈડ્સની બનાવટનું સમીકરણ :




● બંધારણ





● ઉપયોગ : (O₂F₂)

O₂F₂ અને OF₂ બંને પ્રબળ ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ છે.
O₂F₂નો ઉપયોગ PuF₆માંથી Puને દૂર કરવા થાય છે.

● ક્લોરિન ઓક્સાઈડના બંધારણ




- બ્રોમિન ઓક્સાઈડના બંધારણ ક્લોરિન ઓક્સાઈડ જેવા જ હોય છે.
- આયોડિન પેન્ટોક્સાઈડની બનાવટનું સમીકરણ :



ઉપયોગ : I_2O_5 એ સારો ઓક્સિડેશનકર્તા છે, જેનો ઉપયોગ વાતાવરણ કે વાયુમિશ્રણમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઈડનું પ્રમાણ જાણવા થાય છે.

બંધારણ :



(5) હેલોજનના ઓક્સોએસિડ :


ફ્લોરિન તત્વના નાના કદ અને વધુ વિદ્યુતઋણમયતાને કારણે તે ફક્ત એક જ ઓક્સોએસિડ બનાવે છે. HOFને ફ્લોરિક (I) એસિડ અથવા હાઈપોફ્લોરસ એસિડ કહે છે.

બીજાં હેલોજન તત્વો વધુ સંખ્યામાં ઓક્સોએસિડ સંયોજનો બનાવે છે. મોટાં ભાગનાં સંયોજનોને શુદ્ધ સ્વરૂપે અલગ પાડી શકાતાં નથી. તેઓ જલીય દ્રાવણ તરીકે કે ક્ષારરૂપ સ્થાયી હોય છે. હેલોજનના ઓક્સોએસિડ નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા છે :


હેલિક (I) એસિડ (હાઈપોહેલસ એસિડ)	HOF (હાઈપોફ્લોરસ એસિડ)	HOCl (હાઈપોકલોરસ એસિડ)	HOBr (હાઈપોબ્રોમસ એસિડ)	HOI (હાઈપોઆયોડસ એસિડ)
હેલિક (II) એસિડ (હેલસ એસિડ)	-	HOCIO (ક્લોરસ એસિડ)	-	-
હેલિક (V) એસિડ (હેલસ એસિડ)	-	HOClO ₂ (ક્લોરસ એસિડ)	HOBrO ₂ (બ્રોમિક એસિડ)	HOIO ₂ (આયોડિક એસિડ)
હેલિક (VII) એસિડ (પરહેલિક એસિડ)	-	HOClO ₃ (પરક્લોરિક એસિડ)	HOBrO ₃ (પરબ્રોમિક એસિડ)	HOIO ₃ (પરઆયોડિક એસિડ)

● હેલોજનનાં ઓક્સોએસિડ સંયોજનોની પ્રબળતા, હેલોજનની ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધવા સાથે વધે છે. દા. ત., HClO અતિ નિર્બળ છે. જેમાં તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા (+1) છે.


- HClO₄ ખૂબ જ પ્રબળ એસિડ છે. જેમાં Clની ઓક્સિડેશન અવસ્થા (+7) છે.
- નીચે કેટલાક ઓક્સોએસિડના માત્ર બંધારણ નીચે આપેલા છે :




હાઈપોકલોરસ એસિડ



ક્લોરસ એસિડ



ક્લોરસ એસિડ




પરક્લોરિક એસિડ





(6) આંતરહેલોજન સંયોજનો :

બે જુદાં-જુદાં હેલોજન તત્વો એકબીજાં સાથે પ્રક્રિયા કરી જે સંયોજનો બનાવે છે તેને આંતરહેલોજન સંયોજનો કહે છે. દા.ત., XX', XX₃', XX₅' અને XX₇' સંયોજનો : જ્યાં X = મોટાં કદનાં હેલોજન તત્વો X' = નાનાં કદનાં હેલોજન તત્વો.

(i) બનાવટ :

આંતરહેલોજન સંયોજનો, હેલોજન તત્વોની એકબીજા સાથેની સીધી પ્રક્રિયાથી મેળવી શકાય છે :





(i) ગુણધર્મો :


આંતરહેલોજન સંયોજનોના કેટલાક ગુણધર્મો આપેલા કોષ્ટકમાં દર્શાવેલા છે :

પ્રકાર	રાસાયણિક સૂત્ર	ભૌતિકસ્થિતિ અને રંગ	બંધારણ (આકાર)
XX'	ClF	રંગવિહીન વાયુ	-
	BrF	આછો બદામી રંગ	-
	IF	સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક પદ્ધતિથી ઓળખવામાં આવે છે.	-
	BrCl	વાયુ	-
	ICl	ચળકતો લાલ ઘન (α -સ્વરૂપ)	-
	IBr	લાલ ઘન (β -સ્વરૂપ) કાળો ઘન	-
XX' ₃	ClF ₃	રંગવિહીન વાયુ	કોણીય T-આકાર
	BrF ₃	પીળું લીલું પ્રવાહી	કોણીય T-આકાર
	IF ₃	પીળો પાઉડર	કોણીય T-આકાર
	ICl ₃	નારંગી રંગનો ઘન	કોણીય T-આકાર
XX' ₅	IF ₅	રંગવિહીન વાયુ પરંતુ 77Kથી નીચા તાપમાને ઘન	સમચોરસ પિરામિડલ
	BrF ₅	રંગવિહીન પ્રવાહી	સમચોરસ પિરામિડલ
	ClF ₅	રંગવિહીન પ્રવાહી	સમચોરસ પિરામિડલ
XX' ₇	IF ₇	રંગવિહીન વાયુ	પેન્ટાગોનલ બાય પિરામિડલ

(a) ભૌતિક ગુણધર્મો : મોટા ભાગનાં આંતરહેલોજન સંયોજનો બાષ્પશીલ ઘન અથવા પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે. કેટલાંક સંયોજનો વાયુસ્વરૂપે પણ હોય છે. (આપેલા કોષ્ટક મુજબ)


(b) રાસાયણિક ગુણધર્મો : સામાન્ય રીતે આંતરહેલોજન સંયોજનો, તેના અનુવર્તી હેલોજન તત્ત્વ કરતાં વધુ સક્રિય હોય છે. કારણ કે આંતરહેલોજન સંયોજનોમાં X - X' બંધ, X - X બંધની સાપેક્ષમાં નિર્બળ છે.

આંતરહેલોજન સંયોજનોના જળવિભાજનથી તેમાંના નાના કદના હેલોજન તત્ત્વમાંથી હેલાઇડ, આયન અને મોટા કદના હેલોજન તત્ત્વમાંથી હાઇડ્રોહેલાઇડ, (XX' માટે), હેલાઇડ (XX'₃ માટે) હેલેટ (XX'₅ માટે) અને પરહેલેટ (XX'₇ માટે) આયન બને છે.



(3) ઉપયોગો :

- આંતરહેલોજન સંયોજનો બિનજલીય દ્રાવક તરીકે વપરાય છે.
- તે ખૂબ સારા ફ્લોરિનોટિંગ પ્રક્રિયકો છે.
- ClF_3 અને BrF_3 નો ઉપયોગ U^{235} મેળવવા માટેના UF_6 ના સંકેન્દ્રણ માટે થાય છે.



121. કાચના નિખેરણ (ડિઝાઇન) માટે વપરાતો હોવાથી તેને કાચના પાત્રમાં ન ભરી શકાય.

- (A) HI (B) HBr (C) HCl (D) HF

122. નીચેના પૈકી સ્થિરતાના સંદર્ભમાં કયો ક્રમ સાચો છે ?

- (A) $\text{HF} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HI}$ (B) $\text{HI} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HF}$
 (C) $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$ (D) $\text{HF} > \text{HI} > \text{HCl} > \text{HBr}$

123. XX_3' પ્રકારનાં આંતરહેલોજન સંયોજનોના આકાર છે.

- (A) પેન્ટાગોનલ બાય પિરામિડલ (B) સમચોરસ પિરામિડલ
 (C) કોણીય T-આકાર (D) અષ્ટફલકીય

124. નીચેનાં વિધાનો માટે T કે F સંકેત વાપરીને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

- (1) હાઈપો હેલાઈટ આયન = $(\text{OX}_2)^-$ (2) હેલાઈટ આયન = $(\text{XO}_2)^-$
 (3) હેલેટ આયન = $(\text{XO}_3)^-$ (4) પરહેલેટ આયન = $(\text{OX}_4)^-$
 (A) FTTT (B) TFFT (C) FTTF (D) TTTF

125. સૌથી વધુ પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા જણાવો.

- (A) F_2 (B) Cl_2 (C) Br_2 (D) I_2

126. નીચેના પૈકી કયું આંતરહેલોજન 'T' આકાર ધરાવે છે ?

- (A) ClF_3 (B) ClF (C) ClF_5 (D) IF_7

127. હેલોજન તત્ત્વો પૈકી કયું તત્ત્વ માત્ર એક જ સ્થાયી ઓક્સોએસિડ બનાવે છે ?

- (A) I (B) F (C) Cl (D) Br

128. આંતર હેલોજન સંયોજનની સ્થાયિતાનો ક્રમ

- (A) $\text{IF}_3 > \text{BrF}_3 > \text{ClF}_3$ (B) $\text{BrF}_3 > \text{IF}_3 > \text{ClF}_3$ (C) $\text{ClF}_3 > \text{BrF}_3 > \text{ZF}_3$ (D) $\text{ClF}_3 > \text{IF}_3 > \text{BrF}_3$

129. XX_5' અને XX_7' સંયોજનના જળવિભાજનથી કયા આયન અનુક્રમે મળશે ?

- (A) XO_3^- , XO_4^- (B) XO_2^- , XO_3^- (C) XO_4^- , XO_5^- (D) XO^- , XO_2^-

130. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા આપમેળે શક્ય નથી ?

- (A) $\text{F}_2 + 2\text{Cl}^- \rightarrow 2\text{F}^- + \text{Cl}_2$ (B) $\text{I}_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{I}^- + \text{Br}_2$
 (C) $\text{Br}_2 + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Br}^- + \text{I}_2$ (D) $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$

131. ClF_5 માં ક્લોરિન પરમાણુ સંકરણ ધરાવે છે ?

- (A) sp^3 (B) sp^3d (C) sp^3d^3 (D) sp^3d^2

132. ClO_3^- માં, Cl પરમાણુ સંકરણ ધરાવે છે.

- (A) sp^2 (B) sp^3 (C) sp^3d (D) sp^3d^2

જવાબો : 121. (D), 122. (A), 123. (C), 124. (D), 125. (A), 126. (A), 127. (C), 128. (C),
129. (B), 130. (A), 131. (B), 132. (B)

● હેલોજન અને તેનાં કેટલાંક સંયોજનો

(1) ફ્લોરિન :


(i) પ્રાપ્તિસ્થાન : ફ્લોરિન વાતાવરણમાં મુક્ત રીતે જોવા મળતો નથી, પરંતુ તે ફ્લોરાઇટ અથવા ફ્લોરસ્પાર (CaF_2), કાયોલાઇટ (Na_3AlF_6) અને ફ્લોરેપાઇટ ($\text{CaF}_2 \cdot 3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) અથવા $(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F})$ સ્વરૂપે જોવા મળતો હોય છે.

ફ્લોરાઇડના અંશ દરિયાના પાણીમાં, હાડકામાં, દાંતમાં, લોહીમાં, દૂધમાં વગેરેમાં હોય છે.

(ii) બનાવટ : ફ્લોરિન મેળવવા માટે $\text{Ni} - \text{Cu}$ અથવા $\text{Ni} - \text{Cu} - \text{Fe}$ ના બંધપાત્રમાં કેથોડ તરીકે કાર્બન ઇલેક્ટ્રોડ અને એનોડ તરીકે કાર્બન રોડ વાપરી દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજનથી મેળવવામાં આવે છે.




કેથોડ ઉપર : $\text{K}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{K};$



એનોડ ઉપર : $2\text{F}^- \rightarrow \text{F}_2 + 2\text{e}^-$



● ફ્લોરિન મેળવવા માટેની બીજી રાસાયણિક પ્રક્રિયા :



(iii) ગુણધર્મો : બધાં જ હેલોજન તત્ત્વોમાં તે સૌથી વધુ ક્રિયાશીલ છે.

● તે ધાતુ અથવા અધાતુ બંને સાથે જોડાઈને ફ્લોરાઇડ બનાવે છે.


● તે NH_3 સાથે પ્રક્રિયા કરી નાઇટ્રોજન અને H_2S સાથે પ્રક્રિયા કરી SF_6 આપે છે.



● ફ્લોરિન ઠંડા અને મંદ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી ઓક્સિજન ડાયફ્લોરાઇડ બનાવે છે.



● જ્યારે સાંદ્ર અને ગરમ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી ઓક્સિજન આપે છે.




(iv) ઉપયોગો : ફ્લોરિનનો ઉપયોગ UF_6 અને SF_6 ની બનાવટમાં ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનમાં, ટેફ્લોન, કાયોલાઇટ અને HF માં થાય છે.


(2) ક્લોરિન :

(i) પ્રાપ્તિસ્થાન : ક્લોરિન મુખ્યત્વે સોડિયમ ક્લોરાઇડ (NaCl), કાર્નેલાઇટ (KCl , $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) અને કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ (CaCl_2)માંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

(ii) બનાવટ : બ્રાઈન દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા ક્લોરિન મેળવવામાં આવે છે.





મોલ્ટેન NaClના વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા પણ ક્લોરિન મેળવી શકાય છે.



(3) ગુણધર્મો : ક્લોરિન ધાતુ અને અધાતુ સાથે જોડાઈને ક્લોરાઈડ આપે છે.

- ક્લોરિન પાણીના વિભાજન દ્વારા HCl અને HClO મળે છે કે જે અસ્થાયી છે.



- ક્લોરિનનો ઉપયોગ સહીને દૂર કરવા માટે થાય છે.
- ક્લોરિન એ પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વપરાય છે. તે ફેરસનું ફેરિકમાં રૂપાંતર કરે છે.


(iv) ઉપયોગો : ક્લોરિનનો ઉપયોગ HCl, NaOCl, બ્લિચિંગ પાઉડર, ક્લોરેટ, વિનાઈલ ક્લોરાઈડ અને CCl₄ની બનાવટમાં થાય છે.

(3) બ્રોમિન :

(i) પ્રાપ્તિસ્થાન : બ્રોમીન મુખ્યત્વે દરિયાના પાણીમાં, ખારા પાણીમાં, તળાવમાં, NaBr, KBr, અને MgBr₂ તરીકે હોય છે.

(ii) બનાવટ : બ્રોમિન મુખ્યત્વે દરિયાના પાણીમાંથી મેળવવામાં આવે છે.

- દરિયાના પાણીમાંથી ક્લોરિન પસાર કરવાથી Br₂ પ્રાપ્ત થાય છે.




- પ્રયોગશાળામાં NaBr ને MnO₂ અને સાંદ્ર H₂SO₄ સાથે ગરમ કરી મેળવવામાં આવે છે.



(3) ગુણધર્મો : બ્રોમિન એ રેડિસ બ્રાઉન રંગનું ભારે પ્રવાહી છે.

- તેને પાણી, આલ્કાઈલ્સ, NH₃, ધાતુ અને અધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા ક્લોરિનના જેવી જ હોય છે.
- બ્રોમિનજળ મરક્યુરી ઓક્સાઈડ સાથે જોડાઈને મરક્યુરી ઓક્સિ બ્રોમાઈડ બનાવે છે.



મરક્યુરી ઓક્સિ બ્રોમાઈડ

(4) ઉપયોગો : બ્રોમિનનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ ઈથિલીન બ્રોમાઈડની બનાવટમાં થાય છે.

- બ્રોમિનનો ઉપયોગ AgBr, બ્રોમિનજળ, ડાઈઝ, દવાઓ તથા બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડની બનાવટમાં પણ થાય છે.

(4) આયોડિન :


(i) પ્રાપ્તિસ્થાન : આયોડિન ઊંડા દરિયામાં આવેલા લેમિનેરિયાના રોપામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં આયોડિનનું પ્રમાણ 0.5 % જેટલું હોય છે.

(ii) બનાવટ : વ્યાપારી ધોરણે આયોડિન બ્રાઈન દ્રાવણમાંથી અથવા દરિયાઈ રોપાઓમાંથી મેળવવામાં આવે છે.


- દરિયાઈ રોપાને સૂકવી, તેને બાળીને તેના અંશ (કે જે 1 % I₂ ધરાવે છે.)માંથી મેળવવામાં આવે છે.

(iii) ગુણધર્મો : આયોડિન પાણીમાં અંશતઃ દ્રાવ્ય થાય છે. તેની દ્રાવ્યતા 10 % KIના દ્રાવણના ઉમેરવાથી વધારી શકાય છે.


- આયોડિનની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાએ ફ્લોરિનની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરતાં વિપરિત હોય છે.



- તે કેટલાક કાર્બનિક દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય હોય છે.
- આયોડિનની ઠંડા અને મંદ NaOH સાથેની પ્રક્રિયાથી હાઈપોઆયોડસ એસિડ મળે છે.



- જ્યારે આયોડિનની સાંદ્ર અને ગરમ NaOH સાથેની પ્રક્રિયા Cl_2 અને Br_2 જેવી જ હોય છે.
- આયોડિનની એમોનિયા સાથેની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ જોવા મળે છે :





(iv) ઉપયોગો : આયોડિનનો ઉપયોગ આયોડેક્સ, આયોડોફોર્મ, KI તથા પોટેશિયમ આયોડેટની બનાવટમાં થાય છે.


- આયોડિનની ઉણપથી ગોઈટર નામનો રોગ થવાની સંભાવના રહેલી છે.

(5) હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl) : હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ એ હાઈડ્રોજન ક્લોરાઈડ વાયુને પાણીમાં પસાર કરી મેળવવામાં આવે છે.


(i) બનાવટ : HCl એ ‘Salt Cake’ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.




- 1, 2-ડાયક્લોરોઇથેનનું વિનાઇલ ક્લોરાઈડના રૂપાંતર દરમિયાન ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં અશુદ્ધ HCl મળી આવે છે.



- ખૂબ જ શુદ્ધ HCl એ H_2 અને Cl_2 ના સીધા જ મિશ્રણ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.



- પ્રયોગશાળામાં NaCl અને સાંદ્ર H_2SO_4 ના મિશ્રણને ગરમ કરવાથી HCl મેળવવામાં આવે છે.



(2) ગુણધર્મો : HCl એ રંગવિહીન, તીખી વાસ ધરાવતો, સરળતાથી રંગવિહીન દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ જતો વાયુ છે.

- તે પાણીમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને તે દ્રાવણ હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ તરીકે ઓળખાય છે.
- NH_3 સાથે પ્રક્રિયા દ્વારા તેના સફેદ ધુમાડા ઉત્પન્ન કરે છે.



- સક્રિય ધાતુઓ જેવી કે Zn, Mg, Fe વગેરે HCl સાથે પ્રક્રિયા કરી H_2 વાયુ મુક્ત કરે છે.

(3) ઉપયોગો : HClનો ઉપયોગ ધાતુના ક્લોરાઇડ્સ, ક્લોરિન, NH₄Cl અને ગ્લુકોઝ બનાવવા થાય છે.


- ધાતુની સપાટી પરથી ઓક્સાઇડના પડ દૂર કરવા માટે થાય છે.
- દવાઓની બનાવટમાં તથા પ્રયોગશાળામાં ઉપયોગ થાય છે.

(6) બ્લિચિંગ પાવડર :

(i) પ્રાપ્તિસ્થાન : બ્લિચિંગ પાવડર એ હાઇપોક્લોરસ એસિડનો કેલ્શિયમ ક્ષાર છે.

- તે કેલ્શિયમ હાઇપોક્લોરાઇટ અને કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડનું મિશ્રણ છે.



(ii) બનાવટ : ફોડેલા ચૂના પરથી ક્લોરિનનો પ્રવાહ પસાર કરીને બ્લિચિંગ પાવડર મેળવી શકાય છે.



(iii) ગુણધર્મો : મર્યાદિત જથ્થામાં મંદ H₂SO₄ સાથેની પ્રક્રિયાથી ઓક્સિજન મળી આવે છે.



- જેથી તે ઓક્સિડેશનકર્તા અને બ્લીચીંગ એજન્ટ તરીકે વર્તે છે.
- વધુ પ્રમાણમાં મંદ એસિડ અથવા CO₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી Cl₂ મળી આવે છે.



- સારો બ્લિચિંગ પાવડર કુલ 55.9% ક્લોરિનનો 35–38 % ભાગ ક્લોરિન ધરાવે છે.

(4) ઉપયોગો : સુતરાઉ કાપડને બ્લિચ કરવા માટે વપરાય છે.

- ક્લોરોફોર્મની બનાવટમાં પણ ઉપયોગી છે.
- જંતુનાશક તરીકે, પાણીને જંતુરહિત કરવા માટે થાય છે.
- લાકડાને સંકોચાતું અટકાવવા માટે થાય છે.

133. ક્લોરિનની અને આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયાથી ક્લોરાઇડ અને ક્લોરેટ મળે છે ?

- (A) ઠંડા અને મંદ (B) ગરમ અને મંદ (C) ગરમ અને સાંદ્ર (D) ઠંડા અને સાંદ્ર

134. નીચેની કઈ પ્રક્રિયામાં નીપજ તરીકે ક્લોરિન વાયુ મળશે નહિ ?

- (A) HClનું MnO₂ દ્વારા ઓક્સિડેશન (B) HClનું KMnO₄ દ્વારા ઓક્સિડેશન
(C) KClO₃નું KMnO₄ દ્વારા ઓક્સિડેશન (D) સાંદ્ર NaClના જલીય દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા

135. નીચેનામાંથી કયો વાયુ CaO સાથે પ્રક્રિયા આપે છે, પરંતુ NaHSO₃ સાથે આપતો નથી ?

- (A) CO₂ (B) Cl₂ (C) N₂ (D) O₂

136. ક્લોરાઇડના ક્ષારને K₂Cr₂O₇ અને સાંદ્ર H₂SO₄ વડે ગરમ કરવાથી મળતો લાલ-ભૂરો એ ના કારણે મળે છે.

- (A) Cl₂ (B) CrO₂Cl₂ (C) H₂CrO₂ (D) CrO₃

137. ઉપર Cl₂ની પ્રક્રિયા કરતાં વિરંજક પાવડર મળે છે ?

- (A) CaCl₂ (B) CaO (C) CaCO₃ (D) Ca(OH)₂

138. જ્યારે KBrના જલીય દ્રાવણની સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી બ્રોમિન વાયુ છૂટો પડે છે ?

- (A) I₂ (B) HI (C) Cl₂ (D) SO₂

139. ક્લોરિનનું પાણીમાં દ્રાવણ ધરાવે છે.
 (A) ફક્ત HOCl (B) ફક્ત HCl (C) HCl અને HOCl (D) HCl, HClO અને O₂
140. ફ્લોરિન એ વિવિધ ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવતો નથી કારણ કે,
 (A) તેના પરમાણુના નાના કદને કારણે (B) ન્યૂનતમ બંધ વિયોજન ઊર્જાને કારણે
 (C) d-કક્ષકો જોવા મળતા નથી. (D) તેની ઊંચી વિદ્યુતઋણતાને કારણે
141. BF₃માં B-F બંધની બંધલંબાઈ નાની હોવાનું મુખ્ય કારણ શું છે ?
 (A) BF₃માં આયોનિક-સહસંયોજક સંસ્પંદન જોવા મળે છે. (B) ફ્લોરિનની વિદ્યુતઋણતા વધુ છે.
 (C) dπ - pπ બંધને લીધે (D) pπ - pπ બંધને લીધે
142. પોટેશિયમ બ્રોમાઇડના દ્રાવણની કોની સાથે પ્રક્રિયાથી બ્રોમિન મુક્ત કરી શકાય છે ?
 (A) I₂નું દ્રાવણ (B) Cl₂નું પાણી (C) NOCl (D) KI
143. આયોડીનની ગરમ અને સાંદ્ર NaOH સાથેની પ્રક્રિયાથી મળે.
 (A) NaI + HIO + O₂ (B) NaI + NaIO + O₂ (C) NaI + HIO₃ + H₂O (D) NaI + NaIO₃ + H₂O
144. કયો હેલોજન HNO₃ દ્વારા ઓક્સિડેશન પામે છે ?
 (A) F₂ (B) Cl₂ (C) I₂ (D) Br₂
145. ની હાજરીમાં આયોડિન પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે.
 (A) KI (B) Cl₂ (C) Br₂ (D) KBr
146. પેરા-પર આયોડિક એસિડ એ ધરાવે છે.
 (A) IO₃⁻ આયન (B) IO₆⁻⁵ આયન (C) IO₅⁻³ આયન (D) IO₄⁻ આયન
147. ICl₃ એ વિદ્યતવાહકતા દર્શાવે છે કારણ કે વિદ્યુતવિભાજન કરતાં તેનું આયનીકરણમાં થાય છે.
 (A) 2ICl₃ ⇌ I⁺ + ICl₅⁻ (B) ICl₃ ⇌ I⁺ + 3Cl⁻
 (C) 2ICl₃ ⇌ ICl₂⁺ + ICl₄⁻ (D) 2ICl₃ ⇌ ICl₄⁺ + ICl₂⁻
148. કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા નાઈટ્રોજન (I) ઓક્સાઈડ બનાવી શકાય છે ?
 (A) એમોનિયમ નાઈટ્રેટના ઉષ્મીય વિઘટન દ્વારા (B) N₂O₄નું દ્વિવિઘટન કરવાથી
 (C) એમોનિયમ નાઈટ્રાઈટના ઉષ્મીય વિઘટન દ્વારા (D) ઉપરની બધી જ.
149. જ્યારે બ્લિચિંગ પાવડરના જલીય દ્રાવણમાંથી CO₂ વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે નીચેનામાંથી કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે ?
 (A) O₂ (B) Cl₂ (C) O₃ (D) Cl₂O
150. 2NaOH + X → Y + H₂O
 Y + H₂O + SO₂ → Z સમીકરણોમાં X, Y અને Zનાં સૂત્રો દર્શાવો.
 (A) X = SO₂, Y = Na₂SO₃, Z = Na₂SO₄ (B) X = SO₂, Y = NaHSO₃, Z = Na₂SO₃
 (C) X = SO₃, Y = Na₂SO₃, Z = NaHSO₄ (D) X = SO₂, Y = Na₂SO₃, Z = NaHSO₃
- એક જાંબલી ઘન પદાર્થ X એ NH₃ સાથે પ્રક્રિયા કરી મંદ સ્ફોટક પદાર્થ Y બનાવે છે તે જાંબલી રંગ દૂર કરે છે. Xની H₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ Z મળે છે. H₃PO₄ની ક્ષાર સાથેની પ્રક્રિયાથી પણ Z બનાવી શકાય છે.

151. જાંબલી રંગનો ઘન પદાર્થ કયો હશે ?

- (A) Cl_2 (B) SO_2 (C) Br_2 (D) I_2

152. મંદ સ્ફોટક Y કયો હશે ?

- (A) NI_3 (B) NH_4I (C) HI (D) NI_3, NH_3

153. એસિડ Z કયો છે ?

- (A) HCl (B) HI (C) HBr (D) H_2SO_4

જવાબો : 133. (C), 134. (B), 135. (D), 136. (B), 137. (B), 138. (D), 139. (C), 140. (B),
141. (C), 142. (A) 143. (B), 144. (C), 145. (A), 146. (A), 147. (B), 148. (B),
149. (A), 150. (D), 151. (B), 152. (D), 153. (D)

સમૂહ 18


● સમૂહ-18નાં તત્ત્વો વિશેની સમજૂતી

- સમૂહ 18માં છ તત્ત્વો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન આવેલા છે.
- આ તત્ત્વો ધાતુઓ કે હેલોજનની માફક અધાતુઓ પણ નથી.
- આ તત્ત્વોની સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના તેમની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા કે ગુમાવવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. આથી આ તત્ત્વો સામાન્ય રીતે રેડોક્ષ પ્રક્રિયા કરતા નથી.

- આ બધાં જ તત્ત્વો ઓરડાના તાપમાને વાયુસ્વરૂપે અને રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય છે.

પ્રાપ્તિસ્થાન :

- વિશ્વભરમાં હિલિયમ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મળતો વાયુ બીજા નંબરે આવે છે. જે કુલ દળનો 25 % ભાગ છે. તે કુદરત અને કુદરતી વાયુમાં મળી આવે છે.
- હિલિયમ કુદરતી વાયુમાં ખૂબ જ અલ્પપ્રમાણમાં આર્ગોન સૂકી હવામાં 1 % હોય છે જ્યારે બાકીના વાયુઓ હવામાં અતિશય પ્રમાણમાં હોય છે.
- રેડોનનું બહુ ઓછા પ્રમાણમાં શરીરમાં પ્રવેશવું જોખમ ઉત્પન્ન કરે છે.
- ગ્રેનાઈટ ખડકોમાં રહેલા અલ્પપ્રમાણમાં રેડિયમનો કિરણોત્સર્ગી ક્ષય રેડોન બને છે.



● ઉપયોગો

- નિષ્ક્રિય વાયુઓ ક્રિયાશીલ ન હોવાના કારણે તેમનો ઉપયોગ માત્ર નિષ્ક્રિય વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે.
- દા.ત., આર્ગોનનો ઉપયોગ વીજળીના બલ્બમાં તથા વેલ્ડિંગમાં ધાતુને ઓક્સિજનથી બચાવવા થાય છે.
- પ્રવાહી સ્થિતિમાં હિલિયમનો ઉપયોગ સંશોધનમાં ખૂબ જ નીચું તાપમાન મેળવવા માટે થાય છે. તેનું ઉત્કલનબિંદુ (4.2 K) કોઈ પણ પદાર્થ કરતાં અતિશય નીચું હોય છે.

● ભૌતિક ગુણધર્મો

- સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણ્વિક ક્રમાંક વધવાની સાથે પરમાણ્વિક કદ વધવાનું અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટવાનું સામાન્ય વલણ જોવા મળે છે.
- આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો ક્રમ : $\text{He} > \text{Ne} > \text{Ar} > \text{Kr} > \text{Xe} > \text{Rn}$ પ્રમાણે હોય છે.

- ગલનબિંદુનો ક્રમ : He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn પ્રમાણે તથા ઉત્કલનબિંદુનો ક્રમ :

He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn પ્રમાણે જોવા મળતો હોય છે.

- આ વાયુઓ પાણીમાં ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય થતા હોય છે.
- આર્ગોન એ નાઈટ્રોજન અને ઓક્સિજન કરતાં વધુ દ્રાવ્ય હોય છે.
- વાયુના કદના વધવાના સાથે દ્વિધ્રુવીય આકર્ષણબળ વધે છે, જેથી દ્રાવ્યતાનો ક્રમ :
He < Ne < Ar < Kr < Xe પ્રમાણે હોય છે.

154. સ્તંભ I અને સ્તંભ IIની સરખામણી કરી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

સ્તંભ I	સ્તંભ II	
(A) He	(p) દીવાદાંડીના વીજળીમાં વપરાય છે.	(A) (A)-(p); B-(s); (C)-(r); (D)-(q)
(B) Ne	(q) કેન્સરની સારવારમાં	(B) (A)-(r); B-(p); (C)-(s); (D)-(q)
(C) Ar	(r) ફુગ્ગામાં હવા ભરવા	(C) (A)-(q); B-(p); (C)-(s); (D)-(r)
(D) Rn	(s) બલ્બમાં ભરવા માટે	(D) (A)-(r); B-(q); (C)-(p); (D)-(s)

155. પ્રથમ નિષ્ક્રિય વાયુનું સંયોજન XePtF₆ની બનાવટ પછી રસાયણવિજ્ઞાનમાં નિષ્ક્રિય વાયુના સંયોજનની નવી શાખા ખૂલી. આ સંયોજન એ બનાવ્યો.

- (A) રે-લેહ (B) બર્થ લેટે (C) ડોર્ન (D) લોકવેર

156. નિષ્ક્રિય વાયુઓ બીજાં તત્ત્વો સાથે પ્રક્રિયા કરી શકતા નથી. કારણ કે,

- (A) તે સંપૂર્ણ ભરાયેલી તેમજ સ્થાયી કક્ષા ધરાવે છે. (B) તેઓનું કદ ખૂબ જ નાનું છે.
(C) તેઓ જથ્થામાં મળતા નથી. (D) તેઓ એક પરમાણ્વિય છે.

157. નિષ્ક્રિય વાયુ ધરાવે છે.

- (A) ઊંચી રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા (B) નીચી રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા
(C) ખૂબ ઓછી પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા (D) વધુ અનુચુંબકીય ગુણધર્મો

158. નીચેના પૈકીનું ઉત્કલનબિંદુ સૌથી વધુ છે.

- (A) Xe (B) He (C) Ne (D) Ar

159. નિષ્ક્રિય વાયુઓ પાણીમાં અલ્પદ્રાવ્ય છે કારણ કે,

- (A) ડાયપોલ-ડાયપોલ આંતરક્રિયાઓ (B) પ્રેરિત ડાયપોલ - પ્રેરિત ડાયપોલ આંતરક્રિયાઓ
(C) ડાયપોલ - પ્રેરિત ડાયપોલ આંતરક્રિયાઓ (D) હાઈડ્રોજન બંધ

160. નીચેનાં ચાર તત્ત્વોમાંથી સૌથી વધુ આયનીકરણ એન્ટાલ્પી કોની છે ?

- (A) O₂ (B) Ar (C) Be (D) Ce

161. નીચા દબાણે નિયોન વાયુમાં વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં કયો રંગ ઉત્પન્ન થાય છે ?

- (A) કેસરી-લાલ (B) વાદળી (C) લીલો (D) સફેદ

162. ઉમદા વાયુઓની બાષ્પ ઉષ્માનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

- (A) He > Ne > Ar > Kr > Xe > Rn (B) He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn
(C) Xe < Kr < Ne < He < Rn < Ar (D) He < Ne = Ar < Kr < Xe < Rn

163. નિષ્ક્રિય વાયુઓનો $\frac{C_p}{C_v}$ ગુણોત્તર નીચેનામાંથી કયો છે ?

- (A) 1.67 (B) 1.33 (C) 1.42 (D) 1.84



164. નીચેનામાંથી કયું શક્ય નથી ?

- (A) $[\text{KrF}]^+ [\text{S}_6\text{F}_6]^-$ (B) $[\text{KrF}_3]^- [\text{SbF}_4]^+$ (C) $[\text{KrF}^+] [\text{MoOF}_5]^-$ (D) $[\text{KrF}]^+ [\text{WOF}_5]^-$

જવાબો : 154. (B), 155. (B), 156. (A), 157. (B), 158. (A), 159. (A), 160. (B), 161. (A),
162. (D), 163. (A), 164. (B)

● રાસાયણિક ગુણધર્મો

- આ તત્વોની સ્થાપી ઇલેક્ટ્રોન રચનાને કારણે તેઓની ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ નથી. આ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ ધન જોવા મળે છે.
- He, Ne થતા Ar કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા ન હોવાથી તેઓનાં કોઈ પણ સંયોજનો જાણીતાં નથી.
- Kr તથા Xe માત્ર ફ્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે.
- Xe ત્રણ જુદા જુદા ફ્લોરાઇડ XeF_2 , XeF_4 તથા XeF_6 બનાવે છે.
- આ સ્ફટિકમય ધન પદાર્થોનું 25° સે તાપમાને ઊર્ધ્વપાતન થાય છે. તે પ્રબળ ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ છે.
- પાણીના ખૂબ અલ્પ પ્રમાણમાં પણ તેમનું જળવિભાજન થાય છે.





● નિષ્ક્રિય વાયુઓમાં ક્રિયાશીલતા ઓછી હોવા પાછળ તેની સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના ખૂબ વધુ આયનીકરણ ઊર્જા તેમજ અસામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા જવાબદાર છે.


- ઓક્સિડેશનકર્તા ક્રમ : $\text{XeF}_2 < \text{XeF}_4 < \text{XeF}_6$ પ્રમાણે હોય છે.

ઝેનોન ફ્લોરાઇડ્સ ફ્લોરાઇડ આયનગ્રાહીઓ સાથે પ્રક્રિયા દ્વારા ધન આયન અને આયન દાતા સાથે ઋણ આયન આપે છે.


- ફ્લોરિન આયનગ્રાહી સાથે પ્રક્રિયા :



- ફ્લોરિન આયન દાતા સાથે પ્રક્રિયા :




● કેટલાંક સંયોજનોના બંધારણો




સંકરણ sp^3d , આકાર : રેખીય

(XeF₂નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3d^2 , આકાર : સમતલીય ચોરસ

(XeF₄નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3d^3 , આકાર :
વિકૃત અષ્ટફલકીય

(XeF₆નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3 , આકાર : પિરામિડલ

(XeO₃નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3 , આકાર :
સમચતુષ્ફલકીય

(XeO₄નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3d , આકાર : T-આકાર

(XeOF₂નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3d , આકાર :
સમચોરસ પિરામિડલ

(XeOF₄નું બંધારણ)




સંકરણ : sp^3d , આકાર :
વિકૃત ત્રિકોણીય દ્વિ-પિરામિડ

(XeO₂F₂નું બંધારણ)



સંકરણ : sp^3d , આકાર :
ત્રિકોણીય દ્વિ-પિરામિડ

(XeO₃F₂નું બંધારણ)



સંકરણ : sp^3d^2 , આકાર : અષ્ટફલકીય

(XeO₂F₄નું બંધારણ)

165. નીચેનાં વિધાનોની સત્યતા ચકાસતા જવાબ માટેનો સાચો વિકલ્પ શોધો :

- (A) એનોન તેનાં સંયોજનોમાં +2, +4, +6 કે +8 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે.
- (B) એનોન હેક્સાફ્લોરાઇડના આંશિક જલવિભાજનથી XeOF₄ અને XeO₂F₂ જેવાં ઓક્સિફ્લોરાઇડ સંયોજનો બને છે. જે દરેકમાં Xeનો ઓક્સિડેશન-આંક = +8 હોય છે.
- (C) XeF₄નું પાણી વડે જલવિભાજન થવાથી XeO₃ બને છે.
- (D) XeO₃ રંગવિહીન સ્ફોટક ઘન પદાર્થ છે. તે ત્રિકોણીય પિરામિડલ બંધારણ ધરાવે છે.

(E) XeOF_4 રંગવિહીન સ્ફોટક ઘન પદાર્થ છે. તે ત્રિકોણીય પિરામિડલ બંધારણ ધરાવે છે.

(F) ઝેનોન અને ફ્લોરિનમાં મિશ્રણ વચ્ચે પ્રક્રિયાથી XeF_4 મેળવવામાં તાપમાન 573 K અને દબાણ 60 – 70 બાર રાખવું પડે છે.

(A) TFTTFF (B) FTTTFF (C) TFTFTF (D) TFFTTF

166. Xe અને F_2 નું 1 : 5 પ્રમાણ 873K તાપમાને અને 7 બાર દબાણે રાખીએ, તો શું મળે ?

(A) XeF_4 (B) XeF_6 (C) XeF_2 (D) આપેલા બધા જ.

167. ઝેનોનના કયા સંયોજનની O_2F_2 સાથે 143 K તાપમાને રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ શકે છે ?

(A) XeF_6 (B) XeF_4 (C) XeF_2 (D) XeF

168. XeF_4 અણુનો આકાર અને તેમાં ઝેનોનનું સંકરણ કયું છે ?

(A) સમચોરસ, dsp^2 (B) સમચતુષ્કલકીય, sp^2 (C) સમચોરસ, sp^2d^2 (D) અષ્ટકલકીય, d^2sp^3

169. XeOF_4 નું બંધારણ કેવું છે ?

(A) ત્રિકોણીય પિરામિડલ (B) સમચોરસ પિરામિડલ (C) વિકૃત અષ્ટકલકીય (D) રેખીય

170. ઝેનોનના ઓક્સિફ્લોરાઇડ સંયોજનોમાં કયું અયોગ્ય છે ?

(A) XeOF_4 (B) XeO_3F (C) XeOF_2 (D) B અને C બંને

171. XeF_2 , XeF_4 અને XeF_6 માં Xe પરમાણુ પર એકલ ઇલેક્ટ્રોન-યુગ્મની સંખ્યા અનુક્રમે

(A) 2, 3, 1 (B) 1, 2, 3 (C) 4, 1, 2 (D) 3, 2, 1

172. XeF_4 નો આકાર છે.

(A) સમતલીય સમચોરસ (B) સમચતુષ્કલકીય (C) સમતલીય ત્રિકોણ (D) પિરામિડલ

173. નીચા તાપમાને XeF_4 નું આંશિક જળવિભાજન કરતાં નીપજ મળે.

(A) XeF_3 (B) XeOF_2 (C) XeOF_4 (D) XeF_2

174. ઝેનોનનાં કયાં સંયોજનની કઈ પ્રક્રિયા શક્ય નથી ?

(A) $\text{XeO}_3 + 6\text{HF} \longrightarrow \text{XeF}_6 + 3\text{H}_2\text{O}$

(B) $3\text{XeO}_3 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Xe} + \text{XeO}_3 + 12\text{HF} + 1.5 \text{ O}_2$

(C) $\text{XeF}_6 + \text{RbF} \longrightarrow \text{Rb} [\text{XeF}_7]$ (D) આપેલમાંથી એક પણ નહીં.

175. નીચેનામાંથી કયા અણુમાં Xeની પાસે રહેલા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનયુગ્મ સમાન છે ?

(i) XeO_3 (ii) XeOF_4 (iii) XeF_6

(A) (i) અને (ii) (B) (i) અને (iii) (C) (ii) અને (iii) (D) (i), (ii), (iii)

176. XeOF_4 ની SF_4 સાથેની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજ -

(A) XeOF_4 અને SO_2 (B) Xe અને SF_6 (C) XeF_2 અને SF_6 (D) SF_6 અને XeO_3

177. XeO_2F_2 નો આકાર છે.

(A) ત્રિકોણીય પિરામિડલ (B) સમતલીય સમચોરસ (C) સમચતુષ્કલકીય (D) સીસો

178. XeF_2 , XeF_4 અને XeF_6 સંયોજનોમાં Xe-Fની બંધલંબાઈનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

- (A) $\text{XeF}_2 > \text{XeF}_4 > \text{XeF}_6$ (B) $\text{XeF}_4 > \text{XeF}_6 > \text{XeF}_2$
 (C) $\text{XeF}_6 > \text{XeF}_4 > \text{XeF}_2$ (D) $\text{XeF}_2 > \text{XeF}_6 > \text{XeF}_4$

179. સ્તંભ-I અને સ્તંભ-IIની સરખામણી કરી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

સ્તંભ-I

સ્તંભ-II

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| (A) XeF_4 | (p) વિકૃતીય અષ્ટફલકીય | (A) (A)-(r), (B)-(p), (C)-(s), (D)-(q) |
| (B) XeF_6 | (q) સમયતુષ્ફલકીય | (B) (A)-(s), (B)-(q), (C)-(p), (D)-(r) |
| (C) XeO_3 | (r) સમતલીય સમચોરસ | (C) (A)-(p), (B)-(r), (C)-(q), (D)-(s) |
| (D) XeO_4 | (s) ત્રિકોણીય પિરામિડ | (D) (A)-(q), (B)-(s), (C)-(r), (D)-(p) |

180. સ્તંભ-I અને સ્તંભ-IIની સરખામણી કરી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

સ્તંભ-I

સ્તંભ-II

- | | | |
|--------------------|------------------------------|---|
| (A) XeF_2 | (p) ઓરડાના તાપમાને વાયુ | (A) (A)-(q), (s) (B)-(p), (C)-(q), (r) (D)-(q), (r) |
| (B) XeO_4 | (q) ઓરડાના તાપમાને ઘન | (B) (A)-(p), (s) (B)-(q), (C)-(p), (s) (D)-(q), (s) |
| (C) XeO_3 | (r) અબંધકારક e^- યુગ્મ = 1 | (C) (A)-(s) (B)-(r), (C)-(p) (D)-(q) |
| (D) XeF_6 | (s) અબંધકારક e^- યુગ્મ = 3 | (D) (A)-(s) (B)-(q), (C)-(p) (D)-(r) |

જવાબો : 165. (A), 166. (A), 167. (B), 168. (C), 169. (B), 170. (D), 171. (D), 172. (A),
 173. (B), 174. (A) 175. (D), 176. (B), 177. (D), 178. (A), 179. (A), 180. (A).

