

ગણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત

જો પ્રાકૃતિક ચલ n નું કોઈ વિધાન $p(n)$ એ

(1) $n = 1$ માટે સત્ય હોય એટલે કે $p(1)$ સત્ય હોય.

(2) $k \in \mathbb{N}$ માટે $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે.

તો વિધાન $p(n)$ પ્રત્યેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

વિશિષ્ટ ચલ પ્રકારોમાં ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતો

ચલ પ્રકાર 1 :

જો $p(n)$ પ્રાકૃતિક ચલ n નું કોઈ વિધાન હોય અને જો કોઈક ધન પૂર્ણાંક k_0 માટે $p(k_0)$ સત્ય હોય તથા $k \geq k_0$, $k \in \mathbb{N}$ માટે $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે, તો વિધાન $p(n)$ દરેક $n \geq k_0$, $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

ચલ પ્રકાર 2 :

પ્રાકૃતિક ચલ n ના વિધાન $p(n)$ માટે જો $p(1)$ અને $p(2)$ સત્ય હોય તથા ધન પૂર્ણાંક k માટે $p(k)$ અને $p(k+1)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+2)$ સત્ય છે તો વિધાન $p(n)$ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મર્યાદાઓ :

- (1) આ સિદ્ધાંતની મદદથી પરિણામની ચકાસણી કરી શકાય, પરિણામ મેળવી શકાય નહિ.
- (2) અપૂર્ણાંક અને અસંમેય ચલવાળા પરિણામની ચકાસણી આ સિદ્ધાંતની મદદથી કરી શકાય નહિ.

બહુ વિકલ્પી પ્રશ્નો

(1) વિધાન $p(n) : 3^{2n+1} + 2^{n-1}$ એ $\forall n \in \mathbb{N}$ ના ગુણકમાં છે.

(A) 2

(B) 5

(C) 7

(D) 4

ઉકેલ : $n = 1$ લેતાં, $3^3 + 2^0 = 28$ જે 7 અને 2 ના ગુણકમાં છે.

$n = 2$ લેતાં, $3^5 + 2^1 = 245 = 7 \times 35$ જે 7 ના ગુણકમાં છે. પણ 2 ના ગુણકમાં નથી.

$\therefore p(n) : 3^{2n+1} + 2^{n-1}$ એ $\forall n \in \mathbb{N}$, 7 ના ગુણકમાં છે તેવું અનુમાન કરી શકાય.

ધારો કે $p(k) : 3^{2k+1} + 2^{k-1}$ એ 7ના ગુણકમાં છે. ($k \in \mathbb{N}$) સત્ય છે.

$$\therefore 3^{2k+1} + 2^{k-1} = 7m \quad m \in \mathbb{N} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} n = k + 1 \text{ માટે } 3^{2k+3} + 2^k &= 9 \cdot 3^{2k+1} + 2^k \\ &= 9(7m - 2^{k-1}) + 2^k \quad (\because 1) \\ &= 63m - 9 \cdot 2^{k-1} + 2^k \\ &= 63m - 2^{k-1}(9 - 2) \\ &= 7(9m - 2^{k-1}) \text{ એ 7 ના ગુણકમાં છે.} \end{aligned}$$

$\therefore p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે.

$p(2)$ પરથી (A), (D) સત્ય નથી. $p(1)$ પરથી (B) સત્ય નથી.

$\therefore$ વિકલ્પ (C) સત્ય છે.

$\therefore$ ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી $p(n) \forall n \in \mathbb{N}$ સત્ય છે.

જવાબ : (C)

(2) વિધાન $p(n) : n^2 \geq 3n$ સત્ય છે.

(A) $\forall n \in \mathbb{N}$

(B) $\forall n \in \mathbb{N}, n > 1$

(C) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3$

(D) દરેક અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n

ઉકેલ : $p(1) : 1 \geq 3$ સત્ય નથી.

$p(2) : 4 \geq 6$ સત્ય નથી.

$p(3) : 9 \geq 9$ સત્ય છે.

$p(4) : 16 \geq 12$ સત્ય છે.

$p(5) : 25 \geq 15$ સત્ય છે.

$\therefore$ ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી નીચે પ્રમાણે સાબિત કરી શકાય કે $p(n), \forall n \geq 3$ સત્ય છે :

ધારો કે $p(k) : k^2 \geq 3k$ $k \geq 3$ માટે સત્ય છે. (1)

$p(k+1) : (k+1)^2 \geq 3(k+1)$ સાબિત કરવું છે.

$$\text{અહીં } (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

$$\geq 3k + 2k + 1 \quad (1 \text{ પરથી})$$

$$\geq 3k + 3 = 3(k+1) \quad (k \geq 3 \Rightarrow 2k + 1 \geq 3)$$

$$\therefore (k+1)^2 \geq 3(k+1)$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

$\therefore$ ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી $p(n) : n^2 \geq 3n; \forall n \in \mathbb{N} n \geq 3$ માટે સત્ય છે.

જવાબ : (C)

(3) $p(n) : 2^{2^n}$ નો એકમનો અંક છે. $n > 1$

(A) 2

(B) 6

(C) 0

(D) 4

ઉકેલ : $n = 2$ લેતાં $2^{2^2} = 16$ નો એકમનો અંક 6 છે.

$n = 3$ લેતાં $2^{2^3} = 2^8 = 256$ નો એકમનો અંક 6 છે.

$\therefore$ અનુમાન કરી શકાય કે દરેક $n > 1$ માટે 2^{2^n} નો એકમનો અંક 6 છે.

ધારો કે $p(k) : 2^{2^k}$ નો એકમનો અંક 6 છે. $k > 1$

$$n = k+1 \text{ લેતાં, } 2^{2^{k+1}} = 2^{2^k} \cdot 2^2$$

$$= (2^{2^k})^2$$

$$= (10m + 6)^2 \quad (2^{2^k} = 10m + 6, m \in \mathbb{N})$$

$$= 100m^2 + 120m + 36$$

$$= 100m^2 + 120m + 30 + 6$$

$$= 10 (10 m^2 + 12m + 3) + 6 \text{ જેનો એકમનો અંક 6 છે.}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k > 1$

$\therefore p(n)$ દરેક $n > 1$ માટે સત્ય છે.

જવાબ : (B)

(4) જો $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 50^3 = m^2$, તો $m = \dots$

(A) 1275

(B) 1225

(C) 2450

(D) 1375

ઉકેલ : $m^2 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 50^3$

$$= \left[\sum n^3 \right]_{n=50} \quad (n = 50)$$

$$= \left[\frac{n^2 (n+1)^2}{4} \right]_{n=50} \quad (\text{ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી})$$

$$= \frac{50^2 \times 51^2}{4}$$

$$m = 25 \times 51 = 1275$$

જવાબ : (A)

(5) $n! < \left[\frac{n+1}{2} \right]^n$ નું પાલન થાય તેવો નાનામાં નાનો ધનપૂર્ણાંક છે. જ્યાં [] મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય છે.

(A) 2

(B) 4

(C) 3

(D) 6

ઉકેલ : $n = 1$ લેતાં $1! < \left[\frac{1+1}{2} \right]^1$

$\therefore 1! < 1$ સત્ય નથી.

$$n = 2 \text{ લેતાં } 2! < \left[\frac{2+1}{2} \right]^2$$

$\therefore 2 < 2$ સત્ય નથી.

$$n = 3 \text{ લેતાં } 3! < \left[\frac{3+1}{2} \right]^3$$

$\therefore 6 < 8$ સત્ય છે.

જવાબ : (C)

(6) જો $\sum_{r=1}^k r = \frac{1}{2} (n^2 + 11n + 30)$ તો $k = \dots$

(A) $n+4$

(B) $n+7$

(C) $n+6$

(D) $n+5$

ઉકેલ : $n^2 + 11n + 30 = (n + 5)(n + 6)$,

અહીં $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ છે જ.

આમ n ના સ્થાને $(n + 5)$ લેવાનો વિચાર કરી શકાય.

$$\therefore 1 + 2 + 3 + \dots + (n + 4) + (n + 5) = \frac{(n+5)(n+6)}{2}$$

$$\therefore k = (n + 5)$$

જવાબ : (D)

(7) જો $\sum_{r=6}^{n+5} (r-5)^3 = \left\{ \sum_{r=2}^p (r-1) \right\}^2$ તો $p = \dots$

(A) $n + 2$

(B) $n - 1$

(C) $n + 1$

(D) $n + 3$

ઉકેલ : ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરી શકાય કે.

અહીં $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$

$$\therefore \sum_{r=6}^{n+5} (r-5)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left\{ \sum_{r=2}^{n+1} (r-1) \right\}^2$$

$$\therefore P = n + 1$$

જવાબ : (C)

(8) વિધાન $p(n) : 8n \leq 2^n - 16$ દરેક $n > \dots$, $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

(A) 1

(B) 2

(C) 5

(D) 4

ઉકેલ : $p(1) : 8 \leq 2^1 - 16$ સત્ય નથી.

$p(2) : 16 \leq 2^2 - 16$ સત્ય નથી.

$p(3) : 24 \leq 2^3 - 16$ સત્ય નથી.

$p(4) : 32 \leq 2^4 - 16$ સત્ય નથી.

$p(5) : 40 \leq 2^5 - 16$ સત્ય નથી.

$p(6) : 48 \leq 2^6 - 16$ સત્ય છે.

આથી $P(6)$ સત્ય છે.

$p(7) : 56 \leq 2^7 - 16$ સત્ય છે.

$\therefore$ ધારો કે $p(k)$ સત્ય છે. $k \geq 6$

$\therefore 8k \leq 2^k - 16$ સત્ય છે.

$\therefore 8k + 8 \leq 2^k - 16 + 8$

$(k \geq 6 \Rightarrow 8 \leq 2^k)$

$\therefore 8(k + 1) \leq 2^k + 2^k - 16$

$\therefore 8(k + 1) \leq 2 \cdot 2^k - 16$

$\therefore 8(k + 1) \leq 2^{k+1} - 16$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k + 1)$ સત્ય છે. $k > 5$

$\therefore p(n), \forall n > 5$ સત્ય છે.

જવાબ : (C)

(9) મહત્તમ ધન પૂર્ણાંક વડે $(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+r)$ ને નિઃશેષ ભાગી શકાય. $\forall n \in \mathbb{N}$

- (A) $(n+r)!$ (B) $n+r+1$ (C) $n!$ (D) $r!$

ઉકેલ : અહીં $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+r) = {}_{(n+r)}P_r$

$$= \frac{(n+r)!}{n!} = \frac{(n+r)!}{n! r!} \times r! = \binom{n+r}{n} r! \text{ એ } r! \text{ વડે વિભાજ્ય છે.}$$

નોંધ : આમ, n ક્રમિક પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર $n!$ વડે વિભાજ્ય છે, $\forall n \in \mathbb{N}$ તેવું પરિણામ મળે. જવાબ : (D)

(10) અસમતા $3^n < (n+1)!$, $n \in \mathbb{N}$ એ

- (A) $n=4$ માટે સત્ય નથી. (B) $n=13$ માટે સત્ય નથી.
(C) દરેક $n \geq 4$ માટે સત્ય છે. (D) દરેક $n > 2$ માટે સત્ય છે.

ઉકેલ : $n=1$ લેતાં, $3 < 2$ સત્ય નથી.

$n=2$ લેતાં, $9 < 6$ સત્ય નથી.

$n=3$ લેતાં, $27 < 24$ સત્ય નથી.

$n=4$ લેતાં, $81 < 120$ સત્ય છે.

$p(n) : 3^n < (n+1)!$ એ $\forall n \geq 4$ સત્ય છે.

ધારો કે $n=k$ માટે $3^n < (n+1)!$ સત્ય છે. $k \geq 4$

$$\therefore 3^k \leq (k+1)!$$

$$\therefore 3^k \cdot 3 < (k+1)! \cdot 3$$

$$\therefore 3^{k+1} < 3(k+1)! < (k+2)(k+1)! \quad (k \geq 4 \Rightarrow k+2 > 3)$$

$$\therefore 3^{k+1} < (k+2)!$$

$\therefore$ વિધાન $n=k+1$ માટે સત્ય છે.

$\therefore p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k \geq 4$

$\therefore p(n) : 3^n < (n+1)!$ $\forall n \geq 4$ સત્ય છે. જવાબ : (C)

(11) વિધાન $p(n) : \frac{n^n}{3^n} < n! < \frac{n^n}{2^n}$ દરેક $n \geq k$, $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે, તો $k = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

ઉકેલ : $p(1) : \frac{1}{3} < 1 < \frac{1}{2}$ સત્ય નથી.

$p(2) : \frac{4}{9} < 2 < 1$ સત્ય નથી.

$p(3) : 1 < 6 < \frac{27}{8}$ સત્ય નથી.

$$p(4) : \frac{256}{81} < 24 < \frac{256}{16} \text{ સત્ય નથી.}$$

$$p(5) : \frac{5^5}{3^5} < 120 < \frac{5^5}{2^5} \text{ એટલે કે } \frac{3125}{243} < 120 < \frac{3125}{32} \text{ સત્ય નથી.}$$

$$p(6) : \frac{6^6}{3^6} < 6! < \frac{6^6}{2^6} \text{ એટલે કે } \frac{6^5}{3^6} < 5! < \frac{6^5}{2^6} \text{ એટલે કે } \frac{2^5}{3} < 120 < \frac{3^5}{2}$$

$$\text{એટલે કે } \frac{32}{3} < 120 < \frac{243}{2} \text{ સત્ય છે.}$$

આ જ રીતે, સાબિત કરી શકાય કે $p(n)$ દરેક $n > 6$ માટે સત્ય છે.

જવાબ : (D)

અહીં ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી $n! < \frac{n^n}{2^n}$ અને $\frac{n^n}{3^n} < n!$, $n \geq 6$ સાબિત કરી શકાય.

(12) જો $S(k) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = 3 + k^2$, તો નીચેના પૈકી કયું સત્ય છે ? (AIEEE : 2004)

(A) $S(1)$ સત્ય છે.

(B) $S(k) \Rightarrow S(k + 1)$ સત્ય છે.

(C) $S(k) \Rightarrow S(k + 1)$ સત્ય નથી.

(D) આ પરિણામ સાબિત કરવા માટે ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ થઈ શકે.

ઉકેલ : $S(1) = 1 = 3 + (1)^2$ સત્ય નથી.

ધારો કે $S(k) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = 3 + k^2$ સત્ય છે.

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) &= 3 + k^2 + (2k + 1) \\ &= 3 + (k + 1)^2 \end{aligned}$$

આમ, $S(k + 1)$ સત્ય છે.

$\therefore S(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow S(k + 1)$ સત્ય છે. આથી (B) સત્ય છે.

$\therefore S(k) \Rightarrow S(k + 1)$ સત્ય છે.

$\therefore$ (C) સત્ય નથી. $p(1)$ સત્ય નથી. આથી (D) સત્ય નથી.

જવાબ : (B)

(13) $p(n) : 49^n + 24^{n-1}$ એ $n \in \mathbb{N}$ માટે વડે વિભાજ્ય છે.

(A) 4

(B) 49

(C) 7

(D) 25

ઉકેલ : $p(1) : 49^1 + 24^0 = 50$ એ 25 વડે વિભાજ્ય છે.

ધારો કે, $p(n) : 49^n + 24^{n-1}$ એ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે 25 વડે વિભાજ્ય છે.

ધારો કે $m \in \mathbb{N}$

$$\text{એટલે કે } 49^k + 24^{k-1} = 25m.$$

હવે $p(k + 1) : 49^{k+1} + 24^k$ એ 25 વડે વિભાજ્ય છે તેમ સાબિત કરવું છે.

$$\text{હવે } 49^{k+1} + 24^k = 49(25m - 24^{k-1}) + 24^k$$

$$\begin{aligned}
&= 49 \cdot 25m - 49 \cdot 24^{k-1} + 24^k \\
&= 49 \cdot 25m - 24^{k-1} (49 - 24) \\
&= 25 (49 m - 24^{k-1}) \text{ એ } 25 \text{ વડે વિભાજ્ય છે.}
\end{aligned}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

$\therefore$ વિધાન $p(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ સત્ય છે.

જવાબ : (D)

$$(14) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx = \dots \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(A) 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \quad (B) 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} \quad (C) 1 \quad (D) 0$$

$$\text{ઉકેલ : } n = 1 \text{ લેતાં, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$n = 2 \text{ લેતાં, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 2x}{\sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4 \sin^2 x \cos^2 x}{\sin x} dx$$

$$= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x (-\sin x) dx = -4 \left[\frac{\cos^3 x}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -4 \left[0 - \frac{1}{3} \right] = \frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$$

$n = 1$ અને 2 માટે (B) સત્ય છે.

$$\therefore \forall n \in \mathbb{N} \text{ ધારે } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1}.$$

ધારે $p(k)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

$$\therefore p(k) : \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 kx}{\sin x} dx = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2k-1}$$

$$\text{આથી } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 (k+1)x}{\sin x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 kx}{\sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 (k+1)x - \sin^2 kx}{\sin x} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2k+1)x \sin x}{\sin x} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2k+1)x \, dx = \left[\frac{-\cos(2k+1)x}{(2k+1)} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{-1}{2k+1} \left[\cos(2k+1)\frac{\pi}{2} - \cos 0 \right] = \frac{1}{2k+1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(k+1)x}{\sin x} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 kx}{\sin x} \, dx + \frac{1}{2k+1} \\ &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k+1} \end{aligned}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

$\therefore p(n)$ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

જવાબ : (B)

(15) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો $p(n) : \cos(x - \pi n) = (-1)^n \cos x, \forall n \in \mathbb{N}$

ઉકેલ : $n = 1$ લેતાં, $\cos(x - \pi) = \cos(\pi - x) = -\cos x = (-1)^1 \cos x$

$\therefore p(1)$ સત્ય છે.

ધારો કે, $p(k)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

$p(k) : \cos(x - k\pi) = (-1)^k \cos x, k \in \mathbb{N}$

અહીં $\cos(x - \pi(k+1)) = \cos(x - k\pi - \pi)$

$$= -\cos(x - k\pi)$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

$$= -(-1)^k \cos x$$

$$= (-1)^{k+1} \cos x$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k \in \mathbb{N}$

વિધાન $p(n) \forall n \in \mathbb{N}$ સત્ય છે.

(16) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો : $p(n) : |z^n| = |z|^n, \forall n \in \mathbb{N}$ તથા $z \in \mathbb{C}$

ઉકેલ : $n = 1$ લેતાં, $p(1) : |z^1| = |z|^1$ સત્ય છે જ.

ધારો કે, $p(k)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

$\therefore p(k) : |z^k| = |z|^k$

હવે $p(k+1) : |z^{k+1}| = |z|^{k+1}$ સાબિત કરવું છે.

અહીં $|z^{k+1}| = |z^k \cdot z|$

$$= |z^k| |z|$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$= |z|^k |z|$$

$$= |z|^{k+1}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k \in \mathbb{N}$

$\therefore$ વિધાન $p(n), \forall n \in \mathbb{N}$ સત્ય છે.

JEE - ADVANCED માટે ઉપયોગી દાખલા

(17) $n > 1$ માટે સાબિત કરો : $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$

ઉકેલ : $p(n) : n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, n > 1$

$n = 2$ માટે $2! < \left(\frac{3}{2}\right)^2$ એટલે કે $2 < \frac{9}{4}$ સત્ય છે.

ધારો કે $p(k)$ સત્ય છે. $(k \geq 2)$ આથી $p(k) : k! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^k$ સત્ય છે. (1)

પરિણામ (1) ની બંને બાજુએ $(k+1)$ વડે ગુણતાં,

$$\therefore k! (k+1) < \frac{(k+1)^k}{2^k} (k+1)$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{(k+1)^{k+1}}{2^k \times 2} \times 2$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{(k+1)^{k+1}}{2^{k+1}} \times \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}, \left[\left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} = 1 + (k+1) \frac{1}{k+1} + \text{ધન સંખ્યા} > 2\right]$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{(k+1)^{k+1}}{2^{k+1}} \times \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^{k+1}}$$

$$\therefore (k+1)! < \left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે, $k \geq 2$

$\therefore$ ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી $p(n)$ દરેક $n > 1, n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

(18) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો : $n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n, \forall n > 5, n \in \mathbb{N}$

ઉકેલ : $p(n) : n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n, n > 5 \quad n \in \mathbb{N}$

$n = 6$ માટે, $6! < \left(\frac{6}{2}\right)^6 \Leftrightarrow 6! < (3)^6 \Leftrightarrow 720 < 729$ સત્ય છે.

$\therefore p(6)$ સત્ય છે.

ધારો કે, $p(k)$ સત્ય છે. $k > 5$

$$\therefore k! < \left(\frac{k}{2}\right)^k, k > 5 \quad (1)$$

(1) ની બંને બાજુ $(k+1)$ વડે ગુણતા,

$$k! (k+1) < \frac{k^k}{2^k} (k+1)$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{k^k (k+1)}{2^k \cdot 2} \times 2$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{k^k (k+1)}{2^{k+1}} \times \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$$

$$\left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = 1 + k \frac{1}{k} + \text{ધન સંખ્યા} \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k > 2 \right]$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{k^k (k+1)}{2^{k+1}} \times \frac{(k+1)^k}{k^k}$$

$$\therefore (k+1)! < \frac{(k+1)^{k+1}}{2^{k+1}}$$

$$\therefore (k+1)! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $k > 5$

$\therefore p(n)$ દરેક $n > 5$, $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

(19) વિધાન $n^n < 3^n \cdot n!$, $n \geq 6$ માટે સત્ય છે તેમ સાબિત કરો.

ઉકેલ : $p(n) : n^n < 3^n \cdot n!$ $n \geq 6$

$$n = 6 \text{ લેતાં, } 6^6 < 3^6 \cdot 6! \Leftrightarrow \frac{6^6}{3^6} < 720 \Leftrightarrow 2^6 < 720$$

$64 < 720$ સત્ય છે જ. આથી $p(6)$ સત્ય છે.

ધારો કે $p(k)$ સત્ય છે. $k \geq 6$

$$\therefore k! > \frac{k^k}{3^k}$$

$$\therefore (k+1) k! > \frac{k^k}{3^k} \frac{(k+1)}{3} \cdot 3$$

$$\therefore (k+1)! > \frac{k^k}{3^{k+1}} (k+1) \cdot 3 > \frac{k^k}{3^{k+1}} (k+1) \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \quad \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < 3 \right]$$

$$\therefore (k+1)! > \frac{k^k}{3^{k+1}} (k+1) \frac{(k+1)^k}{k^k}$$

$$\therefore (k+1)! > \frac{(k+1)^{k+1}}{3^{k+1}}$$

$$\therefore (k+1)^{k+1} < 3^{k+1} (k+1)!$$

$$\therefore p(k+1) \text{ સત્ય છે.}$$

$$\therefore p(k) \text{ સત્ય છે.} \Rightarrow p(k+1) \text{ સત્ય છે. } k \geq 6$$

$$\therefore p(n), \text{ દરેક } n \geq 6 \text{ માટે સત્ય છે.}$$

$$\text{નોંધ : અહીં } \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = 1 + \binom{k}{1} \frac{1}{k} + \binom{k}{2} \left(\frac{1}{k}\right)^2 + \binom{k}{3} \left(\frac{1}{k}\right)^3 + \dots (k+1) \text{ પદ}$$

$$= 1 + 1 + \frac{k(k-1)}{2k^2} + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!k^3} + \dots (k+1) \text{ પદ}$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{k}\right) + \frac{\left(1 - \frac{1}{k}\right)\left(1 - \frac{2}{k}\right)}{3!} + \dots (k+1) \text{ પદ}$$

$$< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \text{અનંત પદ}$$

$$< 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \text{અનંત પદ}\right) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

$$\therefore \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < 3$$

(20) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો.

$$p(n) : 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (2n-1)^2 - (2n)^2 = -n(2n+1), n \in \mathbb{N}$$

$$\text{ઉકેલ : } n=1 \text{ માટે } \text{ડા.બા.} = 1^2 - 2^2 = -3. \text{ જ.બા.} = -1(2+1) = -3$$

$$\therefore p(1) \text{ સત્ય છે. ધારો કે, } p(k) \text{ સત્ય છે. } k \in \mathbb{N}$$

$$\therefore p(k) : 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - (2k)^2 = -k(2k+1) \text{ સત્ય છે.} \quad (1)$$

$$\text{પરિણામ (1) ની બંને બાજુ } (2k+1)^2 - (2k+2)^2 \text{ ઉમેરતી,}$$

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - (2k)^2 + (2k+1)^2 - (2k+2)^2$$

$$= -k(2k+1) + (2k+1)^2 - (2k+2)^2$$

$$= -2k^2 - k + (4k+3)(-1)$$

$$= -(2k^2 + k + 4k + 3) = -(2k^2 + 5k + 3) = -(k+1)(2k+3)$$

$$\therefore p(k+1) \text{ સત્ય છે.}$$

$$\therefore p(k) \text{ સત્ય છે.} \Rightarrow p(k+1) \text{ સત્ય છે. } k \in \mathbb{N}$$

$$\therefore p(n) \text{ દરેક } n \in \mathbb{N} \text{ માટે સત્ય છે.}$$

(21) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો : $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - n^2 = -\frac{n(n+1)}{2}, n \text{ યુગ્મ,}$

$$n \in \mathbb{N}$$

ઉકેલ : n યુગ્મ છે. $\therefore n = 2m$ ધારીને ઉપર મુજબ સાબિત કરી શકાય.

(22) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો કે, જો $(x+3)y = 1$, તો $\frac{d^n y}{dx^n} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+3)^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ઉકેલ : $p(n) : \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+3)^{n+1}}$, જ્યાં $y = \frac{1}{x+3}$

$$n = 1 \text{ માટે, } \frac{dy}{dx} = \frac{(-1)^1 \cdot 1!}{(x+3)^{1+1}} = \frac{-1}{(x+3)^2} \text{ સત્ય છે કારણ કે } y = \frac{1}{x+3}$$

$$\text{ધારો કે, } p(k) \text{ સત્ય છે. } k \in \mathbb{N} \quad p(k) : \frac{d^k y}{dx^k} = \frac{(-1)^k \cdot k!}{(x+3)^{k+1}} \text{ સત્ય છે. } k \in \mathbb{N} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{અહીં } \frac{d^{k+1} y}{dx^{k+1}} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d^k y}{dx^k} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \frac{(-1)^k \cdot k!}{(x+3)^{k+1}} \quad ((1) \text{ પરથી}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^k k! \frac{d}{dx} (x+3)^{-(k+1)} \\ &= (-1)^k k! (-1) (k+1) (x+3)^{-(k+1)-1} = (-1)^{k+1} (k+1)! (x+3)^{-(k+2)} = \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{(x+3)^{k+2}} \end{aligned}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k \in \mathbb{N}$

$\therefore$ વિધાન $p(n)$ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

(23) જો $a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots}}}$ n વખત તો ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી કયું સત્ય છે. (AIEEE : 2002)

(A) $a_n > 7, \forall n \geq 1$ (B) $a_n > 3, \forall n \geq 1$ (C) $a_n < 4, \forall n \geq 1$ (D) $a_n < 3, \forall n \geq 1$

ઉકેલ : $p(n) : a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots}}}$ n વખત

$n = 1$ લેતાં, $a_1 = \sqrt{7}$ આથી $a_1 < 7$ હોવાથી $a_n > 7$ સત્ય નથી.

$a_1 > 3$ સત્ય નથી. $a_1 = \sqrt{7} < 4$ અને $a_1 = \sqrt{7} < 3$ સત્ય છે.

$$a_2 = \sqrt{7 + \sqrt{7}}$$

$$\text{અહીં } 2 < \sqrt{7} < 3 \Rightarrow 9 < 7 + \sqrt{7} < 10 < 16 \Rightarrow 3 < \sqrt{7 + \sqrt{7}} < 4 \Rightarrow 3 < a_2 < 4$$

$\therefore a_2 < 3$ સત્ય નથી. પરંતુ $a_2 < 4$ સત્ય છે.

આમ, $a_1 < 4$, $a_2 < 4$ સત્ય છે.

ધારો કે $a_k < 4$

$$\begin{aligned} \text{હવે } a_{k+1} &= \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots}}} \quad k+1 \text{ વખત} \\ &= \sqrt{7 + a_k} \end{aligned}$$

$$\therefore a_{k+1}^2 = 7 + a_k < 7 + 4. \quad \text{અર્થાત્ } a_{k+1} < \sqrt{11} < 4 \quad \text{અર્થાત્ } a_{k+1} < 4$$

આમ, $a_n < 4$, $n = k+1$ માટે સત્ય છે.

$$\therefore a_n < 4, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

જવાબ : (C)

$$(24) \quad \text{જો } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ અને } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ તો નીચેના પૈકી કયું દરેક } n \geq 1, n \in \mathbb{N} \text{ માટે સત્ય છે ?}$$

(AIEEE : 2005)

$$(A) A^n = 2^{n-1} A + (n-1) I$$

$$(B) A^n = nA + (n-1) I$$

$$(C) A^n = 2^{n-1} A - (n-1) I$$

$$(D) A^n = nA - (n-1) I$$

$$\text{ઉકેલ : } A^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 2^{1-1} A + (1-1) I = A \quad (A)$$

$$= (1) A + (1-1) I = A \quad (B)$$

$$= 2^{1-1} A - (1-1) I = A \quad (C)$$

$$= (1) A - (1-1) I = A \quad (D)$$

$n = 1$ માટે, (A), (B), (C), (D) ચારે સત્ય છે.

$$n = 2 \text{ માટે, } A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 2A - (2-1) I$$

$\therefore n = 2$ માટે (A) અસત્ય છે.

$\therefore n = 2$ માટે (B) અસત્ય છે. (C) અને (D) સત્ય છે.

$$n = 3 \text{ લેતાં } A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \neq 4A + 2I$$

(A) સત્ય નથી. (B) પણ સત્ય નથી.

$$(C) \text{ માં જ.બી.માં } n = 3 \text{ લેતાં, } 2^2 A - 2I = 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$\therefore n = 3$ માટે (C) સત્ય નથી.

$$(D) \text{ માં જ.બી.માં } n = 3 \text{ લેતાં } 3A - (3-1)I = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = A^3$$

∴ $n = 3$ માટે (D) સત્ય છે.

(D) એ $n = 1, 2, 3$ માટે સત્ય છે.

∴ ધારો કે $p(n) : A^n = nA - (n-1)I$ એ $n = k$ માટે સત્ય છે.

$$\begin{aligned} \text{અહીં } A^{k+1} = A^k \cdot A &= (kA - (k-1)I)A \\ &= kA^2 - (k-1)A \\ &= k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - (k-1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} k-(k-1) & 0 \\ 2k-(k-1) & k-(k-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k+1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k+1 & 0 \\ k+1 & k+1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \\ &= (k+1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - k \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= (k+1)A - kI \end{aligned}$$

∴ $p(k+1)$ સત્ય છે.

∴ $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $\forall k \in \mathbb{N}$

∴ $p(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

જવાબ : (D)

(25) $8^{2n} - 62^{2n+1}$ ને 9 વડે ભાગતાં શેષ મળે.

(AIEEE : 2009)

(A) 2

(B) 7

(C) 8

(D) 0

ઉકેલ : $8 \equiv -1 \pmod{9}$ તથા $62 \equiv -1 \pmod{9}$

$$\begin{aligned} \therefore 8^{2n} - (62)^{2n+1} &\equiv [(-1)^{2n} - (-1)^{2n+1}] \pmod{9} \\ &\equiv (1 + 1) \pmod{9} \\ &\equiv 2 \pmod{9} \end{aligned}$$

∴ $8^{2n} - (62)^{2n+1}$ ને 9 વડે ભાગતાં શેષ 2 મળે.

જવાબ : (A)

(26) $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{2n^3}{3} - \frac{n}{105}$ એ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે તેમ સાબિત કરો.

(IIT-1990)

ઉકેલ : $p(n) : \frac{1}{7} n^7 + \frac{1}{5} n^5 + \frac{2}{3} n^3 - \frac{1}{105} n$ એ પૂર્ણાંક છે. $n \in \mathbb{N}$

$$n = 1 \text{ લેતાં, } \frac{1}{7} + \frac{1}{5} + \frac{2}{3} - \frac{1}{105} = \frac{1}{105} [15 + 21 + 70 - 1] = 1 \text{ પૂર્ણાંક છે.}$$

∴ $p(1)$ સત્ય છે.

ધારો કે $p(k)$ સત્ય છે, $k \in \mathbb{N}$

$$p(k) : \frac{1}{7} k^7 + \frac{1}{5} k^5 + \frac{2}{3} k^3 - \frac{1}{105} k \text{ એ પૂર્ણાંક છે. } k \in \mathbb{N} \quad (1)$$

$n = k + 1$ લેતાં,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{7} (k+1)^7 + \frac{1}{5} (k+1)^5 + \frac{2}{3} (k+1)^3 - \frac{1}{105} (k+1) \\ &= \frac{1}{7} (k^7 + 7k^6 + 21k^5 + 35k^4 + 35k^3 + 21k^2 + 7k + 1) + \frac{1}{5} (k^5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 \\ & \quad + 5k + 1) + \frac{2}{3} (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - \frac{1}{105} (k+1) \\ &= \left(\frac{1}{7} k^7 + \frac{1}{5} k^5 + \frac{2}{3} k^3 - \frac{1}{105} k \right) + (k^6 + 3k^5 + 6k^4 + 7k^3 + 7k^2 + 4k) + 1 \\ &= \text{પૂર્ણાંક} + \text{પૂર્ણાંક} + 1 = \text{પૂર્ણાંક} \end{aligned} \quad (1) \text{ પરથી}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

$\therefore p(n), \forall n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે. (ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી)

$$\therefore \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} + \frac{2n^3}{3} - \frac{n}{105} \text{ પૂર્ણાંક છે. } \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{જવાબ : (D)}$$

(27) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો :

$$\sum_{m=0}^k (n-m) \frac{(r+m)!}{m!} = \frac{(r+k+1)!}{k!} \left[\frac{n}{r+1} - \frac{k}{r+2} \right] \text{ જ્યાં } m, n, r, k \text{ અનૃણ પૂર્ણાંકો છે.} \quad (\text{IIT : 1991})$$

ઉકેલ : અહીં અનૃણ પૂર્ણાંક k માટે ગણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત વાપરવો પડશે.

$$k = 0 \text{ લેતાં, } \text{ડા.બલ.} = \sum_{m=0}^0 (n-m) \frac{(r+m)!}{m!} = \frac{(n-0)(r+0)!}{0!} = n(r!)$$

$$\text{જ.બલ.} = \frac{(r+0+1)!}{0!} \left[\frac{n}{r+1} - \frac{0}{r+2} \right] = n \cdot r!$$

$\therefore k = 0$ માટે વિધાન સત્ય છે.

ધારો કે $k = p$ માટે વિધાન સત્ય છે. p અનૃણ પૂર્ણાંક છે.

$$\therefore \sum_{m=0}^p (n-m) \frac{(r+m)!}{m!} = \frac{(r+p+1)!}{p!} \left[\frac{n}{r+1} - \frac{p}{r+2} \right] \quad (1)$$

$$k = p + 1 \text{ માટે ડા.બલ.} = \sum_{m=0}^{p+1} (n-m) \frac{(r+m)!}{m!}$$

$$= \sum_{m=0}^p (n-m) \frac{(r+m)!}{m!} + (n-p-1) \frac{(r+p+1)!}{(p+1)!}$$

$$= \frac{(r+p+1)!}{p!} \left(\frac{n}{r+1} - \frac{p}{r+2} \right) + (n-p-1) \frac{(r+p+1)!}{(p+1)!} \quad (1) \text{ પરથી}$$

$$= \frac{(r+p+1)!}{p!} \left(\frac{n}{r+1} - \frac{p}{r+2} + \frac{n}{p+1} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(r+p+1)!}{p!} \left[\frac{np+n+nr+n}{(r+1)(p+1)} - \frac{p+r+2}{r+2} \right] \\
&= \frac{(r+p+1)!}{p!} \left[\frac{n(p+r+2)}{(r+1)(p+1)} - \frac{p+r+2}{r+2} \right] \\
&= \frac{(r+p+2)!}{(p+1)!} \left[\frac{n}{r+1} - \frac{p+1}{r+2} \right] = \text{જ.બ.}
\end{aligned}$$

∴ વિધાન $k+1$ માટે સત્ય છે.

∴ આપેલ વિધાન દરેક અનુષ્ઠા k માટે સત્ય છે.

∴ ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી વિધાન દરેક અનુષ્ઠા k, n, r, m માટે સત્ય છે.

(28) ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી સાબિત કરો કે, $3^{2^n} - 1$ એ 2^{n+2} વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 2^{n+3} વડે વિભાજ્ય નથી. $\forall n \in \mathbb{N}$ (IIT : 1996)

ઉકેલ : $p(n) : 3^{2^n} - 1$ એ 2^{n+2} વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 2^{n+3} વડે વિભાજ્ય નથી. $n \in \mathbb{N}$

∴ $p(1) : 3^{2^1} - 1 = 8$ એ 2^3 વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 2^4 વડે વિભાજ્ય નથી. આથી $p(1)$ સત્ય છે.

ધારો કે $p(k)$ સત્ય છે. $k \in \mathbb{N}$

∴ $3^{2^k} - 1$ એ 2^{k+2} વડે વિભાજ્ય છે પણ 2^{k+3} વડે વિભાજ્ય નથી.

ધારો કે $3^{2^k} - 1 = m \cdot 2^{k+2}$ જ્યાં m અયુગ્મ પૂર્ણાંક છે, જેથી તે 2^{k+3} વડે વિભાજ્ય ન બને.

$$\begin{aligned}
\text{હવે } 3^{2^{k+1}} &= (3^{2^k})^2 = (1 + m \cdot 2^{k+2})^2 \quad \because (1) \text{ પરથી} \\
&= 1 + 2m \cdot 2^{k+2} + m^2 \cdot 2^{2k+4} \\
&= m \cdot 2^{k+3} + m^2 \cdot 2^{k+1} \cdot 2^{k+3} + 1 \\
&= m \cdot 2^{k+3} (1 + m \cdot 2^{k+1}) + 1
\end{aligned}$$

અહીં m તથા $1 + m \cdot 2^{k+1}$ બંને અયુગ્મ પૂર્ણાંક છે માટે $3^{2^{k+1}} - 1$ એ 2^{k+3} વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 2^{k+4} વડે વિભાજ્ય નથી.

∴ $p(k+1)$ માટે સત્ય છે.

આમ, $p(k)$ સત્ય છે. $\Rightarrow p(k+1)$ સત્ય છે.

∴ વિધાન $p(n)$, દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

નિષ્કર્ષ અને કારક પ્રકારના પ્રશ્નો

આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં બે વિધાન આપેલાં હોય છે. આ બંને વિધાનો પૈકી સ્વતંત્ર રીતે એક સત્ય અને બીજું અસત્ય હોઈ શકે અથવા બંને સત્ય હોય તો વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સાચી સમજૂતી છે કે નહિ તે તપાસવાનું રહે છે.

વિધાન 1 : નિષ્કર્ષ

વિધાન 2 : કારક

આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં 4 વિકલ્પો (A), (B), (C) તથા (D) નીચે મુજબ હોય છે :

(A) વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

(B) વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી.

(C) વિધાન 1 સત્ય છે તથા વિધાન 2 અસત્ય છે.

(D) વિધાન 1 અસત્ય છે તથા વિધાન 2 સત્ય છે.

(29) વિધાન 1 : $n^2 + n + 41$ એ કોઈક $n \in \mathbb{N}$ માટે અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી.

વિધાન 2 : દરેક અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.

ઉકેલ : $n = 41$ લેતાં $n^2 + n + 41 = 41^2 + 41 + 41 = 41 \times 43$ અવિભાજ્ય નથી.

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે.

1 એ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. પરંતુ વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય નથી, એકમ પૂર્ણાંક છે.

$\therefore$ વિધાન 2 અસત્ય છે.

$\therefore$ વિધાન 1 સત્ય છે તથા વિધાન 2 અસત્ય છે.

જવાબ : (C)

(30) વિધાન 1 : દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $(n+1)^7 - n^7 - 1$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

વિધાન 2 : દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $n^7 - n$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

(AIEEE : 2011)

ઉકેલ : વિધાન 2 માટે

$p(n) : n^7 - n$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે. $\forall n \in \mathbb{N}$

$\therefore p(1) : 1^7 - 1 = 0$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

$\therefore p(1)$ સત્ય છે.

ધારો કે $p(k) : k^7 - k$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે, સત્ય છે. ધારો કે $k^7 - k = 7m$, $m \in \mathbb{N}$ (1)

$$(k+1)^7 - (k+1) = k^7 + \binom{7}{1} k^6 + \binom{7}{2} k^5 + \dots + 7k + 1 - k - 1$$

$$= (k^7 - k) + \binom{7}{1} k^6 + \binom{7}{2} k^5 + \dots + \binom{7}{6} k$$

$$k^7 - k \text{ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે, કારણ કે } \binom{7}{r} \text{ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે. (I પરથી)}$$

$\therefore p(k+1)$ સત્ય છે.

$\therefore p(n)$ પ્રત્યેક $n \in \mathbb{N}$ માટે સત્ય છે.

$\therefore$ વિધાન 2 સત્ય છે.

વિધાન 1 વિચારીએ

વિધાન 2 પરથી $n^7 - n$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

$\forall n \in \mathbb{N}$

$\therefore (n+1)^7 - (n+1)$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

$\therefore (n+1)^7 - (n+1) = 7m$, $m \in \mathbb{N}$ તથા $n^7 - n = 7p$,

$p \in \mathbb{N}$

$\therefore (n+1)^7 - n^7 + n^7 - n - 1 = 7m$

$\therefore [(n+1)^7 - n^7 - 1] + (n^7 - n) = 7m$

$\therefore (n+1)^7 - n^7 - 1 = 7(m-p)$

$\therefore (n+1)^7 - n^7 - 1$ એ 7 વડે વિભાજ્ય છે.

$\forall n \in \mathbb{N}$

∴ વિધાન 1 પણ સત્ય છે.

∴ વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

જવાબ : (A)

(31) વિધાન 1 : $p(n) : 111...1$ (n વખત) એ કોઈક $n \in \mathbb{N} - \{1\}$ માટે અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી.

વિધાન 2 : $p(n) : 111...1$ (n વખત) એ $n = 91$ માટે વિભાજ્ય સંખ્યા છે.

ઉકેલ : વિધાન 2 માં $n = 91$ લેતાં,

$111...1$ (91) વખત

$$= 1 + 10 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^{90}$$

$$= 1 \frac{(10^{91} - 1)}{10 - 1}$$

$$= \frac{10^{91} - 1}{9} = \frac{(10^7)^{13} - 1}{9} \quad (10^7 = t \text{ લેતાં})$$

$$= \frac{(10^7 - 1)}{9} (10^{84} + 10^{77} + \dots + 10^7 + 1)$$

$$= \frac{(10 - 1)(10^6 + 10^5 + \dots + 10 + 1)(10^{84} + 10^{77} + \dots + 10^7 + 1)}{9}$$

$$= (10^6 + 10^5 + \dots + 10 + 1)(10^{84} + 10^{77} + 10^{70} + \dots + 10^7 + 1) \text{ વિભાજ્ય સંખ્યા છે.}$$

વિધાન 2 સત્ય છે.

∴ $111...1$ (91 વખત) અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી.

∴ વિધાન 1 પણ સત્ય છે.

આમ બંને વિધાન સત્ય છે અને વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

જવાબ : (A)

