

કાર્બનિક સંયોજનનું કુદરતી સ્ત્રોતમાંથી નિષ્કર્ષણ કર્યા બાદ અથવા તો પ્રયોગશાળામાં સંશ્લેષણ કર્યા બાદ તેનું શુદ્ધિકરણ કરવું જરૂરી છે.

● કાર્બનિક સંયોજનના શુદ્ધિકરણ માટેની સામાન્ય પદ્ધતિઓ

સંયોજન અને તેમાં રહેલી અશુદ્ધિઓના સ્વભાવને આધારે કાર્બનિક સંયોજનના શુદ્ધિકરણ માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ વાપરવામાં આવે છે. સામાન્યતઃ શુદ્ધિકરણ માટે નીચેના જેવી પદ્ધતિઓ વપરાય છે :

ઉર્ધ્વપાતન : કેટલાક પદાર્થોને ગરમ કરતાં તે પ્રવાહી અવસ્થામાંથી પસાર થયા વિના સીધા જ બાષ્પ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે અને આ બાષ્પને ઠંડી પાડતા સીધા જ ઘન અવસ્થામાં પાછા ફરે છે.

કપૂર, નેથેલીન, એન્થ્રેસીન, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને આયોડિન જેવા પદાર્થોનું શુદ્ધિકરણ આ રીતે કરી શકાય છે.

સ્ફટિકીકરણ : આ પદ્ધતિ ઘન સ્વરૂપના કાર્બનિક સંયોજનોના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે. યોગ્ય દ્રાવકમાં સંયોજન અને તેમાં રહેલી અશુદ્ધિઓની દ્રાવ્યતાના તફાવત પર આ પદ્ધતિ આધારિત છે.

સાદું નિષ્કંદન : બાષ્પશીલ પ્રવાહીને અબાષ્પશીલ અશુદ્ધિઓથી અલગ કરવા આ પદ્ધતિ વપરાય છે. બે પ્રવાહીઓના ઉત્કલનબિંદુમાં જ્યારે પૂરતો તફાવત (30 K - 50 K) હોય ત્યારે પણ આ પદ્ધતિ વાપરી શકાય છે.

જેમકે એનીલીન (ઉત્કલન બિંદુ 457 K) અને ક્લોરોફોર્મ (ઉત્કલન બિંદુ 334 K)ના મિશ્રણનું અલગીકરણ નિષ્કંદન વડે કરી શકાય છે.

વિભાગીય નિષ્કંદન : જ્યારે બે બાષ્પશીલ પ્રવાહીઓના ઉત્કલનબિંદુમાં બહુ ઓછો તફાવત (10 K - 15 K) હોય ત્યારે તેમના અલગીકરણ માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે.

જેમ કે એસિટોન (ઉત્કલન બિંદુ 329 K) અને મિથેનોલ (ઉત્કલન બિંદુ 338 K)ના મિશ્રણનું અલગીકરણ વિભાગીય નિષ્કંદન વડે કરવામાં આવે છે.

નીચા દબાણે નિષ્કંદન : ઊંચું ઉત્કલનબિંદુ ધરાવતા તથા ઉત્કલનબિંદુએ કે તેનાથી નીચે તાપમાને વિઘટન પામતા પ્રવાહીઓના શુદ્ધિકરણ માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે. જેમકે સાબુ ઉદ્યોગમાં વપરાઈ ગયેલી લાઈમાંથી ગ્લિસરોલનું અલગીકરણ આ પદ્ધતિ વડે કરવામાં આવે છે.

બાષ્પ નિષ્કંદન : જે પદાર્થો પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય તથા વરાળમાં બાષ્પશીલ હોય તેમના શુદ્ધિકરણ માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે.

જેમકે એનીલીન અને પાણીના મિશ્રણમાંથી એનીલીનનું અલગીકરણ કરવા આ રીત વપરાય છે.

વિભાગીય નિષ્કર્ષણ : જલીય માધ્યમમાં રહેલા કાર્બનિક સંયોજનને પાણી કરતાં વધુ દ્રાવ્ય હોય તેવા કાર્બનિક દ્રાવકમાં હલાવીને અલગીકરણ કરવાની ક્રિયાને વિભાગીય નિષ્કર્ષણ કહે છે.

બેન્ઝોઈક એસિડના જલીય દ્રાવણમાંથી બેન્ઝોઈક એસિડનું બેન્ઝિન જેવો દ્રાવક વાપરી નિષ્કર્ષણ કરી શકાય છે.

ક્રોમેટોગ્રાફી : આપેલા મિશ્રણનું તેના ઘટકોમાં અલગીકરણ કરવા, પદાર્થોનું શુદ્ધિકરણ કરવા તથા પદાર્થની શુદ્ધતાનું પરીક્ષણ કરવા આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે.

1. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી પદ્ધતિ શેના માટે વપરાય છે ?

(A) પદાર્થના શુદ્ધિકરણ માટે

(B) પદાર્થની શુદ્ધતા પારખવા માટે

(C) (A) અને (B) બંને.

(D) (A) અને (B)માંથી એક પણ નહિ.

2. આયોડિન અને મીઠાંના મિશ્રણનું તેના ઘટકોમાં અલગીકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે ?

(A) ઉર્ધ્વપાતન

(B) સ્ફટિકીકરણ

(C) (A) અને (B) બંને.

(D) (A) અને (B)માંથી એક પણ નહિ.

3. સ્ફટિકીકરણમાં યોગ્ય દ્રાવક એટલે
 (A) સસ્તો અને સહેલાઈથી પ્રાપ્ય દ્રાવક
 (B) એવો દ્રાવક કે જેમાં પદાર્થ ઓરડાના તાપમાને સુદ્રાવ્ય હોય.
 (C) એવો દ્રાવક કે જેમાં પદાર્થ નીચા તાપમાને અદ્રાવ્ય હોય.
 (D) એવો દ્રાવક કે જેમાં પદાર્થ ઓરડાના તાપમાને અલ્પ દ્રાવ્ય પણ ઊંચા તાપમાને સુદ્રાવ્ય હોય.
4. બાષ્પશીલ પ્રવાહી અને અબાષ્પશીલ અશુદ્ધિનું અલગીકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે ?
 (A) સ્ફટિકીકરણ (B) નિસ્યંદન (C) દ્રાવક નિષ્કર્ષણ (D) આપેલી બધી જ
5. સોડિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ ડાયકોમેટના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે ?
 (A) વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ (B) ઊર્ધ્વપાતન
 (C) સાદું નિસ્યંદન (D) બાષ્પ નિસ્યંદન
6. હેકઝેન (ઉત્કલન બિંદુ 342K) અને ટોલ્યુઈન (ઉત્કલન બિંદુ 384K)ના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાશે ?
 (A) સાદું નિસ્યંદન (B) વિભાગીય નિસ્યંદન (C) બાષ્પ નિસ્યંદન (D) નીચા દબાણે નિસ્યંદન
7. છોડમાંથી મળતા આવશ્યક તેલોનું શુદ્ધિકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે ?
 (A) સાદું નિસ્યંદન (B) વિભાગીય નિસ્યંદન
 (C) બાષ્પ નિસ્યંદન (D) નીચા દબાણે નિસ્યંદન
8. ઓઈલ બાથનો ઉપયોગ કઈ પદ્ધતિમાં કરવામાં આવે છે ?
 (A) સાદું નિસ્યંદન (B) વિભાગીય નિસ્યંદન (C) બાષ્પ નિસ્યંદન (D) નીચા દબાણે નિસ્યંદન
9. કોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ કયો છે ?
 (A) અલગીકરણ કરવા (B) શુદ્ધિકરણ કરવા (C) શુદ્ધતાનું પરીક્ષણ કરવા (D) આપેલા બધાં જ
10. એસિટોન અને ઈથેનોલના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કઈ રીત વપરાશે ?
 (A) સાદું નિસ્યંદન (B) વિભાગીય નિસ્યંદન (C) સ્ફટિકીકરણ (D) ઊર્ધ્વપાતન
11. ઓર્થો અને પેરા નાઈટ્રોએનીલીનના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કઈ રીત વપરાય છે ?
 (A) સાદું નિસ્યંદન (B) કોમેટોગ્રાફી
 (C) વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ (D) આપેલ એક પણ નહિ.
12. નીચેના પૈકી કયો પદાર્થ અધિશોષણ કોમેટોગ્રાફીમાં અધિશોષક તરીકે વપરાય છે ?
 (A) એલ્યુમિના (B) સિલીકા જેલ
 (C) (A) અને (B) બંને (D) (A) અને (B)માંથી એક પણ નહિ.
13. સ્થિર કલા અને ચલિત કલા આ બે પદો શેની સાથે સંકળાયેલાં છે ?
 (A) નીચા દબાણે નિસ્યંદન (B) કોમેટોગ્રાફી (C) સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (D) વિભાગીય નિષ્કર્ષણ
14. કોમેટોગ્રાફી પ્લેટ ઉપર અધિશોષિત થયેલા એમિનો એસિડને પારખવા કયા પદાર્થનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) ઈથેનોલ (B) સ્કીફ - પ્રક્રિયક (C) નિન હાયડ્રીન દ્રાવણ (D) ઓસેઝોન
15. વાયુ કોમેટોગ્રાફીમાં
 (A) સ્થિર કલા તરીકે ઘન અને પ્રવાહી અને ચલિત કલા તરીકે વાયુ હોય છે.
 (B) સ્થિર કલા તરીકે માત્ર ઘન અને ચલિત કલા તરીકે વાયુ હોય છે.
 (C) સ્થિર કલા તરીકે માત્ર ઘન અને ચલિત કલા તરીકે પ્રવાહી હોય છે.
 (D) સ્થિર કલા તરીકે વાયુ અને ચલિત કલા તરીકે પણ વાયુ હોય છે.

16. અશુદ્ધ ગ્લિસરીનનું શુદ્ધિકરણ નીચે પૈકી કઈ પદ્ધતિથી કરી શકાય ?
 (A) બાષ્પનિષ્પંદન (B) સાદું નિસ્યંદન (C) નીચા દબાણે નિસ્યંદન (D) દ્રાવક નિષ્કર્ષણ
17. એનીલીનનું શુદ્ધિકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે ?
 (A) બાષ્પ નિસ્યંદન (B) સાદું નિસ્યંદન (C) નીચા દબાણે નિસ્યંદન (D) દ્રાવક નિષ્કર્ષણ
18. એઝિયોટ્રોપીક મિશ્રણ એટલે
 (A) જુદાં જુદાં તાપમાને ઉકળતું મિશ્રણ (B) ઘન પદાર્થોનું મિશ્રણ
 (C) અચળ ઉત્કલન મિશ્રણ (D) આપેલામાંથી એક પણ નહિ.
19. બેન્ઝોઈક એસિડ અને ફિનોલનું મિશ્રણ નીચે પૈકી કયા જલીય દ્રાવણમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય થશે ?
 (A) HCl (B) NaOH (C) NaCl (D) NaHCO₃
20. ફિનોલ તથા એરોમેટિક કાર્બોક્સિલીક એસિડના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કયું દ્રાવણ વપરાય છે ?
 (A) NaOH (B) Na₂CO₃ (C) CaO (D) NaHCO₃
21. બેન્ઝિન અને ક્લોરોબેન્ઝિનના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી થશે ?
 (A) ઊર્ધ્વપાતન (B) ભિન્નકારી ગળણી (C) સ્ફટિકીકરણ (D) નિસ્યંદન
22. બેન્ઝોઈક એસિડ, આઈસોએમાઈલ આલ્કોહોલ, સાયકલોહેક્ઝેન તથા સાયકલો હેક્ઝેનોન ધરાવતા મિશ્રણમાં સાયકલો હેક્ઝેનોનની પરખ કરવા કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ યોગ્ય છે ?
 (A) સ્ફટિકીકરણ (B) IR સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (C) ઊર્ધ્વપાતન (D) બાષ્પીભવન

જવાબો : 1. (B), 2. (C), 3. (D), 4. (B), 5. (A), 6. (A), 7. (D), 8. (B), 9. (D), 10. (B), 11. (B), 12. (C), 13. (B), 14. (C), 15. (A), 16. (C), 17. (A), 18. (C), 19. (B), 20. (D), 21. (D), 22. (B)

● કાર્બનિક સંયોજનોનું ગુણાત્મક પૃથક્કરણ

કાર્બનિક સંયોજનમાં મુખ્યત્વે કાર્બન અને હાઈડ્રોજન તત્ત્વો રહેલાં હોય છે. આ ઉપરાંત તેમાં N, S, P અને X (હેલોજન) જેવાં તત્ત્વો પણ હોય છે. આ તત્ત્વોની પરખ માટે લેસાઈન કસોટી ઉપયોગી છે.

ક્રમ	કસોટી	અવલોકન	અનુમાન
(1)	લે.દ્રા. + FeSO ₄ + સાં H ₂ SO ₄	પ્રુસિયન વાદળી અવક્ષેપ	N - હાજર
(2)	લે.દ્રા. + સોડિયમ નાઈટ્રો પ્રુસાઈડ	જાંબલી રંગ	S - હાજર
(3)	લે.દ્રા. + CH ₃ COOH + (CH ₃ COO) ₂ Pb	કાળા અવક્ષેપ	S - હાજર
(4)	લે.દ્રા. + HNO ₃ + AgNO ₃	સફેદ અવક્ષેપ NH ₄ OH માં દ્રાવ્ય	Cl - હાજર
		પીળા અવક્ષેપ NH ₄ OH માં અલ્પ દ્રાવ્ય	Br - હાજર
		પીળા અવક્ષેપ NH ₄ OH માં અદ્રાવ્ય	I - હાજર
(5)	લે.દ્રા. + સાં HNO ₃ + એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ	પીળા અવક્ષેપ	P - હાજર

23. એક કાર્બનિક પદાર્થને Cu(II) O સાથે ગરમ કરી મળતા વાયુમિશ્રણને નિર્જળ કૉપર સલ્ફેટ પરથી પસાર કરતાં તેનો રંગ વાદળી થયો. આ કાર્બનિક પદાર્થમાં નીચે પૈકી કયું તત્ત્વ ચોક્કસ હાજર છે ?
 (A) Br (B) F (C) N (D) H

24. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં તત્વો C અને Hની પરખ કરવા માટે સંયોજનને કોની સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે ?
 (A) Ca(OH)_2 (B) KOH (C) સોડાલાઈમ (D) CuO
25. કાર્બનિક સંયોજનમાં કાર્બનની પરખ કરતી વખતે ચૂનાનું પાણી કયો પદાર્થ બનવાને કારણે દૂધિયું બને છે ?
 (A) CaO (B) CaCO_3
 (C) Ca(OH)_2 (D) આપેલામાંથી એક પણ નહિ.
26. લેસાઈન કસોટીમાં કાર્બનિક સંયોજનનું શા માટે સોડિયમ સાથે ગલન કરવામાં આવે છે ?
 (A) સંયોજનનું આયનીકરણ વધારવા. (B) સંયોજનનું કદ વધારવા.
 (C) સંયોજનની ક્રિયાશીલતા વધારવા.
 (D) સહસંયોજક સંયોજનનું આયોનિક સંયોજનમાં રૂપાંતર કરવા
27. કયા પદાર્થ માટે લેસાઈન કસોટી નાઈટ્રોજનની પરખમાં નિષ્ફળ જશે ?
 (A) $\text{H}_2\text{NCONHNH}_2 \cdot \text{HCl}$ (B) $\text{H}_2\text{N NH}_2 \cdot \text{HCl}$
 (C) H_2NCONH_2 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2 \cdot \text{HCl}$
28. લેસાઈન દ્રાવણ બનાવતા કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા નાઈટ્રોજનનું રૂપાંતર કયા પદાર્થમાં થાય છે ?
 (A) સોડામાઈડ (B) સોડિયમ નાઈટ્રાઈડ (C) સોડિયમ સાઈનાઈડ (D) સોડિયમ નાઈટ્રેટ
29. કયો પદાર્થ નાઈટ્રોજનની હકારાત્મક કસોટી આપતો નથી ?
 (A) યૂરિયા (B) એઝોબેન્ઝિન (C) ગ્લાયસિન (D) ફિનાઈલ હાયડ્રેઝિન
30. નાઈટ્રોજનની લેસાઈન કસોટીમાં વાદળી રંગ કયા પદાર્થને આભારી છે ?
 (A) ફેરિક ફેરોસાયનાઈડ (B) પોટાશિયમ ફેરોસાયનાઈડ
 (C) સોડિયમ ફેરોસાયનાઈડ (D) સોડિયમ સાયનાઈડ

જવાબો : 23. (D), 24. (D), 25. (B), 26. (D), 27. (B), 28. (C), 29. (B), 30. (A)

● કાર્બનિક સંયોજનોનું જથ્થાત્મક પૃથક્કરણ અને અણુભાર

કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં તત્વોનું ટકાવાર પ્રમાણ નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે :

(1) કાર્બન અને હાઈડ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ લિબિગ પદ્ધતિ વડે નક્કી કરવામાં આવે છે.

$$\% \text{ C} = \frac{12 \times \text{CO}_2 \text{નું વજન} \times 100}{44 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

$$\% \text{ H} = \frac{2 \times \text{H}_2\text{Oનું વજન} \times 100}{18 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

(2) નાઈટ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ નક્કી કરવા ડ્યુમાસ પદ્ધતિ તથા જેડાહલની પદ્ધતિ વપરાય છે.

$$\% \text{ N} = \frac{28 \times \text{STPએ N}_2 \text{નું કદ (મિલિ)}}{224 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}} \quad (\text{ડ્યુમાસ પદ્ધતિ})$$

$$\% \text{ N} = \frac{1.4 \times \text{N} \times \text{V}}{\text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}} \quad (\text{જેડાહલની પદ્ધતિ})$$

N = એસિડની નોર્માલિટી

V = વપરાયેલા એસિડનું કદ

- (3) કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં X (હેલોજન) S તથા Pનું ટકાવાર પ્રમાણ કેરિયસ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.

$$\% X = \frac{X \text{ નો પ.ભાર} \times \text{AgX નું વજન} \times 100}{\text{AgX નો અણુભાર} \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

$$\% S = \frac{32 \times \text{BaSO}_4 \text{ નું વજન} \times 100}{233 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

$$\% P = \frac{62 \times \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \text{ નું વજન} \times 100}{222 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

- (4) કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ સામાન્ય રીતે તત્વોની કુલ ટકાવારી (100)માંથી અન્ય તત્વોના ટકા બાદ કરીને મેળવવામાં આવે છે. તેમ છતાં ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ સીધેસીધું નીચે મુજબ મેળવી શકાય છે :

$$\% O = \frac{32 \times \text{CO}_2 \text{ નું વજન} \times 100}{44 \times \text{કાર્બનિક સંયોજનનું વજન}}$$

કાર્બનિક સંયોજનનો અણુભાર નક્કી કરવાની રીતો :

$$(1) \text{ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો અણુભાર} = n \left[\left(\frac{108 \times \text{એસિડના સિલ્વર ક્ષારનું વજન}}{\text{સિલ્વરનું વજન}} \right) - 107 \right]$$

જ્યાં n = એસિડની બેઝિકતા

$$(2) \text{ કાર્બનિક બેઈઝનો અણુભાર} = \frac{n}{2} \left[\left(\frac{195 \times \text{પ્લેટિનીક ક્લોરાઈડનું વજન}}{\text{પ્લેટિનમનું વજન}} \right) - 410 \right]$$

જ્યાં n = બેઈઝની એસિડિકતા

31. $C_x H_y + x O_2 \rightarrow x CO_2 + y H_2O$ માં X અને Yનું મૂલ્ય કેટલું થશે ?




(A) $X = 2Y, Y = \frac{X}{4}$

(B) $X = 4Y, Y = 2X$

(C) $X = X + \frac{Y}{4}, Y = \frac{Y}{2}$

(D) $X = X + \frac{Y}{4}, Y = \frac{X}{2}$

32. લિબિગ પદ્ધતિમાં ઉત્પન્ન થયેલાં પાણીનું વજન નક્કી કરવા કયા પદાર્થનો ઉપયોગ થાય છે ?



(D) આપેલ બધા જ

33. લિબિગ પદ્ધતિમાં KOHના દ્રાવણનો ઉપયોગ શેના માટે કરવામાં આવે છે ?

(A) નાઈટ્રોજનનું શોષણ કરવા.

(B) કાર્બનનું રિડક્શન કરવા.

(C) હાઈડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન કરવા.

(D) કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું શોષણ કરવા.

34. લિબિગ પદ્ધતિમાં કાર્બનિક સંયોજનનું દહન કયા પદાર્થની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે ?

(A) કોપર (II) ઓક્સાઈડ (B) મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઈડ

(C) સોડાલાઈમ

(D) કોપર સલ્ફેટ

35. નાઈટ્રોમિટરનો ઉપયોગ કઈ પદ્ધતિમાં થાય છે ?

(A) ડ્યુમાસ પદ્ધતિ

(B) જેલ્ડાહલની પદ્ધતિ

(C) (A) અને (B) બંને

(D) (A) અને (B) બંનેમાંથી એક પણ નહિ

36. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા નાઈટ્રોજનનું એમોનિયમ સલ્ફેટમાં રૂપાંતર કઈ પદ્ધતિમાં કરવામાં આવે છે ?

(A) ડ્યુમાસ પદ્ધતિ




(B) જેલ્ડાહલની પદ્ધતિ

(C) (A) અને (B) બંને

(D) (A) અને (B) બંનેમાંથી એક પણ નહિ

37. નીચેના પૈકી કયા પદાર્થ માટે જેડાહલની પદ્ધતિ ઉપયોગી નથી ?
 (A) પિરીડીન (B) એનીલીન
 (C) બેન્ઝામાઈડ (D) આપેલામાંથી એક પણ નહિ.
38. કયા સંજોગોમાં જેડાહલની પદ્ધતિ બિનઉપયોગી છે ?
 (A) જ્યારે નાઈટ્રોજન તત્વ નાઈટ્રો સમૂહમાં હાજર હોય.
 (B) જ્યારે નાઈટ્રોજન તત્વ એઝો સમૂહમાં હાજર હોય.
 (C) જ્યારે નાઈટ્રોજન તત્વ ચક્રીય રચનામાં હોય.
 (D) ઉપર આવેલા બધાં જ.
39. કેરિયસ પદ્ધતિ વડે કયાં તત્વોનું પરિમાપન શક્ય છે ?
 (A) હેલોજન (B) સલ્ફર (C) ફોસ્ફરસ (D) આપેલા બધા જ
40. કેરિયસ પદ્ધતિમાં કાર્બનિક સંયોજનને કયા પદાર્થ સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે ?
 (A) સાંદ્ર HCl (B) દુભાયમાન HNO_3 (C) દુભાનમાય H_2SO_4 (D) સાંદ્ર NaOH
41. મુસિયન બ્લ્યૂ ક્યારે બને છે ?
 (A) જ્યારે ફેરસસલ્ફેટની FeCl_3 સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે
 (B) જ્યારે ફેરસસલ્ફેટની $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે
 (C) જ્યારે ફેરસએમોનિયમ સલ્ફેટની FeCl_3 સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે
 (D) જ્યારે એમોનિયમ સલ્ફેટની FeCl_3 સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે
42. લેસાઈન કસોટી કોની પરખ માટે વપરાય છે ?
 (A) નાઈટ્રોજન (B) સલ્ફર (C) ક્લોરિન (D) આપેલા બધા
43. જેડાહલની પદ્ધતિ કયા તત્વના પરિમાપનની પદ્ધતિ છે ?
 (A) નાઈટ્રોજન (B) હેલોજન (C) સલ્ફર (D) ઓક્સિજન
44. એક કાર્બનિક સંયોજનમાં C = 40 %, O = 53.34 % અને છે. H = 6.60 % આ સંયોજનનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર શોધો.
 (A) CH_2O (B) CHO (C) CH_4O_2 (D) $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}$
45. એક કાર્બનિક સંયોજનમાં C, H અને N ના ટકા અનુક્રમે 40, 13.33 અને 46.67 છે. તેનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર કયું હશે ?
 (A) $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}_2$ (B) CH_5N (C) CH_4N (D) $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$
46. ટોલ્યુઈનના બાષ્પનિસ્સંદનમાં બાષ્પમાં ટોલ્યુઈનનું દબાણ
 (A) બેરોમિટરના દબાણ જેટલું હોય છે.
 (B) બેરોમિટરના દબાણ કરતાં ઓછું હોય છે.
 (C) સાદા નિસ્સંદનમાં ટોલ્યુઈનના બાષ્પદબાણ જેટલું હોય છે.
 (D) સાદા નિસ્સંદનમાં ટોલ્યુઈનના બાષ્પદબાણ કરતાં વધારે હોય છે.
47. અણુભાર નક્કી કરવા ઘણી વખત કપૂરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કારણ કે
 (A) તે ઝડપથી પ્રાપ્ય છે. (B) તેનો મોલલ અવનયન અચળાંક ઘણો ઊંચો છે.
 (C) તે બાષ્પશીલ છે. (D) તે કાર્બનિક પદાર્થોનો દ્રાવક છે.
48. નેથેલિન અને બેન્ઝોઈક એસિડના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ કઈ છે ?
 (A) કોમેટ્રોગ્રાફી (B) સ્ક્રટિકીકરણ (C) નિસ્સંદન (D) ઊર્ધ્વપાતન

49. એક કાર્બનિક સંયોજનમાં કાર્બન, હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે. તેમાં રહેલાં તત્વોનું પરિક્ષણ કરતાં કાર્બન 38.71 % અને હાઈડ્રોજન 9.67 % જણાયું. આ સંયોજનનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર થશે.
- (A) CH_3O (B) CH_2O (C) CHO (D) CH_4O
50. સલ્ફરની પરખ માટેની લેસાઈન કસોટીમાં મળતો જાંબલી રંગ કયા પદાર્થને આભારી છે ?
- (A) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ (B) $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ (C) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$ (D) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
51. નીચેના પૈકી કયો પદાર્થ પ્રુસિયન વાદળી રંગ ધરાવે છે ?
- (A) $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ (B) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ (C) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (D) $(\text{NH}_4)_2[\text{MoO}_4]$
52. લેસાઈન દ્રાવણમાં FeCl_3 ઉમેરતા જોવા મળતો લાલ રંગ કયાં તત્વોની હાજરી સૂચવે છે ?
- (A) નાઈટ્રોજન (B) સલ્ફર
- (C) (A) અને (B) બંને (D) (A) અને (B) બંનેમાંથી એક પણ નહિ
53. લેસાઈન કસોટી વડે હેલોજનની પરખ કરતી વખતે કયાં તત્વોની હાજરી અવરોધરૂપ બને છે ?
- (A) નાઈટ્રોજન (B) સલ્ફર
- (C) (A) અને (B) બંને (D) (A) અને (B) બંનેમાંથી એક પણ નહિ
54. કઈ કસોટી હેલોજનની પરખ માટે વપરાય છે ?
- (A) લિબિગ કસોટી (B) જેડાહલની પદ્ધતિ
- (C) સોડાલાઈમ કસોટી (D) બાઈલસ્ટાઈન કસોટી
55. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન નાઈટ્રોજનની પરખ માટેની લેસાઈન કસોટી આપશે નહિ ?
- (A) હાઈડ્રેઝિન (B) યૂરિયા (C) ઈથાઈલ એમાઈન (D) નાઈટ્રોઈથેન
56. કેરિયસ પદ્ધતિમાં 0.088 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી 0.285 ગ્રામ AgCl ગ્રામ મળે છે. કાર્બનિક સંયોજનમાં ક્લોરિનનું પ્રમાણ ગણો.
- (A) 82.6 % (B) 80.11 % (C) 70.7 % (D) 63.84 %
57. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા સલ્ફરની પરખ દરમિયાન મળતા કાળા રંગના અવક્ષેપ કયા પદાર્થને આભારી છે ?
- (A) CH_3COOH (B) PbS (C) $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ (D) Na_2S
58. એક કાર્બનિક સંયોજનમાં કાર્બન, હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું વજનથી પ્રમાણ 6:1:8 છે. જો આ સંયોજનની બાષ્પઘનતા 30 હોય, તો તેનું અણુસૂત્ર શોધો.
- (A) CH_4O (B) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (C) CH_3O (D) $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_4$
59. નીચેનામાંથી કયા પદાર્થ માટે જેડાહલની પદ્ધતિ વાપરી શકાય નહિ ?



(D) આપેલામાંથી એક પણ નહિ

60. 0.26 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી 0.36 ગ્રામ BaSO_4 મળે છે. સંયોજનમાં સલ્ફરના ટકા શોધો.
- (A) 19.0 % (B) 26 % (C) 9.9 % (D) 31 %
61. 246 મિગ્રા કાર્બનિક સંયોજનનું સંપૂર્ણ દહન કરતા 198 મિગ્રા CO_2 અને 101.4 મિગ્રા H_2O પ્રાપ્ત થાય છે. આ સંયોજનમાં C અને Hના ટકા ગણો.
- (A) 45.8, 21.9 (B) 21.9, 43.0 (C) 21.95, 4.58 (D) 4.58, 24.6

62. ઝ્યુમાસ પદ્ધતિ વડે નાઈટ્રોજનનું પરિમાપન કરતાં 0.2 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી 300 K તાપમાને અને 715 મિમી દબાણે 40 મિલી નાઈટ્રોજન વાયુ એકઠો થયો. કાર્બનિક સંયોજનમાં નાઈટ્રોજનનું પ્રતિશત પ્રમાણ ગણો. (300K તાપમાને પાણીનું પૃષ્ઠતાણ = 15 મિમી)
- (A) 17.5 % (B) 20.95 % (C) 33.5 % (D) 42 %
63. જેલ્ડાહલની પદ્ધતિથી નાઈટ્રોજનનું પરિમાપન કરતા 0.5 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી ઉદ્ભવતો એમોનિયા વાયુ 10 મિલિ 1M H_2SO_4 નું તટસ્થીકરણ કરે છે. સંયોજનમાં નાઈટ્રોજનના ટકાની ગણતરી કરો.
- (A) 14 % (B) 28 % (C) 56 % (D) 64 %
64. કેરિયસ પદ્ધતિ વડે હેલોજનનું પરિમાપન કરતાં 0.20 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી 0.16 ગ્રામ AgBr મળ્યું. સંયોજનમાં બ્રોમિનના ટકા ગણો.
- (A) 34.04 % (B) 32 % (C) 17.5 % (D) 38 %
65. કેરિયસ પદ્ધતિ વડે હેલોજનનું પરિમાપન કરતાં કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા સિલ્વરનું રૂપાંતર કયા પદાર્થમાં થાય છે ?
- (A) સિલ્વર નાઈટ્રેટ (B) સિલ્વર હેલાઈડ (C) સિલ્વર ઓક્સાઈડ (D) સિલ્વર સલ્ફેટ
66. 0.38 ગ્રામ ડાયબેઝિક એસિડના સિલ્વર ક્ષારનું દહન કરતા 0.27 ગ્રામ સિલ્વર પ્રાપ્ત થયું. એસિડનો અણુભાર ગણો.
- (A) 45 (B) 60 (C) 90 (D) 120
67. કયા તત્વના પરિમાપનમાં I_2O_5 નો ઉપયોગ થાય છે ?
- (A) નાઈટ્રોજન (B) હેલોજન (C) ફોસ્ફરસ (D) ઓક્સિજન
68. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા ફોસ્ફરસનું કેરિયસ પદ્ધતિ વડે પરિમાપન કયા પદાર્થના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે ?
- (A) ઓર્થો ફોસ્ફોરિક એસિડ (B) મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ
(C) એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ (D) ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઈડ
69. 0.5 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનનું કેરિયસ પદ્ધતિ વડે પરિમાપન કરતાં 0.20 ગ્રામ $Mg_2P_2O_7$ પ્રાપ્ત થતું હોય, તો ફોસ્ફરસના ટકા ગણો.
- (A) 13.96 % (B) 15.75 % (C) 11.17 (D) 23 %
70. નીચેનામાંથી કઈ જોડમાં કાર્બનનું ટકાવાર પ્રમાણ સમાન છે ?
- (A) ગ્લુકોઝ અને એસિટિક એસિડ (B) ગ્લુકોઝ અને સુક્રોઝ
(C) ઇથેનોલ અને એસિટિક એસિડ (D) મિથાઈલ ફોર્મેટ અને ખાંડ
71. એક ડાયએસિડિક બેઈઝના 0.984 ગ્રામ ક્લોરોપ્લેટિનેટ ક્ષારને ગરમ કરતાં 0.39 ગ્રામ પ્લેટિનમ મળ્યું, તો બેઈઝનો અણુભાર ગણો.
- (A) 90 (B) 65 (C) 40 (D) 82
72. નાઈટ્રોજનનું પરિમાપન કરવા લીધેલા 0.3 ગ્રામ કાર્બનિક પદાર્થમાંથી ઉદ્ભવતા એમોનિયાને 0.2 N H_2SO_4 ના 100 મિલિ દ્રાવણમાં પસાર કરવામાં આવ્યો. વધારાના એસિડનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ કરવા 20 મિલિ 0.5N સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડની જરૂર પડતી હોય, તો કાર્બનિક પદાર્થમાં નાઈટ્રોજનના ટકા ગણો.
- (A) 50 % (B) 36.5 % (C) 46.6 % (D) 27.3 %
73. એક અબાષ્પશીલ હાઈડ્રોકાર્બન 5.6 % હાઈડ્રોજન ધરાવે છે. આ હાઈડ્રોકાર્બનનો 3.0 ગ્રામ જથ્થો 100 ગ્રામ બેન્ઝિનમાં ઓગાળી દ્રાવણ બનાવતા દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં $1.306 \times 10^{-2} \text{ mm}^2$ જેટલો સાપેક્ષ ઘટાડો જોવા મળે છે. હાઈડ્રોકાર્બનનું અણુસૂત્ર શોધો.
- (A) C_4H_{10} (B) $C_{14}H_{10}$ (C) $C_{10}H_8$ (D) C_7H_{16}
74. એક મોનોબેઝિક એરોમેટિક એસિડમાં 68.87 % કાર્બન અને 4.9 % હાઈડ્રોજન રહેલા છે. 0.305 ગ્રામ એસિડનું તટસ્થીકરણ કરવા 25 મિલિ 0.05M ડાયએસિડિક બેઈઝની જરૂર પડે છે. એસિડનું અણુસૂત્ર શોધો.
- (A) $C_6H_5O_2$ (B) $C_6H_6O_2$ (C) $C_7H_6O_2$ (D) $C_7H_8O_2$

75. બેન્ઝિનની ગરમ નાઈટ્રિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડના મિશ્રણ સાથે પ્રક્રિયા થતા મુખ્ય નીપજ નાઈટ્રોબેન્ઝિન તેમજ એક ગૌણ નીપજ મળે છે. ગૌણ નીપજમાં કાર્બન : 42.86 %, હાઈડ્રોજન 2.40 %, નાઈટ્રોજન 16.67 % અને ઓક્સિજન 38.07 % છે. જ્યારે 5.5 ગ્રામ ગૌણ નીપજને 45 ગ્રામ બેન્ઝિનમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે બનતા દ્રાવણનું ઉત્કલનબિંદુ શુદ્ધ બેન્ઝિનના ઉત્કલનબિંદુ કરતાં 1.84 C° ઊંચું માલૂમ પડ્યું, તો ગૌણ નીપજનું અણુસૂત્ર શોધો.
 (A) C₆H₄N₂O₄ (B) C₃H₂NO₂ (C) C₆H₅N₂O (D) C₆H₃NO₃
76. $C_XH_YN_Z + \left(2X + \frac{Y}{2}\right) CuO \xrightarrow{\Delta} X CO_2 + \frac{Y}{2} H_2O + XN_2 + YCu$ માં X અને Yનાં મૂલ્યો શોધો.
 (A) X = 2X + Y, Y = 2z (B) X = 2X + $\frac{Y}{2}$, Y = $\frac{Z}{2}$
 (C) X = $\frac{Z}{2}$, Y = 2X + $\frac{Y}{2}$ (D) X = 2z, Y = 2X + $\frac{Y}{2}$
77. કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા કાર્બનનું પરિમાપન કરતી વખતે ઉત્પન્ન થતાં CO₂ વાયુને પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડના દ્રાવણમાં શોષવામાં આવે છે. કારણકે,
 (A) KOH ખૂબ સારો અધિશોષક છે. (B) KOH બેઝિક છે.
 (C) પ્રક્રિયાવેગ વધે છે. (D) ઉપર આપેલા બધા જ.
78. એક હાઈડ્રોકાર્બન પ્રતિ 1 ગ્રામ હાઈડ્રોજન દીઠ 10.5 ગ્રામ કાર્બન ધરાવે છે. આ હાઈડ્રોકાર્બનની 1 લિટર બાષ્પનું 127°C તાપમાને અને 1 વાતાવરણ દબાણે વજન 2.8 ગ્રામ છે. હાઈડ્રોકાર્બનનું અણુસૂત્ર શોધો.
 (A) CH (B) CH₂ (C) C₇H₈ (D) C₅H₆
79. એક ડાયબેઝિક કાર્બનિક એસિડમાં C = 34.62 %, H = 3.84 % છે. આ એસિડનો 0.1075 ગ્રામ જથ્થો 20 મિલિ 0.1N NaOH સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ માટે વાપરે છે. એસિડનું અણુસૂત્ર શોધો.
 (A) C₄H₄O₃ (B) C₃H₄O₃ (C) C₄H₃O₄ (D) C₃H₄O₄
80. કાર્બન, હાઈડ્રોજન અને નાઈટ્રોજન તત્વો ધરાવતા સંયોજનમાં આ તત્વો 18 : 2 : 7 ના પ્રમાણમાં છે. જો સંયોજનનો અણુભાર 108 હોય, તો તેનું અણુસૂત્ર શોધો.
 (A) C₃H₄N (B) C₆H₈N₂ (C) C₃H₄N₂ (D) C₆H₅N

જવાબો : 31. (C), 32. (B), 33. (D), 34. (A), 35. (A), 36. (B), 37. (A), 38. (D), 39. (D), 40. (B), 41. (B), 42. (D), 43. (A), 44. (A), 45. (C), 46. (B), 47. (C), 48. (D), 49. (A), 50. (C), 51. (B), 52. (C), 53. (C), 54. (D), 55. (A), 56. (B), 57. (B), 58. (B), 59. (D), 60. (A), 61. (C), 62. (B), 63. (C), 64. (A), 65. (B), 66. (C), 67. (D), 68. (B), 69. (C), 70. (A), 71. (D), 72. (C), 73. (B), 74. (C), 75. (A), 76. (C), 77. (B), 78. (C), 79. (D), 80. (B)

- નીચેના દરેક પ્રશ્નમાં બે વિધાનો આવેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. દરેક વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :
 (A) જો વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં હોય તથા કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપતું હોય.
 (B) જો વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં હોય પણ કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપતું ના હોય.
 (C) જો વિધાન (A) સાચું હોય અને કારણ (R) ખોટું હોય.
 (D) જો વિધાન (A) સાચું હોય અને કારણ (R) સાચું હોય.
 (E) જો વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં હોય.
81. વિધાન (A) : આવશ્યક તેલનું શુદ્ધિકરણ બાષ્પ નિસ્સંદન વડે કરવામાં આવે છે.
 કારણ (R) : આવશ્યક તેલ અબાષ્પશીલ હોય છે.

82. વિધાન (A) : હાઈડ્રોક્સિલ એમાઈન (NH_2OH)ની લેસાઈન કસોટી કરતાં મુસિયન વાદળી રંગ જોવા મળે છે.
કારણ (R) : હાઈડ્રોક્સિલ એમાઈન સોડિયમ સાથે સોડિયમ સાયનાઈડ બનાવતું નથી.
83. વિધાન (A) : એસિટોન અને મિથેનોલના મિશ્રણનું અલગીકરણ સાદા નિસ્કંદન વડે કરી શકાય છે.
કારણ (R) : એસિટોન અને મિથેનોલનાં ઉત્કલનબિંદુઓ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે.
84. વિધાન (A) : નાઈટ્રોજનના પરિમાપન માટે ડ્યુમાસ પદ્ધતિ કરતાં જેલ્ડાહલની પદ્ધતિ વધુ ઉપયોગી છે.
કારણ (R) : જ્યારે નાઈટ્રોજન પરમાણુ ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે સીધો જોડાયેલો હોય ત્યારે પણ જેલ્ડાહલની પદ્ધતિ વાપરી શકાય છે.
85. વિધાન (A) : લેસાઈન કસોટીમાં તાજું બનાવેલું ફેરસ સલ્ફેટનું દ્રાવણ વાપરવામાં આવે છે.
કારણ (R) : ફેરસ સલ્ફેટનું દ્રાવણ પડી રહે તો Fe^{2+} આયનનું Fe^{3+} આયનમાં ઓક્સિડેશન થાય છે.
86. વિધાન (A) : DNA અને RNA માં રહેલા નાઈટ્રોજનનું પરિમાપન જેલ્ડાહલની પદ્ધતિ વડે કરી શકાય નહિ.
કારણ (R) : DNA અને RNA માં નાઈટ્રોજન પરમાણુ ચક્રિય રચનામાં રહેલો છે.
87. વિધાન (A) : મિથાઈલ ક્લોરાઈડ (CH_3Cl)માં ક્લોરિન હાજર છે છતાં પણ તે AgNO_3 સાથે સફેદ અવક્ષેપ આપતું નથી.
કારણ (R) : મિથાઈલ ક્લોરાઈડ સહસંયોજક સંયોજન છે અને તેથી તેનું Cl^- માં આયનીકરણ થતું નથી.
88. વિધાન (A) : ડ્યુમાસ પદ્ધતિમાં ઉત્પન્ન થતાં નાઈટ્રોજન વાયુનું દબાણ નાઈટ્રોમિટર વડે માપવામાં આવે છે.
કારણ (R) : નાઈટ્રોમિટર વાયુનું દબાણ માપવાનું આધુનિક સાધન છે.
89. વિધાન (A) : એનીલીન અને ક્લોરોફોર્મના મિશ્રણનું અલગીકરણ સાદા નિસ્કંદન વડે કરી શકાય છે.
કારણ (R) : એનીલીન અને ક્લોરોફોર્મનાં ઉત્કલનબિંદુઓ વચ્ચે બહુ તફાવત નથી.
90. વિધાન (A) : AgNO_3 વડે હેલોજનની પરખ કરતાં પહેલાં લેસાઈન દ્રાવણને HNO_3 સાથે ગરમ કરવામાં આવે છે.
કારણ (R) : સાયનાઈડ અને સલ્ફાઈડ આયનની હાજરી કસોટીમાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે.

જવાબો : 81. (C), 82. (D), 83. (E), 84. (E), 85. (A), 86. (A), 87. (A), 88. (E), 89. (C), 90. (A).

