

● અવકાશમાં રેખા

અવકાશમાં આવેલાં કોઈ પણ બે ભિન્ન બિંદુઓ એક અનન્ય રેખા નિશ્ચિત કરે છે. અવકાશની રેખાને મુખ્યત્વે $L, M, N, \dots$ વડે દર્શાવાય છે.

● રેખાની દિશા

જો R^3 ની રેખા L પર બે ભિન્ન બિંદુઓ A અને B હોય, તો $\vec{AB}$ અને $\vec{BA}$ આ બે વિરુદ્ધ દિશાના સદિશો છે.

જો $\vec{AB}$ ની દિશા $\vec{l}$ હોય, તો $\vec{BA}$ ની દિશા $-\vec{l}$ થશે. $\vec{AB}$ (અથવા રેખા L)ની દિશા $\pm \vec{l}$ લેવામાં આવે છે.

જો રેખા L ની દિક્કોસાઈન એટલે કે તે રેખા પર આવેલા કોઈ પણ સદિશની દિક્કોસાઈન. જો રેખા L ની દિક્કોસાઈન l, m, n હોય, તો રેખા L ની દિક્કોસાઈન $-l, -m, -n$ પણ થાય. અહીં, $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

● બિંદુ $A(\vec{a})$ માંથી પસાર થતી તથા શૂન્યેતર સદિશ $\vec{l}$ ની દિશાવાળી રેખાનું સમીકરણ :

● સદિશ સમીકરણ (Vector equations) : $\vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, k \in R$.

● પ્રચલ સમીકરણ (Parametric equations) : જો $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ અને $\vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$ હોય, તો રેખાના પ્રચલ સમીકરણ : $x = x_1 + kl_1, y = y_1 + kl_2, z = z_1 + kl_3$ ($k \in R$)

● કાર્તેઝિય સમીકરણ (સંમિત સ્વરૂપ) (Symmetric form) :

$$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3} (=k)$$

જો $l_1 = 0, l_2 \neq 0, l_3 \neq 0$, તો રેખાનાં સમીકરણ $x = x_1, \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3}$ અથવા

$$\frac{x-x_1}{0} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3} \quad (\text{અહીં } x-x_1 \text{ ના છેદમાં શૂન્યનો અર્થ સદિશ } \vec{l} \text{ નો પ્રથમ ઘટક } l_1 = 0 \text{ તો}$$

$x = x_1$ તે જ પ્રમાણે, જો $l_1 = 0, l_2 = 0$ તો રેખાનું સમીકરણ $\frac{x-x_1}{0} = \frac{y-y_1}{0} = \frac{z-z_1}{l_3}$ થશે, એટલે કે $x = x_1, y = y_1, z$ સ્વૈર.)

જો રેખાની દિક્કોસાઈન l, m, n હોય, તો રેખાનું સમીકરણ $\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$ થાય, જ્યાં

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1.$$

● કોઈક $k \in R$ માટે $(x_1 + kl_1, y_1 + kl_2, z_1 + kl_3)$ એ રેખા પરનું કોઈ પણ બિંદુ થશે.

● R^3 માં યામાક્ષોનાં સમીકરણ :

X -અક્ષનું સમીકરણ $y = 0, z = 0$

Y -અક્ષનું સમીકરણ $z = 0, x = 0$

Z -અક્ષનું સમીકરણ $x = 0, y = 0$

- બે ભિન્ન બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ :

- બે ભિન્ન બિંદુઓ $A(\vec{a})$ અને $B(\vec{b})$ માંથી પસાર થતી રેખાનું સદિશ સમીકરણ :

$$\vec{r} = \vec{a} + k(\vec{b} - \vec{a}), k \in R$$

- પ્રચલ સમીકરણ : જો $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ અને $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ હોય, તો રેખાના

$$\left. \begin{aligned} x &= x_1 + k(x_2 - x_1) \\ y &= y_1 + k(y_2 - y_1) \\ z &= z_1 + k(z_2 - z_1) \end{aligned} \right\} k \in R$$

- કાર્તેઝિય સમીકરણ :

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$$\text{જો } x_1 = x_2 \text{ તો સમીકરણ } \frac{x - x_1}{0} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \text{ થશે.}$$

$$\text{જો } x_1 = x_2, y_1 = y_2 \text{ તો } x = x_1, y = y_1, z \text{ સ્વૈર.}$$

- સમરેખ બિંદુઓ :

$A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ અને $C(\vec{c})$ અવકાશનાં ભિન્ન બિંદુઓ છે.

- જો A, B, C સમરેખ હોય તો $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$

- A, B, C સમરેખ હોવાની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત $(\vec{c} - \vec{a}) \times (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{0}$

- પરિણામ : જો $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ અને $C(\vec{c})$ અવકાશમાં ભિન્ન બિંદુઓ હોય અને શૂન્યેતર વાસ્તવિક

સંખ્યાઓ l, m, n એવી મળે કે જેથી $l + m + n = 0$ અને $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c} = \vec{0}$ તો અને તો જ $A(\vec{a})$,

$B(\vec{b})$ અને $C(\vec{c})$ સમરેખ છે.

- બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

અવકાશની બે ભિન્ન રેખાઓ $L: \vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $M: \vec{r} = \vec{b} + k\vec{m}$, $k \in R$ છે.

- (i) જો $\vec{l} = \vec{m}$ અથવા $\vec{l} = -\vec{m}$ તો $\vec{l} \times \vec{m} = \vec{0}$. તેથી બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ શૂન્ય છે. બંને રેખાની દિશા સમાન છે, તેથી L અને M સંપાતી અથવા સમાંતર રેખાઓ છે.

- (ii) $\vec{l} \cdot \vec{m} = 0$ તો $\vec{l} \perp \vec{m}$ એટલે કે $L \perp M$. તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ $\frac{\pi}{2}$ થશે.

- (iii) $\vec{l} \neq \pm \vec{m}$ તથા $\vec{l} \cdot \vec{m} \neq 0$ અને L અને M વચ્ચેના ખૂણાનું માપ (લઘુકોણ) α હોય, તો

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{m}|}{|\vec{l}| |\vec{m}|}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

આ પરિણામ $\alpha = 0$ અને $\alpha = \frac{\pi}{2}$ માટે પણ સત્ય છે, એટલે કે $\cos \alpha = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{m}|}{|\vec{l}| |\vec{m}|}, \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}.$

● બે રેખાઓ વચ્ચેનો કોણદ્વિભાજક

બે છેદક રેખાઓનું છેદબિંદુ $A(\vec{a})$ હોય, તો તે બે રેખાનાં સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, \quad k \in R$ અને

$$\vec{r} = \vec{a} + k \vec{m}, \quad k \in R \text{ લેતાં, તેમના વચ્ચેના છેદકોણના દ્વિભાજકનું સમીકરણ } \vec{r} = \vec{a} + t \left\{ \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} \pm \frac{\vec{m}}{|\vec{m}|} \right\} \text{ થશે.}$$

લઘુકોણના કોણ દ્વિભાજક (અંતઃ દ્વિભાજક) માટે ‘+’ ચિહ્ન અને ગુરુકોણના કોણદ્વિભાજક (બહિર્દ્વિભાજક) માટે ‘-’ ચિહ્ન લેવું.

● બે ભિન્ન રેખાઓ $\vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, \quad k \in R$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k \vec{m}, \quad k \in R$ પરસ્પર છેદે, તો

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = 0.$$

જો $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1), \vec{b} = (x_2, y_2, z_2), \vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$ અને $\vec{m} = (m_1, m_2, m_3)$ હોય, તો બે રેખાઓ

$$\text{છેદે, તે માટેની શરતનું કાર્તેઝિય સ્વરૂપ } \begin{vmatrix} x_1 - x_2 & y_1 - y_2 & z_1 - z_2 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{vmatrix} = 0$$

● બે ભિન્ન રેખાઓ $\vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, \quad k \in R$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k \vec{m}, \quad k \in R$ સમતલીય હોવા માટેની આવશ્યક

$$\text{શરત } (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = 0.$$

● જો બે રેખાઓને સમાવતું કોઈ પણ સમતલ ન મળે, તો તે બે રેખાઓને વિષમતલીય રેખાઓ (Skew lines) કહે છે.

● જો બે રેખાઓ $\vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, \quad k \in R$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k \vec{m}, \quad k \in R$ માટે $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) \neq 0$ તો તે બે રેખાઓ વિષમતલીય છે.

● બે રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ

રેખા $L: \vec{r} = \vec{a} + k \vec{l}, \quad k \in R$ અને $M: \vec{r} = \vec{b} + k \vec{m}, \quad k \in R$, માટે

$$(1) \quad \text{જો } \vec{l} \times \vec{m} = \vec{0} \text{ અને } (\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l} \neq \vec{0} \text{ તો } L \parallel M.$$

$$(2) \quad \text{જો } \vec{l} \times \vec{m} = \vec{0} \text{ અને } (\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l} = \vec{0} \text{ તો } L \text{ અને } M \text{ સંપાતી રેખાઓ છે.}$$

(3) જો $\vec{l} \times \vec{m} \neq \vec{0}$ અને $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) \neq 0$ તો L અને M વિષમતલીય રેખાઓ છે.

(4) જો $\vec{l} \times \vec{m} \neq \vec{0}$ અને $(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = 0$ તો L અને M છેદક રેખાઓ છે.

● બિંદુનું રેખાથી લંબઅંતર :

બિંદુ $P(\vec{p})$ નું રેખા $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ થી લંબઅંતર $= \frac{|(\vec{p} - \vec{a}) \times \vec{l}|}{|\vec{l}|}$ અથવા $|(\vec{p} - \vec{a}) \times \vec{l}|$ થાય.

● બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર :

ધારો કે $L: \vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $M: \vec{r} = \vec{b} + k\vec{l}$, $k \in R$ બે સમાંતર રેખાઓ છે. L અને M વચ્ચેનું

$$\text{લંબઅંતર} = \frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l}|}{|\vec{l}|}.$$

● બે વિષમતલીય રેખાઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર (ન્યૂનતમ અંતર) :

ધારો કે $L: \vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $M: \vec{r} = \vec{b} + k\vec{m}$, $k \in R$ વિષમતલીય રેખાઓ છે. L અને M વચ્ચેનું

$$\text{ન્યૂનતમ અંતર} = \frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m})|}{|\vec{l} \times \vec{m}|}.$$

● બિંદુથી રેખા પરનો લંબપાદ, લંબરેખાનું સમીકરણ અને રેખામાં પ્રતિબિંબ :

(1) બિંદુ $P(\alpha, \beta, \gamma)$ થી $L: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{l_2} = \frac{z - z_1}{l_3}$ રેખા પરના લંબપાદ Mના યામ

$$(x_1 + kl_1, y_1 + kl_2, z_1 + kl_3).$$

$\vec{PM} \perp \vec{l}$ પરથી k શોધી લંબપાદના યામ મેળવવા.

(2) રેખા L ને બિંદુ $P(\vec{p})$ માંથી લંબરેખાનું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{p} + k\vec{PM}$, $k \in R$.

(3) બિંદુ P નું રેખા L ને સાપેક્ષ પ્રતિબિંબ Q હોય, તો M એ $\overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ થશે P અને M પરથી Q ના યામ મળે.

● છેદક રેખાઓનું છેદબિંદુ :

બે રેખાઓ $L: \vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $M: \vec{r} = \vec{b} + k\vec{m}$, $k \in R$ એકબીજાને અનન્ય બિંદુમાં છેદે છે.

રેખા $L: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{l_2} = \frac{z - z_1}{l_3}$ પરનું કોઈ પણ બિંદુ $(x_1 + k_1l_1, y_1 + k_1l_2, z_1 + k_1l_3)$ અને રેખા

$M: \frac{x - x_2}{m_1} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{m_3}$ પરનું કોઈ પણ બિંદુ $(x_2 + k_2m_1, y_2 + k_2m_2, z_2 + k_2m_3)$ લઈએ.

બંને બિંદુના x, y અને z યામ સરખાવી k_1 અને k_2 ની કિંમત મેળવી, કોઈ પણ એક બિંદુના યામમાં આ કિંમત

મૂકવાથી છેદબિંદુના યામ મળશે.

● સમતલ

● પૂર્વધારણા

- (1) ત્રણ ભિન્ન અસમરેખ બિંદુઓ અનન્ય સમતલ નિશ્ચિત કરે છે.
- (2) એક રેખા અને આ રેખા પર ન હોય તેવું એક બિંદુ અનન્ય સમતલ નિશ્ચિત કરે છે.
- (3) બે સમાંતર રેખાઓ અનન્ય સમતલ નિશ્ચિત કરે છે.
- (4) અનન્ય બિંદુમાં છેદતી બે રેખાઓ એક અનન્ય સમતલ નિશ્ચિત કરે છે.

● ત્રણ ભિન્ન અસમરેખ બિંદુઓમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ

- R^3 નાં ત્રણ ભિન્ન અસમરેખ બિંદુઓ $A(\vec{a})$, $B(\vec{b})$ અને $C(\vec{c})$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સદિશ સમીકરણ $\vec{r} = l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$, $l, m, n \in R$ અને $l + m + n = 1$.

- $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot [(\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a})] = 0$ આ સમતલનું સદિશ સમીકરણ છે.

- સમતલનાં પ્રચલ સમીકરણ : $\vec{r} = (x, y, z)$, $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ અને $C(x_3, y_3, z_3)$ લેતાં,
સમતલનાં પ્રચલ સમીકરણ $x = lx_1 + mx_2 + nx_3$ જ્યાં $l, m, n \in R$ અને $l + m + n = 1$.
 $y = ly_1 + my_2 + ny_3$
 $z = lz_1 + mz_2 + nz_3$

- કાર્તેઝિય સમીકરણ :
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

- XY - સમતલનું સમીકરણ $z = 0$
 YZ - સમતલનું સમીકરણ $x = 0$
 ZX - સમતલનું સમીકરણ $y = 0$

● R^3 નાં ચાર ભિન્ન બિંદુઓ સમતલીય હોવા માટેની શરત :

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ અને $D(x_4, y_4, z_4)$ સમતલીય હોય, તો અને તો જ

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{એટલે કે} \quad \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

● અક્ષો પર અંતઃખંડ બનાવતા સમતલનું સમીકરણ :

જો સમતલ યામાક્ષોને $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ અને $C(0, 0, c)$ માં છેદે, તો સમતલનો X -અંતઃખંડ a , Y -અંતઃખંડ b અને Z -અંતઃખંડ c થાય.

- જો સમતલ X -અક્ષ સાથે a , Y -અક્ષ સાથે b અને Z -અક્ષ સાથે c અંતઃખંડ ($a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$) બનાવે,

તો સમતલનું સમીકરણ $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

● સમતલનો અભિલંબ

સમતલમાં આવેલી પ્રત્યેક રેખાને લંબ હોય તેવી રેખાની દિશામાં આવેલા સદિશને સમતલનો અભિલંબ કહે છે.

સામાન્ય રીતે સમતલના અભિલંબને $\vec{n}$ અથવા $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3, \dots$ વડે દર્શાવાય છે.

● $\vec{n}$ અભિલંબવાળા સમતલનું સમીકરણ :

- $A(\vec{a})$ માંથી પસાર થતા અને $\vec{n}$ અભિલંબવાળા સમતલનું સદિશ સમીકરણ : $\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n}$ છે.

જો $\vec{a} \cdot \vec{n} = d$ લઈએ, તો સમતલનું સદિશ સમીકરણ $\vec{r} \cdot \vec{n} = d$ થશે.

- કાર્તેઝિય સમીકરણ : $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{n} = (a, b, c)$, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ લેતાં, સમતલનું કાર્તેઝિય સમીકરણ $ax + by + cz = d$ થશે. જ્યાં $d = ax_1 + by_1 + cz_1$ અથવા $a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$, $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.
- X - અક્ષને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ $by + cz = d$
 Y - અક્ષને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ $ax + cz = d$
 Z - અક્ષને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ $ax + by = d$
- સમતલના અભિલંબના દિક્ષૂણા α, β, γ હોય અને સમતલનું ઊગમબિંદુથી લંબઅંતર p (અભિલંબની લંબાઈ) હોય, તેવા સમતલનું સમીકરણ $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p$.
- સમતલના સમીકરણ $ax + by + cz = d$ ને $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = d$ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે સમતલના સમીકરણને $|\vec{n}|$ વડે ભાગીશું.

સમીકરણનું સ્વરૂપ $\frac{a}{|\vec{n}|} x + \frac{b}{|\vec{n}|} y + \frac{c}{|\vec{n}|} z = \frac{d}{|\vec{n}|}$ થશે.

- જો $d > 0$ તો $\vec{n} = (a, b, c)$ લઈશું અને $\hat{n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \left(\frac{a}{|\vec{n}|}, \frac{b}{|\vec{n}|}, \frac{c}{|\vec{n}|} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

અને $\frac{d}{|\vec{n}|} = p$.

- જો $d < 0$ તો $\vec{n} = (-a, -b, -c)$ લઈશું અને

$\hat{n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \left(\frac{-a}{|\vec{n}|}, \frac{-b}{|\vec{n}|}, \frac{-c}{|\vec{n}|} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ અને $\frac{-d}{|\vec{n}|} = p$.

- સમતલ $ax+by+cz+d=0$ ને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ $ax+by+cz+k=0$ જ્યાં $k \in R - \{d\}$.

- રેખા $\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$ ને લંબ સમતલનું સમીકરણ $lx+my+nz+d=0$.

● રેખા અને સમતલનો છેદગણ

ધારો $L: \vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ રેખા દર્શાવે છે અને $\pi: \vec{r} \cdot \vec{n} = d$ સમતલ દર્શાવે છે. ($\vec{l} \neq \vec{0}$, $\vec{n} \neq \vec{0}$).

$\vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$, $\vec{n} = (a, b, c)$, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ લેતાં,

- (1) $\vec{l} \cdot \vec{n} = 0$ અને $ax_1+by_1+cz_1 \neq d$ તો રેખા સમતલને સમાંતર થશે, તેમનો છેદગણ $\emptyset$, એટલે કે $L \cap \pi = \emptyset$.

- (2) $\vec{l} \cdot \vec{n} = 0$ અને $ax_1+by_1+cz_1 = d$ તો રેખા સમતલમાં આવેલી છે, તેથી $L \cap \pi = L$

- (3) $\vec{l} \cdot \vec{n} \neq 0$ તો રેખા સમતલને અનન્ય બિંદુમાં છેદે છે. છેદબિંદુ મેળવવા માટે રેખા

$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3}$ પરના કોઈ પણ બિંદુના યામ $P(x_1+kl_1, y_1+kl_2, z_1+kl_3)$ ને સમતલના સમીકરણમાં મૂકી k નું મૂલ્ય મેળવો. k નું મૂલ્ય P ના યામમાં મૂકતાં, છેદબિંદુ P મળશે.

● બે સમતલ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

ધારો કે સમતલો $\pi_1: \vec{r} \cdot \vec{n}_1 = d_1$ અને $\pi_2: \vec{r} \cdot \vec{n}_2 = d_2$ છે. તેમના વચ્ચેના ખૂણાનું માપ θ છે.

- (1) π_1 અને π_2 વચ્ચેના ખૂણાનું માપ $\frac{\pi}{2}$ હોય, તો અને તો જ $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

- (2) π_1 અને π_2 વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 0 હોય, તો અને તો જ $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0}$.

- (3) $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, એટલે કે $\theta = \cos^{-1} \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.

- જો સમતલનાં સમીકરણ $a_1x+b_1y+c_1z=d_1$ અને $a_2x+b_2y+c_2z=d_2$ હોય, તો

$$\cos \theta = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2} \sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}.$$

$$\text{એટલે કે } \theta = \cos^{-1} \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2} \sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}.$$

● રેખા અને સમતલ વચ્ચેનો ખૂણો

ધારો કે રેખાનું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને સમતલનું સમીકરણ $\vec{r} \cdot \vec{n} = d$ છે. જો રેખા અને સમતલ

વચ્ચેનો ખૂણાનું માપ α હોય, તો $\alpha = \sin^{-1} \frac{|\vec{l} \cdot \vec{n}|}{|\vec{l}| |\vec{n}|}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

● બે સમાંતર રેખાઓમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ

● સમાંતર રેખાઓ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k\vec{l}$, $k \in R$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સદિશ

સમીકરણ $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot [(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{l}] = 0$.

● જો $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ અને $\vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$ હોય, તો સમતલનું કાર્તેઝિય સમીકરણ

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{vmatrix} = 0.$$

● બે છેદતી રેખાઓમાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ

● $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ અને $\vec{r} = \vec{b} + k\vec{m}$, $k \in R$ પરસ્પર અનન્ય બિંદુમાં છેદતી બે રેખાઓ છે. આ

રેખાઓમાંથી પસાર થતા સમતલનું સદિશ સમીકરણ $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = 0$.

● જો $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{l} = (l_1, l_2, l_3)$ અને $\vec{m} = (m_1, m_2, m_3)$, તો સમતલનું કાર્તેઝિય સમીકરણ

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{vmatrix} = 0.$$

● સમતલમાં ન હોય તેવા બિંદુથી સમતલનું લંબઅંતર

સમતલનું સમીકરણ $\vec{r} \cdot \vec{n} = d$ છે અને $P(\vec{p})$ સમતલમાં ન હોય તેવું બિંદુ છે.

$$P \text{ થી સમતલનું લંબઅંતર} = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{n} - d|}{|\vec{n}|}.$$

જો સમતલનું સમીકરણ $ax + by + cz + d = 0$ હોય અને $\vec{p} = (x_1, y_1, z_1)$ તો

$$\text{લંબઅંતર} = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

● બે સમાંતર સમતલો વચ્ચેનું લંબઅંતર

સમાંતર સમતલો $\vec{r} \cdot \vec{n} = d_1$ અને $\vec{r} \cdot \vec{n} = d_2$ વચ્ચેનું લંબઅંતર $= \frac{|d_1 - d_2|}{|\vec{n}|}$.

● સમતલો $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ અને $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ એકબીજાને સમાંતર હોય, તો

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}, \quad d_1 \neq d_2$$

● બે સમતલોનો છેદ

● સમતલો $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = d_1$ અને $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = d_2$ માટે જો $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \neq \vec{0}$ તો બંને સમતલો એકબીજાને છેદે છે.

સમતલોનો છેદ એક રેખા થશે. આ રેખાનું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$, જ્યાં $\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

સમતલોનું છેદબિંદુ એટલે કે છેદરેખા પરનું બિંદુ શોધવા માટે સમતલોના સમીકરણમાં $z = 0$ (અથવા x કે y નું મૂલ્ય 0) લઈ બંને સમીકરણ ઉકેલી x અને y નું મૂલ્ય મેળવવું.

● સમતલો $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ અને $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ એકબીજાને છેદતાં હોય તો તેમની છેદ રેખામાંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 + \lambda (a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0, \quad \lambda \in R.$$

$$\text{અથવા } \lambda(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

● બિંદુનું સમતલમાં પ્રતિબિંબ

ધારો કે બિંદુ $P(x_1, y_1, z_1)$ નું સમતલ $ax + by + cz + d = 0$ ને સાપેક્ષ પ્રતિબિંબ $Q(x_2, y_2, z_2)$ છે.

$$\text{હવે } \frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = \frac{z_2 - z_1}{c} = -2 \left(\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{a^2 + b^2 + c^2} \right) = r.$$

$\therefore$ પ્રતિબિંબ Q ના યામ $(x_1 + ar, y_1 + br, z_1 + cr)$ થશે.

● સમતલની બહારના બિંદુથી સમતલ પરનો લંબપાદ

ધારો કે સમતલ $ax + by + cz + d = 0$ ની બહાર બિંદુ $P(x_1, y_1, z_1)$ છે. P માંથી સમતલ પરનો લંબપાદ

$$M(x_2, y_2, z_2) \text{ હોય, તો } x_2 = x_1 + ar, \quad y_2 = y_1 + br, \quad z_2 = z_1 + cr \text{ જ્યાં } r = -\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

● બે સમતલો વચ્ચેના ખૂણાને દુભાગતાં સમતલોનાં સમીકરણ

સમતલો $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ અને $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ વચ્ચેના ખૂણાને દુભાગતાં સમતલોનાં સમીકરણ

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1z + d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2z + d_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}.$$

● સમતલમાં રેખાનું પ્રતિબિંબ :

રેખા : $\frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{l_2} = \frac{z - z_1}{l_3}$ અને સમતલ $\pi : ax + by + cz + d = 0$.

- રેખા અને સમતલનું છેદબિંદુ P મેળવો.
- રેખા પરના બિંદુ (x_1, y_1, z_1) નું સમતલમાં પ્રતિબિંબ Q મેળવો.
- $\overleftrightarrow{PQ}$ નું સમીકરણ મેળવો.

$\overleftrightarrow{PQ}$ એ સમતલમાં આપેલ રેખાનું પ્રતિબિંબ દર્શાવતી રેખા છે.

બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો

(1) અવકાશમાં આવેલી રેખાની દિક્કોસાઈન $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ હોય તો

- (A) $0 < c < 1.5$ (B) $c > 2$ (C) $c = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $c = \sqrt{3}$

ઉકેલ : રેખાની દિક્કોસાઈન $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ લેતાં,

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\therefore \frac{1}{c^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{c^2} = 1$$

$$\therefore 3 = c^2$$

$$\therefore c = \pm \sqrt{3}$$

જવાબ : (D)

(2) $(3, 2, 1)$ માંથી પસાર થતી અને $5x - 2y - z - 9 = 0$ ને લંબરેખાનું સમીકરણ =

(A) $\frac{x-5}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{1}$ (B) $\frac{x+3}{5} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$

(C) $\frac{x-3}{5} = \frac{2-y}{2} = \frac{1-z}{1}$ (D) $\frac{x+3}{-5} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{1}$

ઉકેલ : સમતલ $5x - 2y - z - 9 = 0$ નો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = 5\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ છે. રેખા સમતલને લંબ છે,

તેથી રેખાની દિશા $\vec{n}$ થશે અને રેખા $(3, 2, 1)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore \text{રેખાનું સમીકરણ : } \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3}$$

$$\therefore \frac{x-3}{5} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\therefore \frac{x-3}{5} = \frac{2-y}{2} = \frac{1-z}{1}$$

જવાબ : (C)

(3) બિંદુ $(1, 2, -3)$ થી રેખા $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{3}$ નું લંબઅંતર

- (A) $\frac{15}{14}$ (B) $\sqrt{\frac{531}{14}}$ (C) $\frac{531}{14}$ (D) $\frac{\sqrt{531}}{14}$

ઉકેલ : બિંદુ $P(1, 2, -3)$ થી રેખા $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{3}$ નું લંબઅંતર,

$$|\vec{AP} \times \hat{l}|, \text{ જ્યાં } A(-2, -1, 3) \text{ અને } \vec{l} = (-1, 2, 3)$$

$$p = \frac{|(3, 3, -6) \times (-1, 2, 3)|}{|(-1, 2, 3)|}$$

$$= \frac{|(21, -3, 9)|}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{531}{14}}$$

જવાબ : (B)

(4) જો બિંદુઓ $(-3, -1, 2)$, $(1, 4, x)$ અને $(5, y, 8)$ સમરેખ હોય, તો x અને y અનુક્રમે

- (A) 9 અને 5 (B) -5 અને 9 (C) 5 અને 9 (D) 5 અને -9

ઉકેલ : બિંદુઓ $\vec{a} = -3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 4\hat{j} + x\hat{k}$ અને $\vec{c} = 5\hat{i} + y\hat{j} + 8\hat{k}$ સમરેખ છે.

$$\text{તેથી } (\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a}) = \vec{0}.$$

$$\therefore (4\hat{i} + 5\hat{j} + (x-2)\hat{k}) \times (8\hat{i} + (y+1)\hat{j} + 6\hat{k}) = \vec{0}$$

$$\therefore (-xy + 2y - x + 32)\hat{i} + (8x - 40)\hat{j} + (4y - 36)\hat{k} = \vec{0}$$

$$\therefore 8x - 40 = 0 \text{ અને } 4y - 36 = 0$$

$$\therefore x = 5 \text{ અને } y = 9$$

જુઓ કે $-xy + 2y - x + 32 = 0$ થાય છે.

જવાબ : (C)

બીજી રીત :

$$\vec{BC} = k \vec{AB}$$

$$\therefore (4, 5, x-2)k = (4, y-4, 8-x)$$

$$\therefore 4k = k$$

$$\therefore k = 1$$

$$\therefore (4, 5, x-2) = (4, y-4, 8-x)$$

$$\therefore y-4=5 \Rightarrow y=9$$

$$\therefore x-2=8-x \Rightarrow x=5$$

$$\therefore x=5, y=9$$

(5) યામાક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવતી રેખાની દિશ્કોસાઈન છે.

- (A) $\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$ (C) 1, 1, 1 (D) $-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3}$

ઉકેલ : રેખાની દિક્કોસાઈન l, m, n હોય, તો $l = m = n$ અને $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

$$\therefore 3l^2 = 1$$

$$\therefore l = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = m = n.$$

$$\therefore \text{રેખાની દિક્કોસાઈન } \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

જવાબ : (B)

(6) રેખા અક્ષોની ધનદિશા સાથે α, β, γ માપના ખૂણા બનાવે, તો $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = \dots\dots$

- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 3

ઉકેલ : રેખાના દિક્ખૂણાઓ α, β, γ છે.

$$\therefore \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\therefore 1 - \sin^2\alpha + 1 - \sin^2\beta + 1 - \sin^2\gamma = 1$$

$$\therefore 2 = \sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$$

જવાબ : (A)

(7) બિંદુ $(1, 2, 3)$ નું X-અક્ષથી અંતર =

- (A) 1 (B) $\sqrt{14}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) 5

ઉકેલ : (x_1, y_1, z_1) નું $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$ થી અંતર = $|\vec{OA} \times \hat{l}| = |(x_1, y_1, z_1) \times (1, 0, 0)| = |(0, z_1, -y_1)| = \sqrt{y_1^2 + z_1^2}$

$$\text{બિંદુનું X-અક્ષથી અંતર} = \sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}.$$

જવાબ : (C)

નોંધ : (x_1, y_1, z_1) નું X-અક્ષથી અંતર = $(1, 0, 0)$ નું $(1, 2, 3)$ થી અંતર = $|3\hat{i} - 2\hat{j}| = \sqrt{13}$

(8) $6\sqrt{3}$ માનવાળો સદિશ અક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવે, તો તે સદિશ

- (A) $\sqrt{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ (B) $-6(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ (C) $2\sqrt{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ (D) $-2\sqrt{3}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

ઉકેલ : સદિશ $\vec{r}$ એ અક્ષો સાથે સમાન ખૂણા બનાવે છે. તેની દિક્કોસાઈન l, m, n લેતાં $l = m = n$ અને $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

$$\therefore 3l^2 = 1. \text{ આથી, } l = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$|\vec{r}| = 6\sqrt{3} \text{ હોવાથી, } \vec{r} = |\vec{r}|(l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}) = \pm 6(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

જવાબ : (B)

(9) રેખાઓ $\frac{x-6}{1} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-17}{-3}$ અને $\frac{x-4}{-2} = \frac{y+5}{1} = \frac{z+3}{2}$ ને લંબરેખાના દિક્ષુણોત્તર છે.

- (A) 7, -4, -5 (B) -7, 4, 5 (C) 7, 4, 5 (D) 7, -4, 5

ઉકેલ : ધારો કે આપેલ રેખાઓને લંબરેખાના દિક્ષુણોત્તર a, b, c છે.

હવે a, b, c દિક્ષુણોત્તર વાળી રેખા $\frac{x-6}{1} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-17}{-3}$ ને લંબ છે.

$$\therefore a + 2b - 3c = 0. \text{ તે જ પ્રમાણે } -2a + b + 2c = 0$$

$$\therefore \frac{a}{4+3} = \frac{b}{-2+6} = \frac{c}{1+4}$$

$\therefore$ દિક્ષુણોત્તર 7, 4, 5.

બીજી રીત :

$$\text{મિંગેલ દિશા} = (1, 2, -3) \times (-2, 1, 2) = (7, 4, 5)$$

જવાબ : (C)

(10) રેખાઓ $\vec{r} = (4\hat{j} - \hat{k}) + t(-3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}), t \in R$ અને $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) + s(2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}), s \in R$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

$$\text{ઉકેલ : } \vec{l} = (-3, 2, 1), \vec{m} = (2, 1, -3)$$


$$\text{હવે, } \cos \theta = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{m}|}{|\vec{l}| |\vec{m}|} = \frac{|-6 + 2 - 3|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3}.$$

જવાબ : (A)

(11) a લંબાઈની બાજુવાળા સમઘનના બે વિકર્ણો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

- (A) $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\cos^{-1} \frac{1}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{3}$



ઉકેલ : સમઘનને ચાર વિકર્ણો છે : $\overline{OP}, \overline{AL}, \overline{BM}$ અને $\overline{CN}$.

$$\overrightarrow{OP} \text{ માટે } \vec{l} = (a, a, a) \text{ આથી, } \hat{l} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

અને $\vec{AL}$ માટે $\vec{m} = (-a, a, a)$ અથવા, $\hat{m} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$$\begin{aligned}\cos(\vec{OP}, \vec{AL}) &= |\hat{l} \cdot \hat{m}| \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right| \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\therefore (\vec{OP}, \vec{AL}) = \cos^{-1} \frac{1}{3}.$$

તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ બે વિકર્ણો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ $\cos^{-1} \frac{1}{3}$ થાય.

જવાબ : (B)

(12) $A(1, 3, 2)$ અને $B(3, 9, 5)$ માંથી પસાર થતી રેખા પર $\overline{AB}$ ના મધ્યબિંદુથી 7 એકમના અંતરે આવેલું બિંદુ છે.

- (A) $(4, 12, 13)$ (B) $(0, 0, \frac{1}{2})$ (C) $(4, 12, \frac{13}{4})$ (D) $(0, 0, \frac{1}{4})$

ઉકેલ : $\overleftrightarrow{AB}$ નું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$

$$\therefore \vec{r} = (1, 3, 2) + k(2, 6, 3), \quad k \in R$$

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} \text{ પરનું કોઈ પણ બિંદુ } P(1+2k, 3+6k, 2+3k) \text{ છે.}$$

બિંદુ P નું $\overline{AB}$ ના મધ્યબિંદુ $M(2, 6, \frac{7}{2})$ થી અંતર 7 છે.

$$\therefore PM = 7. \quad \text{અથવા, } PM^2 = 49$$

$$\therefore (2k+1-2)^2 + (6k+3-6)^2 + \left(3k+2-\frac{7}{2}\right)^2 = 49$$

$$\therefore (2k-1)^2 + (6k-3)^2 + \left(3k-\frac{3}{2}\right)^2 = 49$$

$$\therefore (2k-1)^2 \left(1+9+\frac{9}{4}\right) = 49$$

$$\therefore (2k-1)^2 = 4$$

$$\therefore 2k-1 = 2 \quad \text{અથવા} \quad 2k-1 = -2$$

$$\therefore k = \frac{3}{2} \quad \text{અથવા} \quad k = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{રેખા પરનાં બિંદુ } \left(4, 12, \frac{13}{2}\right) \text{ અને } \left(0, 0, \frac{1}{2}\right) \text{ છે.}$$

જવાબ : (B)

(13) $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{2}$ અને $\frac{x-4}{4} = \frac{y-5}{5} = \frac{z-2}{3}$ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર શોધો.

- (A) $\sqrt{6}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ (D) 6

ઉકેલ : $\vec{a} = (2, 3, 1)$, $\vec{l} = (3, 4, 2)$, $\vec{b} = (4, 5, 2)$, $\vec{m} = (4, 5, 3)$

$$\vec{b} - \vec{a} = (2, 2, 1) \quad \vec{l} \times \vec{m} = (2, -1, -1)$$

$$\therefore \text{લઘુત્તમ અંતર} = \frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m})|}{|\vec{l} \times \vec{m}|}$$

$$= \frac{|2(2) + 2(-1) + 1(-1)|}{\sqrt{6}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}}$$

જવાબ : (C)

(14) રેખાઓ $\vec{r} = (2, -5, 1) + k(3, 2, 6)$, $k \in R$ અને $\frac{x-7}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+6}{2}$ છે.

(A) છેદક રેખાઓ

(B) સમાંતર રેખાઓ

(C) સંપાતી રેખાઓ

(D) વિષમતલીય રેખાઓ

ઉકેલ : $\vec{a} = (2, -5, 1)$, $\vec{l} = (3, 2, 6)$ અને $\vec{b} = (7, 0, -6)$, $\vec{m} = (1, 2, 2)$.

$$\vec{l} \times \vec{m} = (-8, 0, 4) \neq \vec{0}$$

$\therefore$ આપેલ રેખાઓ સમાંતર કે સંપાતી રેખાઓ નથી.

$$\text{હવે } (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = (5, 5, -7) \cdot (-8, 0, 4) = -40 - 28 \neq 0$$

$\therefore$ આપેલ રેખાઓ વિષમતલીય રેખાઓ છે.

જવાબ : (D)

(15) $(4, 1, 2)$ અને $(5, y, 0)$ માંથી પસાર થતી રેખા એ $(2, 1, 1)$ અને $(3, 3, z)$ માંથી પસાર થતી રેખાને સમાંતર

હોય, તો $(y, z) = \dots\dots$

(A) $(-1, 3)$

(B) $(3, -1)$

(C) $(-3, 1)$

(D) $(-3, -1)$

ઉકેલ : આપેલી રેખાઓના દિક્ષુણોત્તર $1, y-1, -2$ અને $1, 2, z-1$ છે.

રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર છે.

$$\therefore \frac{1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{-2}{z-1}$$

$$\therefore y = 3 \text{ અને } z = -1$$

જવાબ : (B)


(16) બિંદુ $(4, 8, 1)$ નો બિંદુઓ $(-1, -3, 2)$ અને $(3, -1, 0)$ ને જોડતી રેખા પરનો લંબપાદ

(A) $(\frac{19}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-5}{3})$

(B) $(\frac{19}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3})$

(C) $(\frac{19}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{3})$

(D) $(\frac{19}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{-5}{3})$



આકૃતિ 21.2

ઉકેલ : $A(-1, -3, 2)$ અને $B(3, -1, 0)$ માંથી પસાર થતી રેખા $\overleftrightarrow{AB}$ નું સમીકરણ,

$$\vec{r} = (-1, -3, 2) + k'(4, 2, -2), \quad k' \in R$$

$$\therefore \vec{r} = (-1, -3, 2) + k(2, 1, -1), \quad k = 2k' \in R$$

ધારો કે $\overleftrightarrow{AB}$ પરનું બિંદુ $M(-1+2k, -3+k, 2-k)$ એ $P(4, 8, 1)$ માંથી $\overleftrightarrow{AB}$ પરનો લંબપાદ છે.

$$\text{હવે } \overleftrightarrow{PM} \perp \vec{l}. \text{ આથી } \overleftrightarrow{PM} \cdot \vec{l} = 0$$

$$\therefore (2k-5, k-11, -k+1) \cdot (2, 1, -1) = 0$$

$$\therefore 4k-10+k-11+k-1=0$$

$$\therefore 6k=22 \text{ આથી } k=\frac{11}{3}$$

$$\therefore \text{લંબપાદ } M\left(\frac{19}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-5}{3}\right)$$

જવાબ : (A)

(17) નીચે આપેલાં બિંદુઓમાંથી બિંદુ, રેખા $\vec{r} = (2, 0, -1) + k(2, 1, -3), k \in R$ પર આવેલું નથી.

- (A) $(6, 2, -7)$ (B) $(2, 0, -1)$ (C) $(-2, 1, 3)$ (D) $(4, 1, -4)$

ઉકેલ : રેખાનું સમીકરણ $\vec{r} = (2, 0, -1) + k(2, 1, -3), k \in R$

બિંદુ $(6, 2, -7)$ માટે $(6, 2, -7) = (2+2k, k, -1-3k)$ હોય, તો

$$\therefore 6=2+2k, \quad k=2, \quad -1-3k=-7$$

$k=2$ બાકીનાં બંને સમીકરણોનું સમાધાન કરે છે.

$\therefore (6, 2, -7)$ રેખા પર આવેલું છે.

$(2, 0, -1)$ રેખા પરનું બિંદુ છે જ.

હવે $(-2, 1, 3)$ માટે $(-2, 1, 3) = (2+2k, k, -1-3k)$ લેતાં,

$$\therefore -2=2+2k, \quad 1=k, \quad 3=-1-3k$$

$k=1$ બાકીનાં બંને સમીકરણોનું સમાધાન કરતું નથી.

$\therefore (-2, 1, 3)$ રેખા પર આવેલું નથી.

$(4, 1, -4)$ માટે પણ $k=1$ આથી $(4, 1, -4)$ રેખા પર છે.

જવાબ : (C)

(18) રેખાઓ $x = ay + b$, $z = cy + d$ અને $x = a'y + b'$, $z = c'y + d'$ પરસ્પર લંબ હોય, તો અને તો જ

(A) $aa' + bb' + cc' = 0$

(B) $(a + a')(b + b')(c + c') = 0$

(C) $aa' + cc' + 1 = 0$

(D) $aa' + bb' + cc' + 1 = 0$ (AIEEE:2003)

ઉકેલ : $x = ay + b$ અને $z = cy + d$ તથા $x = a'y + b'$, $z = c'y + d'$

$$\therefore \frac{x-b}{a} = y \text{ અને } y = \frac{z-d}{c}$$

$$\therefore \frac{x-b}{a} = \frac{y}{1} = \frac{z-d}{c} \quad \text{તે જ રીતે } \frac{x-b'}{a'} = \frac{y}{1} = \frac{z-d'}{c'}$$

$$\therefore \vec{l} = (a, 1, c) \text{ તથા } \vec{m} = (a', 1, c')$$

$$\text{બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ છે.} \Leftrightarrow \vec{l} \cdot \vec{m} = 0 \Leftrightarrow aa' + 1 + cc' = 0$$

જવાબ : (C)

(19) રેખાઓ $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{-k}$ અને $\frac{x-1}{k} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-5}{1}$ સમતલીય હોય, તો

(A) $k = 1$ અથવા -1

(B) $k = 0$ અથવા -3

(C) $k = 3$ અથવા -3

(D) $k = 0$ અથવા -1

(AIEEE : 2003)

ઉકેલ : $\vec{a} = (2, 3, 4)$, $\vec{l} = (1, 1, -k)$ તથા $\vec{b} = (1, 4, 5)$, $\vec{m} = (k, 2, 1)$

રેખાઓ સમતલીય છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -k \\ k & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -1(1+2k) - 1(1+k^2) + 1(2-k) = 0$$

$$\therefore -1 - 2k - 1 - k^2 + 2 - k = 0$$

$$\therefore k^2 + 3k = 0$$

$$\therefore k(k+3) = 0$$

$$\therefore k = 0 \text{ અથવા } -3$$

જવાબ : (B)

(20) જો કોઈ સમઘનની ત્રણ ધારો એ અવકાશના ત્રણ અક્ષો હોય, તો ઊગમબિંદુ અને તેની વિરુદ્ધ બાજુના ખૂણા પર આવેલા બિંદુને જોડતા વિકર્ણના દિગ્ગુણોત્તર થાય.

(A) $\langle 2, -2, 2 \rangle$

(B) $\left\langle -\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right\rangle$

(C) $\langle 1, 1, 1 \rangle$

(D) $\langle 3, 2, 1 \rangle$

ઉકેલ : ધારો કે a લંબાઈની બાજુવાળા સમઘનની ધારો $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ એ અનુક્રમે X -અક્ષ Y -અક્ષ અને Z -અક્ષ છે.

એક શિરોબિંદુ ઊગમબિંદુ $(0, 0, 0)$ અને બીજું શિરોબિંદુ $P(a, a, a)$ થશે.

વિકર્ણ $\vec{OP}$ ને સમાવતા સદિશ $\vec{OP}$ ના દિક્ષુણોત્તર $\langle a-0, a-0, a-0 \rangle$ એટલે કે $\langle 1, 1, 1 \rangle$ થશે.

જવાબ : (C)

(21) બિંદુઓ $A(2, 1, -2)$ અને $B(3, -4, -1)$ ને જોડતા રેખાખંડના રેખા $\frac{x-4}{3} = \frac{y+9}{2} = \frac{z-1}{-6}$ પરના પ્રક્ષેપનું માન

(A) $\frac{26}{7}$

(B) $\frac{19}{7}$

(C) $\frac{16}{7}$

(D) $\frac{13}{7}$

ઉકેલ : $\vec{AB}$ ના રેખા $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{l}$, $k \in R$ પરના પ્રક્ષેપનું માન

$= \left| (x_2 - x_1)l + (y_2 - y_1)m + (z_2 - z_1)n \right|$ જ્યાં l, m, n એ રેખાના સદિશ $\vec{l}$ ની દિક્ષકોસાઈન છે.

$\vec{AB}$ માટે

$x_2 - x_1 = 1$, $y_2 - y_1 = -5$, $z_2 - z_1 = 1$ અને રેખાની દિક્ષકોસાઈન $l = \frac{3}{7}$, $m = \frac{2}{7}$, $n = \frac{-6}{7}$.

$$\therefore \text{પ્રક્ષેપનું માન} = \left| (1)\left(\frac{3}{7}\right) + (-5)\left(\frac{2}{7}\right) + (1)\left(\frac{-6}{7}\right) \right|$$

$$= \frac{1}{7} |3 - 10 - 6|$$

$$= \frac{13}{7}$$

જવાબ : (D)

(22) ઊગમબિંદુથી રેખા $\{(4+3k, 2+4k, 4-5k) \mid k \in R\}$ નું લંબઅંતર

(A) 2

(B) 6

(C) $5\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{5}$

ઉકેલ : ઊગમબિંદુ $O(0, 0, 0)$ અને રેખા $\vec{r} = (4, 2, 4) + k(3, 4, -5)$, $k \in R$ આપેલ છે.

$$\therefore A(\vec{a}) = (4, 2, 4) \text{ અને } \vec{l} = (3, 4, -5)$$

$$\text{લંબ અંતર} = |\vec{OA} \times \hat{l}|$$

$$= \frac{30\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = 6$$

જવાબ : (B)

(23) જો રેખાઓ $x = -1 + s$, $y = 3 - \lambda s$, $z = 1 + \lambda s$ અને $x = \frac{t}{2}$, $y = 1 + t$, $z = 2 - t$, (s, t પ્રચલ છે.) સમતલીય હોય, તો $\lambda = \dots\dots$

- (A) -2 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) 0 (AIEEE : 2004)

ઉકેલ : રેખાઓનાં કાર્તેઝીય સમીકરણ,

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-\lambda} = \frac{z-1}{\lambda} \text{ અને } \frac{x}{\frac{1}{2}} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$$

$$\therefore \vec{a} = (-1, 3, 1), \vec{l} = (1, -\lambda, \lambda) \text{ અને } \vec{b} = (0, 1, 2), \vec{m} = \left(\frac{1}{2}, 1, -1\right)$$

રેખાઓ સમતલીય છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -\lambda & \lambda \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore 1(\lambda - \lambda) + 2\left(-1 - \frac{\lambda}{2}\right) + 1\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) = 0$$

$$\therefore -2 - \lambda + 1 + \frac{\lambda}{2} = 0$$

$$\therefore \lambda = -2$$

જવાબ : (A)

(24) રેખાઓ $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{4}$ અને $\frac{x-3}{1} = \frac{y-k}{2} = \frac{z}{1}$ એકબીજીને છેદે, તો $k = \dots\dots$

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{9}{2}$ (C) $\frac{-2}{9}$ (D) $\frac{-3}{2}$ (IIT : 2004)

ઉકેલ : રેખાઓ $\vec{r} = (1, -1, 1) + \lambda(2, 3, 4)$, $\lambda \in R$ અને $\vec{r} = (3, k, 0) + \lambda(1, 2, 1)$, $\lambda \in R$ માટે

$$\vec{a} = (1, -1, 1), \vec{l} = (2, 3, 4) \text{ અને } \vec{b} = (3, k, 0), \vec{m} = (1, 2, 1).$$

આપેલ રેખાઓ છેદક રેખાઓ છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} 2 & k+1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore 2(-5) - (k+1)(-2) - 1(1) = 0$$

$$\therefore -10 + 2k + 2 - 1 = 0$$

$$\therefore k = \frac{9}{2} \quad \vec{l} \times \vec{m} \neq \vec{0} \text{ આથી } k = \frac{9}{2} \text{ માટે તે છેદક રેખાઓ છે.}$$

જવાબ : (B)

નોંધ : $(1, -1, 1)$ બીજી રેખા પર નથી તે સ્પષ્ટ છે. આથી રેખાઓ સમાંતર નથી.

(25) રેખાઓ $2x = 3y = -z$ અને $6x = -y = -4z$ વચ્ચેની ખૂણાનું માપ

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) 0 (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{4}$ (AIEEE: 2005)

ઉકેલ : રેખાઓ $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-6}$ અને $\frac{x}{2} = \frac{y}{-12} = \frac{z}{-3}$ માટે,

$$\vec{l} = (3, 2, -6); \vec{m} = (2, -12, -3)$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{m}|}{|\vec{l}| |\vec{m}|}$$

$$= \frac{|6 - 24 + 18|}{\sqrt{9 + 4 + 36} \cdot \sqrt{4 + 144 + 9}} = 0$$

$$\therefore \vec{l} \perp \vec{m}$$

$\therefore$ રેખાઓ પરસ્પર લંબ છે.

$\therefore$ તેમની વચ્ચેની ખૂણાનું માપ $\frac{\pi}{2}$.

જવાબ : (A)

(26) A(1, 1, 1) માંથી પસાર થતી B(1, 4, 6) અને C(5, 4, 4) માંથી પસાર થતી $\overleftrightarrow{BC}$ ને લંબ રેખાનું સમીકરણ

- (A) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{4}$ (B) $\frac{x-1}{3} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{5}$
 (C) $\frac{x-5}{3} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-4}{5}$ (D) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{4}$

ઉકેલ : $\overleftrightarrow{BC}$ નું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k(\vec{b} - \vec{a}), k \in R = (1, 4, 6) + k(4, 0 - 2) k \in R$

ધારો કે બિંદુ A માંથી $\overleftrightarrow{BC}$ પરનો લંબપાદ M(1+4k, 4, 6-2k) છે.

$$\therefore \vec{AM} \perp \vec{l}$$

$$\therefore (4k, 3, 5-2k) \cdot (4, 0, -2) = 0$$

$$\therefore 16k - 10 + 4k = 0$$

$$\therefore k = \frac{1}{2}$$

$$\vec{AM} = (4k, 3, 5-2k) = (2, 3, 4)$$

$$\therefore \text{માંગેલ લંબરેખાનું સમીકરણ } \vec{r} = (1, 1, 1) + k(\vec{AM}), k \in R$$

$$\therefore \vec{r} = (1, 1, 1) + k(2, 3, 4), k \in R$$

$$\therefore \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{4}$$

નોંધ : $\overleftrightarrow{BC} = (4, 0, -2)$ જે આપેલ વિકલ્પોમાં માત્ર (A)માં આપેલી રેખાને જ લંબ છે.

જવાબ : (A)

- (27) જો $\vec{AB}$ ની $\vec{OX}$, $\vec{OY}$ અને $\vec{OZ}$ પરના પ્રક્ષેપ અનુક્રમે 3, 4 અને 12 હોય તો $|\vec{AB}| = \dots$
- (A) 169 (B) 144 (C) 19 (D) 13

ઉકેલ : $\vec{AB} = x_1 \hat{i} + x_2 \hat{j} + x_3 \hat{k}$ હોય, તો $\vec{AB}$ નો $\vec{OX}$ પરનો પ્રક્ષેપ $= \vec{AB} \cdot \hat{i}$.

$$\therefore x_1 = 3 \text{ . તે જ પ્રમાણે } x_2 = 4, x_3 = 12$$

$$\therefore |\vec{AB}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = 13$$

જવાબ : (D)

- (28) જો બે રેખાઓના દિક્ગુણોત્તર $3lm - 4ln + mn = 0$ અને $l + 2m + 3n = 0$ નું સમાધાન કરે, તો તે બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

ઉકેલ : $l = -2m - 3n$ પરથી મળતું l નું મૂલ્ય $3lm - 4ln + mn = 0$ માં મૂકતાં,

$$3m(-2m - 3n) - 4(-2m - 3n)n + mn = 0$$

$$\therefore -6m^2 - 9mn + 8mn + 12n^2 + mn = 0$$

$$\therefore m^2 = 2n^2$$

$$\therefore m = \pm\sqrt{2}n$$

$$\text{હવે } m = \sqrt{2}n \text{ લેતાં } l = -2\sqrt{2}n - 3n \text{ અને } m = -\sqrt{2}n \text{ લેતાં } l = 2\sqrt{2}n - 3n$$

$$\therefore \text{બંને રેખાઓના દિક્ગુણોત્તર, } -2\sqrt{2}-3, \sqrt{2}, 1 \text{ અને } 2\sqrt{2}-3, -\sqrt{2}, 1$$

ધારો કે બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું માપ θ છે.

$$(-2\sqrt{2}-3, \sqrt{2}, 1) \cdot (2\sqrt{2}-3, -\sqrt{2}, 1) = -(8-9) - 2 + 1 = 0$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

જવાબ : (A)

- (29) રેખાઓ $\vec{r} = (1, -1, 0) + k(2, 0, 1)$, $k \in R$ અને $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-a}{-1}$ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર $\frac{1}{\sqrt{14}}$

હોય, તો $a = \dots$

- (A) 0 અથવા -1 (B) 0 અથવા 1 (C) 1 અથવા -1 (D) 2 અથવા -2

ઉકેલ : $\vec{r} = (1, -1, 0) + k(2, 0, 1)$, $k \in R$ અને $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-a}{-1}$ માટે,

$$\vec{a} = (1, -1, 0), \vec{l} = (2, 0, 1) \text{ અને } \vec{b} = (2, -1, a), \vec{m} = (1, 1, -1)$$

$$\vec{l} \times \vec{m} = (2, 0, 1) \times (1, 1, -1) = (-1, 3, 2) \text{ આથી } |\vec{l} \times \vec{m}| = \sqrt{14}$$

$$(\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m}) = (1, 0, a) \cdot (-1, 3, 2) = -1 + 2a$$

$$\text{હવે લઘુત્તમ અંતર} = \frac{|(\vec{b}-\vec{a}) \cdot (\vec{l} \times \vec{m})|}{|\vec{l} \times \vec{m}|} = \frac{|2a-1|}{\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

$$\therefore 2a-1=1 \text{ અથવા } 2a-1=-1$$

$$\therefore a=1 \text{ અથવા } a=0$$

જવાબ : (B)

(30) જો રેખા X -અક્ષ અને Y -અક્ષની ધન દિશા સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો ખૂણો બનાવે, તો Z -અક્ષની ધન દિશા સાથે માપનો ખૂણો બનાવશે.

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{6}$ (AIEEE : 2007)

ઉકેલ : જો રેખાના દિક્ખૂણાઓ α, β, γ હોય, તો $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

$$\therefore \cos^2\frac{\pi}{4} + \cos^2\frac{\pi}{4} + \cos^2\gamma = 1$$

$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cos^2\gamma = 1$$

$$\therefore \cos^2\gamma = 0. \text{ અર્થાત્, } \cos\gamma = 0$$

$$\therefore \gamma = \frac{\pi}{2}$$

જવાબ : (C)

(31) રેખાઓ $\frac{x-1}{k} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ અને $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{k} = \frac{z-1}{2}$ છેદક રેખાઓ હોય, તો k નું પૂર્ણાંક મૂલ્ય

(A) -2 (B) -5 (C) 5 (D) 2 (AIEEE : 2008)

ઉકેલ : રેખાઓ $\frac{x-1}{k} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ અને $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{k} = \frac{z-1}{2}$ માટે

$$\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{l} = (k, 2, 3) \text{ અને } \vec{b} = (2, 3, 1), \vec{m} = (3, k, 2)$$

આપેલ રેખાઓ છેદક રેખાઓ છે અને તેથી તે સમતલીય છે.

$$\therefore \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ k & 2 & 3 \\ 3 & k & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore 1(4-3k) - 1(2k-9) - 2(k^2-6) = 0$$

$$\therefore 2k^2 + 5k - 25 = 0$$

$$\therefore (2k-5)(k+5) = 0$$

$$\therefore k = \frac{5}{2} \text{ અથવા } k = -5$$

$$\therefore k \text{ નું પૂર્ણાંક મૂલ્ય } -5. \text{ અર્થાત્, } (-5, 2, 3) \times (3, -5, 2) \neq \vec{0}$$

જવાબ : (B)

નોંધ : $\vec{l} \times \vec{m} \neq \vec{0}$ રેખાઓ સંપાતી કે સમાંતર નથી.

- (32) ત્રિપરિમાણીય અવકાશની એક રેખા $\overleftrightarrow{AB}$ એ X -અક્ષ અને Y -અક્ષની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે $\frac{\pi}{4}$ અને $\frac{2\pi}{3}$ માપના ખૂણા બનાવે છે. જો $\overleftrightarrow{AB}$ એ Z -અક્ષની ધન દિશા સાથે લઘુકોણ θ બનાવે, તો $\theta = \dots$

(AIEEE: 2010)

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{12}$

ઉકેલ : $\overleftrightarrow{AB}$ ના દિક્ખૂણાઓ α, β, γ હોય, તો $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

$$\therefore \cos^2\frac{\pi}{4} + \cos^2\frac{2\pi}{3} + \cos^2\theta = 1$$

$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cos^2\theta = 1$$

$$\therefore \cos^2\theta = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{1}{2} \quad (\theta \text{ લઘુકોણ છે.})$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

જવાબ : (C)

- (33) બિંદુ $P(3, -1, 11)$ થી $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ રેખા પર દોરેલ લંબની લંબાઈ

- (A) $\sqrt{29}$ (B) $\sqrt{33}$ (C) $\sqrt{53}$ (D) $\sqrt{65}$ (AIEEE : 2011)

ઉકેલ : $\overrightarrow{PA} = (0, 2, 3) - (3, -1, 11) = (-3, 3, -8)$ (A = (0, 2, 3))

બિંદુ $P(3, -1, 11)$ થી રેખા $\vec{r} = (0, 2, 3) + k(2, 3, 4)$, $k \in R$ નું લંબઅંતર

$$= \frac{|\overrightarrow{PA} \times \vec{l}|}{|\vec{l}|}$$

$$= \frac{|(-3, 3, -8) \times (2, 3, 4)|}{\sqrt{4+9+16}}$$

$$= \frac{|(36, -4, -15)|}{\sqrt{29}} = \frac{\sqrt{1296+16+225}}{\sqrt{29}} = \frac{\sqrt{1537}}{\sqrt{29}} = \sqrt{53}$$

જવાબ : (C)

- (34) $l+m+n=0$, $l^2+m^2-n^2=0$ અને l, m, n એ બે રેખાઓની દિક્કોસાઈન હોય, તો તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

ઉકેલ : l, m, n રેખાઓની દિક્કોસાઈન છે.

$$\therefore l^2 + m^2 + n^2 = 1 \text{ તથા } l^2 + m^2 = n^2 \text{ (આપેલ છે.)}$$

$$\therefore 2n^2 = 1. \text{ આથી } n = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

હવે, $l + m + n = 0$ પરથી $n = -l - m$ નું મૂલ્ય $l^2 + m^2 - n^2 = 0$ માં મૂકતાં,

$$l^2 + m^2 - (l + m)^2 = 0$$

$$\therefore -2lm = 0$$

$$\therefore l = 0 \text{ અથવા } m = 0$$

જ્યારે $l = 0$ તો $m + n = 0$. આથી, $m = -n = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\therefore \text{ એક રેખાની દિશ્કોસાઈન } 0, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

અને જ્યારે $m = 0$ તો $l + n = 0$. આથી, $l = -n = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\therefore \text{ બીજી રેખાની દિશ્કોસાઈન } \mp \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

આ બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણાનું માપ θ લેતાં,

$$\cos \theta = \left| (0) \left(\mp \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\mp \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (0) + \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right| = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

જવાબ : (C)

(35) ત્રિન્ન બિંદુઓ $(x, 0, 0)$, $(0, y, 0)$, $(0, 0, z)$ અને $(0, 0, 0)$ થી સમાન અંતરે આવેલું બિંદુ

$$(A) (x, y, z) \quad (B) \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2} \right) \quad (C) \left(\frac{x}{3}, \frac{y}{3}, \frac{z}{3} \right) \quad (D) (3x, 3y, 3z)$$

ઉકેલ : ધારો કે $P(a, b, c)$ આપેલાં બિંદુઓથી સમાન અંતરે આવેલું છે.

$$\therefore A(x, 0, 0), B(0, y, 0), C(0, 0, z), O(0, 0, 0) \text{ લેતાં,}$$

$$PA^2 = PO^2$$

$$\therefore (x-a)^2 + b^2 + c^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\therefore x^2 - 2ax = 0$$

$$\therefore a = \frac{x}{2}$$

(બિંદુઓ ત્રિન્ન હોવાથી $x \neq 0$)

તે જ પ્રમાણે, $PB^2 = PO^2$ અને $PC^2 = PO^2$ લેતાં, $b = \frac{y}{2}$ અને $c = \frac{z}{2}$

$$\therefore \text{ માંગેલ બિંદુ } \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2} \right).$$

જવાબ : (B)

- (36) જો રેખા X -અક્ષ, Y -અક્ષ અને Z -અક્ષની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે α, β, γ માપના ખૂણાઓ બનાવે, તો $\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = \dots$

(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2

ઉકેલ : અહીં, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

$$\text{હવે, } \cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = 2\cos^2 \alpha - 1 + 2\cos^2 \beta - 1 + 2\cos^2 \gamma - 1$$

$$= 2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) - 3$$

$$= 2(1) - 3 = -1$$

જવાબ : (A)

- (37) $(4, 2, 3)$ માંથી પસાર થતી અને રેખા $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+10}{8}$ ને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ -

(A) $\frac{x-4}{4} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+10}{3}$

(B) $\frac{x-4}{-4} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{10}$

(C) $\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{8}$

(D) $\frac{x-4}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$

ઉકેલ : આપેલ રેખાની દિશામાં સદિશ $\vec{l} = (2, -3, 8) =$ આપેલ રેખાને સમાંતર રેખાનો સદિશ.


$\therefore (4, 2, 3)$ માંથી પસાર થતી અને $\vec{l} = (2, -3, 8)$ દિશાવાળી રેખાનું સમીકરણ

$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{8}.$$

જવાબ : (C)

- (38) રેખા $\frac{x+4}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-1}{2}$ ને સાપેક્ષ બિંદુ $(3, 0, 2)$ નું પ્રતિબિંબ

(A) $(-1, 2, 3)$ (B) $(-3, 0, -2)$ (C) $(-4, 2, 1)$ (D) $(-5, 4, 4)$



આકૃતિ 21.3

ઉકેલ : રેખા $\vec{r} = (-4, -3, 1) + k(3, 5, 2), k \in R$ પરનું કોઈ પણ બિંદુ

$N(-4+3k, -3+5k, 1+2k)$ ને $P(3, 0, 2)$ માંથી રેખા પરનો લંબપાદ N લેતાં,

$$\vec{PN} \perp \vec{l}$$

$$\therefore (3k-4-3, 5k-3-0, 2k+1-2) \cdot (3, 5, 2) = 0$$

$$\therefore 9k-21+25k-15+4k-2=0$$

$$\therefore 38k-38=0$$

$$\therefore k=1$$

$$\therefore \text{લંબપાદ } N(-1, 2, 3)$$

P નું આપેલ રેખાને સાપેક્ષ પ્રતિબિંબ Q લેતાં N એ $\overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ થશે.

$$Q(a, b, c) \text{ લેતાં } (-1, 2, 3) = \left(\frac{a+3}{2}, \frac{b+0}{2}, \frac{c+2}{2} \right)$$

$$\therefore Q(-5, 4, 4)$$

જવાબ : (D)

$$(39) \text{ રેખાઓ } \frac{x+2}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z-5}{3} \text{ અને } \vec{r} = (6, 3, -3) + k(4, 2, -3), k \in R \text{ થી સદિશ}$$

$-5\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k}$ ની દિશાવાળી રેખા પર જે રેખાખંડ કપાય તેની લંબાઈ

$$(A) \sqrt{86}$$

$$(B) 12$$

$$(C) \sqrt{78}$$

$$(D) \sqrt{131}$$

$$\text{ઉકેલ : ધારો કે } -5\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k} \text{ દિશાવાળી રેખા એ } \frac{x+2}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z-5}{3}$$

$$\text{એટલે કે } \vec{r} = (-2, 7, 5) + k(1, -1, 3), k \in R \text{ ને બિંદુ } P(-2+k_1, 7-k_1, 5+3k_1)$$

$$\text{અને રેખા } \vec{r} = (6, 3, -3) + k(4, 2, -3), k \in R \text{ ને બિંદુ } Q(6+4k_2, 3+2k_2, -3-3k_2) \text{ માં છે.}$$

$$\vec{PQ} = (8+4k_2-k_1, -4+2k_2+k_1, -8-3k_2-3k_1)$$

$$\text{પરંતુ } \vec{PQ} \text{ ની દિશા } (-5, 7, 2) \text{ છે.}$$

$$\therefore \frac{8+4k_2-k_1}{-5} = \frac{-4+2k_2+k_1}{7} = \frac{-8-3k_2-3k_1}{2}$$

$$\therefore \frac{8+4k_2-k_1}{-5} = \frac{-4+2k_2+k_1}{7}$$

$$\therefore 38k_2-2k_1=-36 \quad (1)$$

$$\text{અને } \frac{-4+2k_2+k_1}{7} = \frac{-8-3k_2-3k_1}{2}$$

$$\therefore 25k_2+23k_1=-48 \quad (2)$$

સમીકરણ (1) અને (2)ને ઉકેલીએ.

$$874k_2 - 46k_1 = -828 \text{ અને } 50k_2 + 46k_1 = -96$$

$$\therefore 924k_2 = -924 \text{ આથી } k_2 = -1 \text{ અને } k_1 = -1$$

$$\therefore P(-3, 8, 2) \text{ અને } Q(2, 1, 0)$$

આપેલ બે રેખાથી $\overleftrightarrow{PQ}$ પર $\overline{PQ}$ કપાય છે.

$$\therefore PQ = \sqrt{(2+3)^2 + (1-8)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{25 + 49 + 4} = \sqrt{78} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

$$(40) \text{ રેખાઓ } \vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k} + \lambda(-2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}), \lambda \in R \text{ અને}$$

$$\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k} + \mu(-2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}), \mu \in R \text{ વચ્ચેનું અંતર } \dots\dots$$

$$(A) \quad 3\sqrt{14} \quad (B) \quad \sqrt{21} \quad (C) \quad 3\sqrt{2} \quad (D) \quad 0$$

ઉકેલ : આપેલ રેખાઓ માટે $\vec{a} = (2, -3, 4)$, $\vec{l} = (1, -2, 1)$ અને $\vec{b} = (3, 4, -1)$, $\vec{m} = (-2, 4, -2)$.

$$\text{અહીં } \vec{l} = k\vec{m}, k = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ આપેલ રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર છે અથવા સંપાતી છે.

$$(2, -3, 4) = (3, 4, -1) + \mu(-2, 4, -2) \Rightarrow (-1, -7, 5) = \mu(2, 4, -2)$$

આ શક્ય નથી. આથી $(2, -3, 4)$ એ બીજી રેખા પર નથી.

$\therefore$ રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર છે.

$$\text{તેમની વચ્ચેનું લંબઅંતર} = |(\vec{b} - \vec{a}) \times \hat{l}|$$

$$= \frac{|(1, 7, -5) \times (1, -2, 1)|}{\sqrt{6}}$$

$$= \frac{|(-3, -6, -9)|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{126}}{\sqrt{6}} = \sqrt{21}$$

જવાબ : (B)

(41) બે રેખાઓની દિક્કોસાઈન સમીકરણો $al + bm + cn = 0$ અને $fmn + gnl + hlm = 0$ નું સમાધાન કરે છે. જો આ રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય, તો ($a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$)

$$(A) \quad \frac{f}{a^2} + \frac{g}{b^2} + \frac{c}{h^2} = 0$$

$$(B) \quad \frac{f}{a} + \frac{g}{b} + \frac{h}{c} = 0$$

$$(C) \quad \frac{a^2}{f} + \frac{b^2}{g} + \frac{c^2}{h} = 0$$

$$(D) \quad \frac{a}{f} + \frac{b}{g} + \frac{c}{h} = 0$$

$$\text{ઉકેલ : } al + bm + cn = 0$$

$$\therefore n = \frac{-al - bm}{c} \text{ નું મૂલ્ય } fmn + gnl + hlm = 0 \text{ માં મૂકતાં,}$$

$$fm \frac{(-al - bm)}{c} + gl \frac{(-al - bm)}{c} + hlm = 0$$

$$\therefore -afm - bfm^2 - agl^2 - bglm + chlm = 0$$

$$-m^2 \text{ વડે ભાગતાં, } af\left(\frac{l}{m}\right) + bf + ag\left(\frac{l}{m}\right)^2 + bg\left(\frac{l}{m}\right) - ch\left(\frac{l}{m}\right) = 0$$

$$\therefore \frac{l}{m} \text{ માં દ્વિઘાત સમીકરણ } ag\left(\frac{l}{m}\right)^2 + (af + bg - ch)\left(\frac{l}{m}\right) + bf = 0 \text{ મળે,}$$

$$\text{તેનાં બે બીજ } \alpha = \frac{l_1}{m_1} \text{ અને } \beta = \frac{l_2}{m_2} \text{ લેતાં, બે બીજનો ગુણકાર } \alpha\beta = \frac{l_1 l_2}{m_1 m_2} = \frac{bf}{ag}$$

$$\therefore \frac{l_1 l_2}{\left(\frac{f}{a}\right)} = \frac{m_1 m_2}{\left(\frac{g}{b}\right)}$$

$$\text{જો } n \text{ ના બદલે } l \text{ અથવા } m \text{ નો લોપ કર્યો હોય, તો } \frac{n_1 n_2}{\left(\frac{h}{c}\right)} = \frac{l_1 l_2}{\left(\frac{f}{a}\right)} = \frac{m_1 m_2}{\left(\frac{g}{b}\right)} \text{ મળે.}$$

રેખાની દિક્કોસાઈન l_1, m_1, n_1 અને l_2, m_2, n_2 લેતાં, રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય, તો

$$l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$$

$$\therefore \frac{f}{a} + \frac{g}{b} + \frac{h}{c} = 0$$

જવાબ : (B)

(42) સમઘનના ચાર વિકર્ણો સાથે કોઈક રેખા α, β, γ અને δ માપના ખૂણા બનાવે, તો


$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma + \sin^2 \delta = \dots\dots$$

(A) $\frac{4}{3}$

(B) $\frac{8}{3}$

(C) 1

(D) 2



આકૃતિ 21.4

ઉકેલ : ધારો કે રેખાની દિક્કોસાઈન l, m, n છે. સમઘનના વિકર્ણો $\overline{OP}, \overline{AL}, \overline{BM}, \overline{CN}$ માટે

$$\vec{OP} = (a, a, a), \vec{AL} = (-a, a, a), \vec{BM} = (a, -a, a) \text{ અને } \vec{CN} = (a, a, -a).$$

∴ $\vec{OP}$ ની દિક્કોસાઈન $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$.

આપેલી રેખા $\leftrightarrow OP$ સાથે α માપનો ખૂણો બનાવે, તો $\cos\alpha = \frac{|l+m+n|}{\sqrt{3}}$

તે જ પ્રમાણે $\cos\beta = \frac{|-l+m+n|}{\sqrt{3}}, \cos\gamma = \frac{|l-m+n|}{\sqrt{3}}$ અને $\cos\delta = \frac{|l+m-n|}{\sqrt{3}}$.

$$\text{હવે } \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma + \cos^2\delta = \frac{4(l^2+m^2+n^2)}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma + \sin^2\delta = 4 - (\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma + \cos^2\delta)$$

$$= 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

જવાબ : (B)

(43) રેખા X -અક્ષ અને Z -અક્ષ સાથે θ માપનો તથા Y -અક્ષ સાથે β માપનો ખૂણો બનાવે છે. જો $\sin^2\beta = 3\sin^2\theta$ હોય, તો $\cos^2\theta = \dots\dots$

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{2}{5}$ (AIEEE:2004)

ઉકેલ : રેખા X -અક્ષ, Y -અક્ષ અને Z -અક્ષ સાથે અનુક્રમે θ, β અને θ માપના ખૂણા બનાવે છે.

$$\therefore \cos^2\theta + \cos^2\beta + \cos^2\theta = 1$$

$$\therefore 2\cos^2\theta + 1 - \sin^2\beta = 1$$

$$\therefore 2\cos^2\theta - 3\sin^2\theta = 0 \quad (\sin^2\beta = 3\sin^2\theta)$$

$$\therefore 2\cos^2\theta - 3(1 - \cos^2\theta) = 0$$

$$\therefore 5\cos^2\theta = 3$$

$$\therefore \cos^2\theta = \frac{3}{5}.$$

જવાબ : (A)

(44) ઊગમબિંદુથી સમતલ પરનો લંબપાદ $(-3, 4, -2)$ હોય, તેવા સમતલનું સમીકરણ $\dots\dots$

(A) $3x - 4y + 2z - 29 = 0$

(B) $3x - 4y + 2z + 29 = 0$

(C) $4x - 2y - 3z + 29 = 0$

(D) $4x - 2y - 3z - 29 = 0$

ઉકેલ : ઊગમબિંદુ $O(0, 0, 0)$ થી સમતલ પરનો લંબપાદ $P(-3, 4, -2)$ છે.

$$\therefore \text{સમતલનો અભિલંબ સદિશ } \vec{n} = \vec{OP} = (-3, 4, -2) = (a, b, c)$$

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

$$\therefore -3(x + 3) + 4(y - 4) - 2(z + 2) = 0$$

$$\therefore -3x - 9 + 4y - 16 - 2z - 4 = 0$$

$$\therefore 3x - 4y + 2z + 29 = 0$$

જવાબ : (B)

(45) રેખા $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$ અને સમતલ $2x-3y-z+7=0$ નું છેદબિંદુ

- (A) $(-3, 1, 2)$ (B) $(2, -3, -1)$ (C) $(2, 1, 2)$ (D) $(-11, -3, -6)$

ઉકેલ : રેખા $\vec{r} = (-3, 1, 2) + k(2, 1, 2)$, $k \in R$ પરનું કોઈ પણ બિંદુ $(-3+2k, 1+k, 2+2k)$ છે.

તે સમતલ $2x-3y-z+7=0$ પર હોય, તો

$$2(-3+2k) - 3(1+k) - (2+2k) + 7 = 0$$

$$-4 = k$$

$$\therefore \text{છેદબિંદુ} = (-11, -3, -6)$$

જવાબ : (D)

(46) $\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ સ્થાન સદિશવાળા બિંદુમાંથી પસાર થતા અને $\vec{r} \cdot (3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k}) = 0$ ને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ

- (A) $3x+4y+4z+26=0$ (B) $3x+5y+4z-26=0$
(C) $x+3y+2z+26=0$ (D) $x+3y+2z-26=0$

ઉકેલ : સમતલ $\vec{r} \cdot (3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k}) = 0$ ને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ

$$\vec{r} \cdot (3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k}) + t = 0$$

તે બિંદુ $(1, 3, 2)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore (1, 3, 2) \cdot (3, 5, 4) + t = 0$$

$$\therefore t = -26$$


$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } \vec{r} \cdot (3\hat{i} + 5\hat{j} + 4\hat{k}) - 26 = 0$$

$$\therefore 3x+5y+4z-26=0$$

જવાબ : (B)

(47) $(4, 1, 3)$ થી સમતલ $x-y-2z-3=0$ પરનો લંબપાદ

- (A) $(6, -1, -1)$ (B) $(1, -1, -2)$ (C) $(-3, -2, -5)$ (D) $(5, 0, 1)$



આકૃતિ 21.5

ઉકેલ : સમતલ $x-y-2z-3=0$ નો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = (1, -1, -2)$ છે.

બિંદુ $A(4, 1, 3)$ થી સમતલ પરનો લંબપાદ N લેતાં,

↔
AN નું સમીકરણ $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{n}$, $k \in R$

$$\therefore \vec{r} = (4, 1, 3) + k(1, -1, -2), k \in R$$

$\therefore$ કોઈક $k \in R$ માટે, $N(4+k, 1-k, 3-2k)$ થશે અને તે સમતલ $x-y-2z-3=0$ પર છે.

$$\therefore 4+k-1+k-6+4k-3=0$$

$$\therefore 6k=6. \text{ આથી } k=1$$

$$\therefore \text{લંબપાદ } N(5, 0, 1) \text{ છે.}$$

જવાબ : (D)

(48) બિંદુ $(2, -1, 3)$ માંથી પસાર થતી સમતલ $5x+4y-7z-1=0$ ને લંબરેખાનું સમીકરણ

(A) $\vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(5\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k}), \lambda \in R$

(B) $\vec{r} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k} + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}), \lambda \in R$

(C) $\vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 5\hat{j} - 10\hat{k}), \lambda \in R$

(D) મળશે નહિ.

ઉકેલ : સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = (5, 4, -7)$ એ સમતલને લંબ રેખાની દિશાનો સદિશ થશે.

રેખા $\vec{a} = (2, -1, 3)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore \text{લંબરેખાનું સમીકરણ } \vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{n}, \lambda \in R$$

$$\therefore \vec{r} = (2, -1, 3) + \lambda(5, 4, -7), \lambda \in R$$

$$\therefore \vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(5\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k}), \lambda \in R$$

જવાબ : (A)

(49) સમતલના અભિલંબ સદિશનું માન $3\sqrt{3}$ છે. સમતલનો અભિલંબ ત્રણેય યામાક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવે છે. જો આ સમતલ બિંદુ $(3, -1, 2)$ માંથી પસાર થતું હોય, તો તેનું સમીકરણ

(A) $\vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 0$

(B) $\vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 6$

(C) $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 4$

(D) $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 0$

ઉકેલ : સમતલનો અભિલંબ સદિશ યામાક્ષો સાથે સમાન ખૂણા બનાવે છે. આથી, $\vec{n} = (l, l, l)$

$$\therefore l^2 + l^2 + l^2 = 1 \text{ આથી, } l = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{હવે, } \left| \vec{n} \right| = 3\sqrt{3} \text{ હોવાથી, } \vec{n} = 3\sqrt{3} \left(\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}} \right) = 3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$$

સમતલનું સમીકરણ,

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n}$$

$$\therefore \vec{r} \cdot (3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}) = (3, -1, 2) \cdot (3, 3, 3)$$

$$\therefore \vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 4$$

જવાબ : (C)

(50) બિંદુઓ $(-2, 4, 7)$ અને $(3, -5, 8)$ ને જોડતા રેખાખંડનું સમતલ $x - 2y + 3z = 15$ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે.

(A) $-2:11$ (B) $2:11$ (C) $17:26$ (D) $1:2$

ઉકેલ : ધારો કે સમતલ $x - 2y + 3z = 15$, $P(-2, 4, 7)$ અને $Q(3, -5, 8)$ ને જોડતા રેખાખંડનું $\lambda:1$ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે.

$\therefore$ વિભાજન કરતું બિંદુ $R\left(\frac{3\lambda-2}{\lambda+1}, \frac{-5\lambda+4}{\lambda+1}, \frac{8\lambda+7}{\lambda+1}\right)$ સમતલ $x - 2y + 3z = 15$ નું બિંદુ છે.

$$\therefore \frac{3\lambda-2}{\lambda+1} - 2\left(\frac{-5\lambda+4}{\lambda+1}\right) + 3\left(\frac{8\lambda+7}{\lambda+1}\right) = 15$$

$$\therefore 3\lambda - 2 + 10\lambda - 8 + 24\lambda + 21 = 15\lambda + 15$$

$$\therefore 22\lambda = 4$$

$$\therefore \lambda = \frac{2}{11}$$

$$\therefore \text{ગુણોત્તર } 2:11$$

જવાબ : (B)

(51) બે સમતલો $2x + y + 2z - 8 = 0$ અને $4x + 2y + 4z + 5 = 0$ વચ્ચેનું અંતર છે.

(A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{9}{2}$

(AIEEE : 2004, JEE : 2013)

ઉકેલ : સમાંતર સમતલો $4x + 2y + 4z - 16 = 0$ અને $4x + 2y + 4z + 5 = 0$ વચ્ચેનું લંબઅંતર

$$= \frac{|d_2 - d_1|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{|5+16|}{\sqrt{16+4+16}} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

જવાબ : (A)

(52) $(1, 0, 0)$ અને $(0, 1, 0)$ માંથી પસાર થતા અને સમતલ $x + y = 3$ સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો ખૂણો બનાવતા સમતલના અભિલંબ સદિશની દિક્સંખ્યાઓ

(A) $1, \sqrt{2}, 1$ (B) $1, 1, \sqrt{2}$ (C) $1, 1, 2$ (D) $\sqrt{2}, 1, 1$

(AIEEE : 2002)

ઉકેલ : ધારો કે સમતલના અભિલંબની દિક્સંખ્યાઓ a, b, c છે.

સમતલ $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) + c(z_2 - z_1) = 0$$

$$\therefore a(0-1) + b(1-0) + c(0-0) = 0$$

$$\therefore -a + b = 0$$

$$\therefore a = b$$

$$\therefore \text{અભિલંબ સદિશ } \vec{n}_1 = (a, a, c).$$

$$\text{તથા સમતલ } x + y = 3 \text{ નો અભિલંબ સદિશ } \vec{n}_2 = (1, 1, 0)$$

$$\text{હવે, } \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

$$\therefore \cos \frac{\pi}{4} = \frac{|a + a|}{\sqrt{2a^2 + c^2} \sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2|a|}{\sqrt{2a^2 + c^2} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\therefore 2a^2 + c^2 = 4a^2$$

$$\therefore c = \pm \sqrt{2} a$$

$$\therefore \text{દિક્સંખ્યાઓ } a, a, \pm \sqrt{2} a \text{ એટલે કે } 1, 1, \pm \sqrt{2}.$$

જવાબ : (B)

(53) એક જ ઊગમબિંદુવાળા લંબવૃત્તીય અક્ષોની બે યામ પદ્ધતિ છે. એક સમતલ ઊગમબિંદુથી પ્રથમ યામ પદ્ધતિના અક્ષોને a, b, c અંતરે અને બીજી યામ પદ્ધતિના અક્ષોને a', b', c' અંતરે છેદે, તો

$$(A) \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{a'^2} + \frac{1}{b'^2} + \frac{1}{c'^2} = 0$$

$$(B) \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} + \frac{1}{a'^2} - \frac{1}{b'^2} - \frac{1}{c'^2} = 0$$

$$(C) \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a'^2} - \frac{1}{b'^2} - \frac{1}{c'^2} = 0$$

$$(D) \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{a'^2} + \frac{1}{b'^2} + \frac{1}{c'^2} = 2$$

(AIEEE : 2003)

ઉકેલ : સમતલના અક્ષો પરના અંતઃખંડ a, b, c છે. તેથી સમતલનું સમીકરણ $\pm \frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} \pm \frac{z}{c} = 1$

તે જ પ્રમાણે આ જ સમતલનું સમીકરણ $\pm \frac{x}{a'} \pm \frac{y}{b'} \pm \frac{z}{c'} = 1$ પણ થશે.

$$\text{ઊગમબિંદુથી સમતલનું લંબઅંતર } d_1 = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}}.$$

તે જ પ્રમાણે સમતલનું સમીકરણ બીજી યામ પદ્ધતિ પ્રમાણે લેતાં, ઊગમબિંદુથી લંબઅંતર

$$d_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(a')^2} + \frac{1}{(b')^2} + \frac{1}{(c')^2}}}.$$

હવે $d_1 = d_2$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(a')^2} + \frac{1}{(b')^2} + \frac{1}{(c')^2}}}$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - \frac{1}{(a')^2} - \frac{1}{(b')^2} - \frac{1}{(c')^2} = 0$$

જવાબ : (C)

(54) $(-1, 0, 1)$ અને $(2, 2, 3)$ માંથી પસાર થતા તથા રેખા $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = z-1$ ને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ

(A) $3x - 2y + z + 2 = 0$

(B) $2x - y - 4z + 2 = 0$

(C) $2x + y - 4z - 6 = 0$

(D) $2x + y - 4z + 6 = 0$

ઉકેલ : ધારો કે સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = (a, b, c)$ છે.

$A(-1, 0, 1)$ સમતલ પર આવેલું છે.

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } a(x+1) + b(y-0) + c(z-1) = 0 \quad (1)$$

સમતલ $B(2, 2, 3)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 3a + 2b + 2c = 0 \quad (a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) + c(z_2 - z_1) = 0) \quad (2)$$

રેખા માટે $\vec{l} = (3, -2, 1)$ એ (a, b, c) ને લંબ છે.

$$\therefore 3a - 2b + c = 0 \quad (\vec{l} \cdot \vec{n} = 0) \quad (3)$$

સમીકરણ (2) અને (3) નું સમાધાન કરતાં

$$\frac{a}{6} = \frac{b}{3} = \frac{c}{-12}$$

$$\therefore \frac{a}{2} = \frac{b}{1} = \frac{c}{-4}$$

$$\therefore a : b : c = 2 : 1 : (-4)$$

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } 2(x+1) + 1(y-0) - 4(z-1) = 0$$

$$\therefore 2x + y - 4z + 6 = 0.$$

જવાબ : (D)

(55) એક સમતલ X -અક્ષને A , Y -અક્ષને B અને Z -અક્ષને C માં છેદે છે. ΔABC નું મધ્યકેન્દ્ર (α, β, γ) હોય, તો

(A) $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 1$

(B) $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 3$

(C) $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = \frac{1}{3}$

(D) $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 0$

ઉકેલ : સમતલ અક્ષોને $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ અને $C(0, 0, c)$ માં છેલે છે.

સમતલનું સમીકરણ $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ થશે.

$$\Delta ABC \text{ નું મધ્યકેન્દ્ર } (\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}, \frac{c}{3} \right)$$

$$\therefore a = 3\alpha, b = 3\beta, c = 3\gamma$$

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } \frac{x}{3\alpha} + \frac{y}{3\beta} + \frac{z}{3\gamma} = 1$$

$$\therefore \frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 3$$

જવાબ : (B)

(56) $(3, 2, 0)$ માંથી પસાર થતા અને રેખા $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-4}{4}$ ને સમાવતા સમતલનું સમીકરણ

(A) $x - y + z = 1$ (B) $x + y + z = 5$ (C) $x + 2y - z = 1$ (D) $2x - y + z = 5$

(AIEEE : 2002)

ઉકેલ : સમતલનું સમીકરણ $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{vmatrix} = 0$ જ્યાં $(x_1, y_1, z_1) = (3, 2, 0)$
 $(x_2, y_2, z_2) = (3, 6, 4)$
 $(l_1, l_2, l_3) = (1, 5, 4)$

$$\therefore \begin{vmatrix} x-3 & y-2 & z \\ 0 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore -4(x-3) + 4(y-2) - 4z = 0$$

$$\therefore -x + 3 + y - 2 - z = 0$$

$$\therefore x - y + z = 1$$

જવાબ : (A)

બીજી રીત : ધારો કે સમતલનું સમીકરણ $a(x-3) + b(y-2) + c(z-0) = 0$ છે.

રેખા પરનું કોઈ પણ બિંદુ $(k+3, 5k+6, 4k+4)$ સમતલ પર છે.

$$\therefore a(k+3-3) + b(5k+6-2) + c(4k+4) = 0 \quad \forall k \in R$$

$$\therefore (a+5b+4c)k + 4b+4c = 0 \quad \forall k \in R$$

$$\therefore a+5b+4c = 0$$

$$4b+4c = 0 \text{ i.e. } b+c = 0$$

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{-1} = \frac{c}{1}$$

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } (x-3) - (y-2) + (z-0) = 0$$

$$\therefore x - y + z = 1.$$

ત્રીજી રીત : સમતલનું સમીકરણ $a(x-3)+b(y-2)+c(z-0)=0$

સમતલનું અભિલંબ (a, b, c) એ રેખાની દિશા $(1, 5, 4)$ ને લંબ છે.

$$\therefore a+5b+4c=0 \quad (1)$$

$(3, 6, 4)$ સમતલ પર છે.

$$a(3-3)+b(6-2)+c(4)=0$$

$$\therefore 4b+4c=0 \quad (2)$$

$$(1) - (2) \text{ કરતાં } a+b=0$$

$$\therefore a=-b=c \quad ((2) \text{ પરથી})$$

$$\therefore x-3-(y-2)+z=0 \text{ સમતલનું સમીકરણ છે.}$$

$$\therefore x-y+z=1$$

(57) એક ચતુષ્ફલકનાં શિરોબિંદુઓ $O(0, 0, 0)$, $A(1, 2, 1)$, $B(2, 1, 3)$, $C(-1, 1, 2)$ છે. બિંદુઓ O, A, B થી અને A, B, C થી રચાતાં સમતલો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ (AIEEE:2003)

$$(A) \cos^{-1}\left(\frac{17}{31}\right) \quad (B) \frac{\pi}{6} \quad (C) \frac{\pi}{2} \quad (D) \cos^{-1}\left(\frac{19}{35}\right)$$

ઉકેલ : O, A, B શિરોબિંદુઓથી રચાતા સમતલનો અભિલંબ સદિશ

$$\vec{n}_1 = \vec{OA} \times \vec{OB} = (1, 2, 1) \times (2, 1, 3) = (5, -1, -3)$$

અને A, B, C થી રચાતા સમતલનો અભિલંબ સદિશ

$$\vec{n}_2 = \vec{AB} \times \vec{AC} = (1, -1, 2) \times (-2, -1, 1) = (1, -5, -3)$$

$$\text{તેમના વચ્ચેના ખૂણાનું માપ } \theta \text{ હોય તો } \cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|5+5+9|}{\sqrt{35} \cdot \sqrt{35}} = \frac{19}{35}$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1}\left(\frac{19}{35}\right)$$

જવાબ : (D)

(58) રેખા $\frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-k}{2}$ એ સમતલ $2x-4y+z=7$ માં આવેલી હોય, તો $k = \dots\dots$

$$(A) 7 \quad (B) -7 \quad (C) 1 \quad (D) \text{ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા નથી.}$$

(IIT : 2003)

ઉકેલ : રેખા સમતલમાં આવેલી છે. તેથી રેખા પરનું બિંદુ $(4, 2, k)$ સમતલમાં છે.

$$\therefore 2(4) - 4(2) + k = 7$$

$$\therefore k = 7.$$

જવાબ : (A)

(59) સમતલ $x-3y+4z+6=0$ ના અક્ષો પરના અંતઃખંડોનો સરવાળો

- (A) $\frac{11}{2}$ (B) $\frac{-11}{2}$ (C) $\frac{-19}{2}$ (D) 8

ઉકેલ : $x-3y+4z=-6$

$$\therefore \frac{x}{-6} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-\frac{3}{2}} = 1$$

$\therefore$ સમતલના અંતઃખંડો $-6, 2, -\frac{3}{2}$

$$\therefore \text{અંતઃખંડોનો સરવાળો} = \frac{-11}{2}$$

જવાબ : (B)

(60) સમતલ અક્ષોને A, B, C માં છેદે છે. જો ΔABC નું મધ્યકેન્દ્ર $(p^2, p, 1)$ હોય, તો સમતલનું સમીકરણ

- (A) $p^2x + py + z = 3p^2$ (B) $x + py + p^2z = 3p^2$
(C) $p^2x + py + z = 3$ (D) $x + py + p^2z = 3$

ઉકેલ : ધારો કે સમતલ અક્ષોને $A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c)$ માં છેદે છે.

$$\text{સમતલનું સમીકરણ } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

$$\Delta ABC \text{ નું મધ્યકેન્દ્ર } (p^2, p, 1) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}, \frac{c}{3} \right)$$

$$\therefore a = 3p^2, b = 3p, c = 3$$

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } \frac{x}{3p^2} + \frac{y}{3p} + \frac{z}{3} = 1$$

$$\therefore x + py + p^2z = 3p^2$$

જવાબ : (B)

(61) બિંદુ $(4, 2, 3)$ નું સમતલ $2x+3y-6z+11=0$ થી લંબઅંતર =

- (A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{43}{7}$ (C) 1 (D) $\frac{15}{7}$

ઉકેલ : બિંદુ (x_1, y_1, z_1) નું સમતલ $ax+by+cz+d=0$ થી લંબઅંતર

$$p = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{|8+6-18+11|}{\sqrt{4+9+36}} = \frac{7}{7} = 1.$$

જવાબ : (C)

(62) $(1, 4, 7)$ અને $(3, 0, 1)$ ને જોડતા રેખાખંડના લંબદ્વિભાજક સમતલનું સમીકરણ

- (A) $x-2y-3z=0$ (B) $x-2y-3z+14=0$
(C) $x-2y-3z-14=0$ (D) $x+2y+3z-18=0$

ઉકેલ : $A(1, 4, 7)$ અને $B(3, 0, 1)$ ને જોડતા $\overline{AB}$ નું મધ્યબિંદુ $M(2, 2, 4)$ થશે.

લંબદ્વિભાજક સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (2, -4, -6)$.

$\therefore$ લંબદ્વિભાજક સમતલનું સમીકરણ $\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n}$.

$$\therefore \vec{r} \cdot (1, -2, -3) = (2, 2, 4) \cdot (1, -2, -3) = -14$$

$$\therefore x - 2y - 3z + 14 = 0$$

જવાબ : (B)

(63) સમતલો $x + 3y - z = 1$ અને $\vec{r} \cdot (-2\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}) = 2$ ની છેદરેખા સદિશને સમાંતર છે.

$$(A) \ 3\hat{i} - 2\hat{j} - 7\hat{k} \quad (B) \ -13\hat{i} + 2\hat{j} - 7\hat{k} \quad (C) \ 13\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k} \quad (D) \ 2\hat{i} + 7\hat{j} - 13\hat{k}$$

ઉકેલ : $\vec{n}_1 = (1, 3, -1)$, $\vec{n}_2 = (-2, 1, 4)$

$\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = 13\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$ સદિશની દિશાવાળી રેખા એ છેદરેખા છે.

તે $-13\hat{i} + 2\hat{j} - 7\hat{k}$ સદિશને સમાંતર છે.

જવાબ : (B), (C)

(64) રેખા $\vec{r} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ અને સમતલ $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) = 5$ વચ્ચેનું અંતર

$$(A) \ \frac{10}{3\sqrt{3}} \quad (B) \ \frac{10}{9} \quad (C) \ \frac{10}{3} \quad (D) \ \frac{3}{10}$$

(AIEEE : 2005)

ઉકેલ : $(1, -1, 4) \cdot (1, 5, 1) = 0$ અને $(2, -2, 3)$ સમતલમાં આવેલું નથી.

$\therefore$ રેખા સમતલને સમાંતર છે.

હવે, $A(2, -2, 3)$ રેખા પરનું બિંદુ છે અને સમતલનું સમીકરણ $x + 5y + z - 5 = 0$ છે.


રેખા અને સમતલ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે સમતલથી રેખા પરના બિંદુનું અંતર

$$\begin{aligned} \therefore \text{રેખાનું સમતલથી અંતર} &= \frac{|1(2) + 5(-2) + 1(3) - 5|}{\sqrt{1^2 + 5^2 + 1^2}} \\ &= \frac{10}{3\sqrt{3}} \end{aligned}$$

જવાબ : (A)

(65) સમતલ $x - 2y = 0$ માં બિંદુ $(-1, 3, 4)$ નું પ્રતિબિંબ

- (A) $\left(\frac{-17}{3}, \frac{-19}{3}, 4\right)$ (B) $(15, 11, 4)$ (C) $\left(\frac{-17}{3}, \frac{-19}{3}, 1\right)$ (D) $\left(\frac{9}{5}, \frac{-13}{5}, 4\right)$



(AIEEE :2006)

આકૃતિ 21.6

ઉકેલ : ધારો કે $P(-1, 3, 4)$ નું પ્રતિબિંબ $Q(d, e, f)$ છે.

$\therefore \overline{PQ}$ નું મધ્યબિંદુ $M\left(\frac{d-1}{2}, \frac{e+3}{2}, \frac{f+4}{2}\right)$ સમતલ $x - 2y = 0$ માં છે.

$$\therefore \frac{d-1}{2} - 2\left(\frac{e+3}{2}\right) = 0$$

$$\therefore d - 2e = 7 \quad (1)$$

P માંથી પસાર થતી સમતલને લંબરેખાનું સમીકરણ

$$\vec{r} = (-1, 3, 4) + k(1, -2, 0), \quad k \in R \quad (\vec{l} = \vec{n})$$

$$\therefore \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-4}{0}$$

લંબરેખા Q માંથી પણ પસાર થશે.

$$\therefore \frac{d+1}{1} = \frac{e-3}{-2} = \frac{f-4}{0}$$

$$\therefore -2d - 2 = e - 3$$

$$\therefore 2d + e = 1 \quad \text{અને} \quad f = 4. \quad (2)$$

સમીકરણ (1) અને (2) ઉકેલતાં, $d = \frac{9}{5}$, $e = \frac{-13}{5}$

$$\therefore \text{પ્રતિબિંબ} \left(\frac{9}{5}, \frac{-13}{5}, 4\right)$$

જવાબ : (D)

(66) સમતલો $x + 5y + z = 4$ અને $x + 3y + 2z = 1$ ને લંબ $(1, 4, -2)$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ

- (A) $7x + y + 2z = 7$ (B) $2x + 8y + 3z = 28$ (C) $7x - y - 2z = 7$ (D) $7x - y + 2z = -1$

ઉકેલ : આપેલ સમતલોના અભિલંબ સદિશ $\vec{n}_1 = (1, 5, 1)$ અને $\vec{n}_2 = (1, 3, 2)$

બંને સમતલોને લંબ સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$= (1, 5, 1) \times (1, 3, 2) = (7, -1, -2)$$

$\therefore$ લંબ સમતલનું સમીકરણ $a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$

$$\therefore 7(x - 1) - 1(y - 4) - 2(z + 2) = 0$$

$$\therefore 7x - y - 2z = 7$$

જવાબ : (C)

(67) $(1, -2, 1)$ માંથી પસાર થતા $2x - 2y + z = 0$ અને $x - y + 2z = 4$ બંનેને લંબ સમતલનું $(1, 2, 2)$ થી અંતર

(A) 0

(B) 1

(C) $\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

(IIT : 2006)

ઉકેલ : લંબ સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (2, -2, 1) \times (1, -1, 2) = (-3, -3, 0)$

$$\text{અથવા } \vec{n} = (1, 1, 0)$$

$$\text{લંબ સમતલનું સમીકરણ } \vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n} \quad \left(\vec{a} = (1, -2, 1) \right)$$

$$\therefore x + y = -1$$

$$\therefore x + y + 1 = 0$$

સમતલ $x + y + 1 = 0$ નું બિંદુ $(1, 2, 2)$ થી અંતર

$$= \frac{|1(1) + 1(2) + 0(2) + 1|}{\sqrt{1+1+0}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

જવાબ : (D)

(68) સમતલો $2x + 3y + z = 1$ અને $x + 3y + 2z = 2$ ની છેદ રેખા L એ X -અક્ષની ધન દિશા સાથે α માપનો ખૂણો બનાવે, તો $\cos \alpha = \dots\dots$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(AIEEE : 2007)

ઉકેલ : રેખાની દિશા $\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (2, 3, 1) \times (1, 3, 2) = (3, -3, 3)$

$$\text{એટલે કે } \vec{l} = (1, -1, 1)$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{l} \cdot \hat{i}|}{|\vec{l}| |\hat{i}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

જવાબ : (D)

(69) રેખા $\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3}$ એ YZ -સમતલને સમાંતર હોય, તો

- (A) $l_1 = 0$ (B) $l_2 = 0$ (C) $l_3 = 0$ (D) $l_2 = 0, l_3 = 0$

ઉકેલ : રેખાની દિશા (l_1, l_2, l_3) એ $x=0$ ને લંબ છે.

$$\therefore l_1 + 0 + 0 = 0$$

$$\therefore l_1 = 0$$

જવાબ : (A)

(70) $(1, 5, 10)$ બિંદુનું રેખા $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{12}$ અને સમતલ $x+y-z-1=0$ ના છેદબિંદુથી અંતર

- (A) 15 (B) 11 (C) 13 (D) $\frac{14}{5}$

ઉકેલ : રેખા પરનું બિંદુ $(-2, 1, -2)$ એ સમતલ $x+y-z-1=0$ નું પણ બિંદુ છે. તેથી $(-2, 1, -2)$ એ રેખા અને સમતલનું છેદબિંદુ થશે.

$$\begin{aligned} \therefore \text{માગેલું અંતર} &= \sqrt{(1+2)^2 + (5-1)^2 + (10+2)^2} \\ &= \sqrt{9+16+144} = 13 \end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(71) સમતલ $6x+4y+3z-12=0$ અક્ષોને A, B, C બિંદુએ છેદે, તો ΔABC નું ક્ષેત્રફળ એકમ થાય.

- (A) $\sqrt{41}$ (B) $\sqrt{61}$ (C) $\sqrt{29}$ (D) $\sqrt{244}$

ઉકેલ : સમતલનું સમીકરણ : $6x+4y+3z=12$

$$\therefore \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$$

$\therefore$ અક્ષો પરના અંતઃખંડ 2, 3, 4 છે.

$\therefore$ અક્ષો સાથેનાં છેદબિંદુઓ $A(2, 0, 0), B(0, 3, 0), C(0, 0, 4)$

$$\begin{aligned} \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| \\ &= \frac{1}{2} |(-2, 3, 0) \times (-2, 0, 4)| \\ &= \frac{1}{2} |(12, 8, 6)| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{144+64+36} \\ &= \sqrt{61} \end{aligned}$$

$$\text{નોંધ : } \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}$$

જવાબ : (B)

(72) $P(3, 6, 2)$ માંથી પસાર થતું અને $\overleftrightarrow{OP}$ ને લંબ સમતલનું સમીકરણ

(A) $3x + 6y + 2z = 49$

(B) $3x + 6y + 2z = 7$

(C) $2x + 6y + 3z = 49$

(D) $2x + 6y + 3z = 7$

ઉકેલ : $\overleftrightarrow{OP}$ ને લંબ સમતલનો અભિલંબ સદિશ $\vec{n} = \overrightarrow{OP} = (3, 6, 2)$ તથા સમતલ $\vec{a} = (3, 6, 2)$ માંથી પસાર થાય છે.

$$\therefore 3(x-3) + 6(y-6) + 2(z-2) = 0$$

$$\therefore 3x + 6y + 2z = 49$$

જવાબ : (A)

(73) $(5, 1, a)$ અને $(3, b, 1)$ માંથી પસાર થતી રેખા YZ - સમતલને $(0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2})$ બિંદુએ છેદે, તો

(AIEEE:2008)

(A) $a = 8, b = 2$

(B) $a = 2, b = 8$

(C) $a = 4, b = 6$

(D) $a = 6, b = 4$

ઉકેલ : $(5, 1, a)$ અને $(3, b, 1)$ માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ

$$\vec{r} = (5, 1, a) + k(-2, b-1, 1-a), k \in R$$

ધારો કે રેખા $(5-2k, 1+k(b-1), a+k(1-a))$ બિંદુએ YZ -સમતલને છેદે છે.

$$\therefore (0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2}) = (5-2k, 1+k(b-1), a+k(1-a))$$

$$\therefore 0 = 5-2k. \text{ આથી, } k = \frac{5}{2}.$$

$$\frac{17}{2} = 1+k(b-1)$$

$$\therefore \frac{17}{2} = 1 + \frac{5}{2}(b-1)$$

$$\therefore b = 4$$

$$\frac{-13}{2} = a+k(1-a)$$

$$\therefore \frac{-18}{2} = \frac{-3a}{2}$$

$$\therefore 6 = a$$

જવાબ : (D)

(74) રેખા $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$ એ સમતલ $x+3y-\alpha z + \beta = 0$ માં આવેલી હોય, તો $(\alpha, \beta) = \dots\dots$

(A) $(6, -17)$

(B) $(-6, 7)$

(C) $(5, -15)$

(D) $(-5, 5)$

(AIEEE : 2009)

ઉકેલ : રેખા માટે $\vec{a} = (2, 1, -2)$, $\vec{l} = (3, -5, 2)$ અને $\vec{n} = (1, 3, -\alpha)$

$$\vec{l} \perp \vec{n}. \text{ આથી } \vec{l} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\therefore 3-15-2\alpha = 0. \text{ આથી } \alpha = -6$$

અને બિંદુ $(2, 1, -2)$ સમતલ $x+3y-\alpha z + \beta = 0$ પર છે.

$$\therefore 2+3+6(-2) + \beta = 0$$

$$\therefore \beta = 7$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = (-6, 7).$$

જવાબ : (B)

નોંધ : $\alpha = -6$ પરથી જ જવાબ મળી જાય.

(75) $P(3, 2, 6)$ અવકાશનું એક બિંદુ છે. બિંદુ Q રેખા $\vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + \mu(-3\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k})$ પર આવેલું છે.

સદિશ $\vec{PQ}$ એ સમતલ $x - 4y + 3z = 1$ ને સમાંતર હોય, તો $\mu = \dots$

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $-\frac{1}{8}$ (IIT:2009)

ઉકેલ : રેખા $\vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) + \mu(-3\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k})$ પરનું બિંદુ $Q(1-3\mu, -1+\mu, 2+5\mu)$ છે.

$\vec{PQ} = (1-3\mu-3, -1+\mu-2, 2+5\mu-6)$ એ સમતલ $x - 4y + 3z = 1$ ને સમાંતર છે,

તેથી $\vec{PQ} \perp \vec{n}$, જ્યાં $\vec{n} = (1, -4, 3)$

$$\therefore \vec{PQ} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\therefore (-3\mu-2)(1) + (\mu-3)(-4) + (5\mu-4)(3) = 0$$

$$\therefore -3\mu - 2 - 4\mu + 12 + 15\mu - 12 = 0$$

$$\therefore 8\mu = 2$$

$$\therefore \mu = \frac{1}{4}$$

જવાબ : (A)

(76) X -અક્ષને સમાંતર, Y -અંતઃખંડ 2 અને Z -અંતઃખંડ 3 હોય તેવા સમતલનું સમીકરણ

- (A) $3y + 2z = 1$ (B) $3y + 2z = 6$ (C) $2y + 3z = 1$ (D) $2y + 3z = 6$

ઉકેલ : X -અક્ષને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ $by + cz + 1 = 0$ છે.

સમતલનો y -અંતઃખંડ 2 અને z -અંતઃખંડ 3 છે.

$$\therefore 2b + 1 = 0 \quad \text{અને} \quad 3c + 1 = 0$$

$$\therefore b = -\frac{1}{2} \quad \text{અને} \quad c = -\frac{1}{3}$$

$$\text{સમતલનું સમીકરણ } -\frac{y}{2} - \frac{z}{3} + 1 = 0$$

$$\therefore 3y + 2z = 6$$

બીજી રીત :

X -અક્ષને સમાંતર સમતલનું સમીકરણ

$$\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Y -અંતઃખંડ 2 અને Z -અંતઃખંડ 3 છે.

$$\therefore \text{સમતલનું સમીકરણ } \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

$$\therefore 3y + 2z = 6$$

જવાબ : (B)

(77) $P(1, -2, 1)$ થી સમતલ $x + 2y - 2z = \alpha$, $\alpha > 0$ નું અંતર 5 છે. P થી સમતલ પરનો લંબપાદ

- (A) $(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{-7}{3})$ (B) $(\frac{4}{3}, \frac{-4}{3}, \frac{1}{3})$ (C) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{10}{3})$ (D) $(\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{5}{3})$ (IIT : 2010)

ઉકેલ : બિંદુ $(1, -2, 1)$ થી સમતલ $x + 2y - 2z - \alpha = 0$ નું લંબ અંતર.

$$\frac{|1(1) - 2(2) + 1(-2) - \alpha|}{\sqrt{1+4+4}} = 5$$

$$\therefore |-5 - \alpha| = 15$$

$$\therefore 5 + \alpha = 15 \quad \text{અથવા} \quad 5 + \alpha = -15$$

$$\therefore \alpha = 10 \quad \text{અથવા} \quad \alpha = -20$$

હવે $\alpha > 0$ હોવાથી $\alpha = 10$.

P માંથી સમતલ પરનો લંબપાદ M હોય, તો

$$\overleftrightarrow{PM} \text{ નું સમીકરણ } \vec{r} = (1, -2, 1) + k(1, 2, -2), k \in R$$

$\therefore M$ ના યામ કોઈક $k \in R$ માટે $(1+k, -2+2k, 1-2k)$ છે અને તે સમતલ $x+2y-2z-10=0$ પર છે.

$$\therefore 1+k-4+4k-2+4k-10=0$$

$$\therefore 9k=15$$

$$\therefore k=\frac{5}{3}$$

$$\therefore \text{લંબપાદ } M\left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{-7}{3}\right)$$

જવાબ : (A)

(78) સમતલો $3x-6y-2z=7$ અને $2x+y-kz=5$ પરસ્પર લંબ હોય, તો $k = \dots\dots$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

ઉકેલ : $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ આથી, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$

$$\therefore (3, -6, -2) \cdot (2, 1, -k) = 0$$

$$\therefore 6-6+2k=0. \text{ આથી, } k=0$$

જવાબ : (A)

(79) $P(2, -1, 2)$ માંથી પસાર થતી રેખાની દિક્કોસાઈન ધન છે. તે યામાક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવે છે.

રેખા, સમતલ $2x+y+z=9$ ને Q માં છેદે છે. રેખાખંડ PQ ની લંબાઈ $\dots\dots$

- (A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2 (IIT-2009)

ઉકેલ : રેખાની દિક્કોસાઈન l, m, n લેતાં,

હવે, $l^2+m^2+n^2=1$ તથા રેખા અક્ષો સાથે સમાન માપના ખૂણા બનાવે છે, તેથી $l=m=n$.

$$\therefore 3l^2=1$$

$$\therefore l=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$$

દિક્કોસાઈન ધન હોવાથી રેખાની દિક્કોસાઈન $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$ થશે.

$$\therefore P \text{ માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ } \vec{r} = (2, -1, 2) + k\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), k \in R$$

$$\therefore P \text{ થી } R \text{ અંતરે આવેલું રેખા પરનું બિંદુ } Q\left(2+\frac{k}{\sqrt{3}}, -1+\frac{k}{\sqrt{3}}, 2+\frac{k}{\sqrt{3}}\right) \text{ છે.}$$

તે સમતલ $2x+y+z=9$ પર આવેલું છે.

$$\therefore 2\left(2+\frac{k}{\sqrt{3}}\right) + \left(-1+\frac{k}{\sqrt{3}}\right) + \left(2+\frac{k}{\sqrt{3}}\right) = 9$$

$$\therefore \frac{4k}{\sqrt{3}} = 4$$

$$\therefore K = \sqrt{3}$$

$$\therefore PQ = \sqrt{3}$$

જવાબ : (C)