

- શ્રેણી : જે વિધેયનો પ્રદેશ N હોય અથવા $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ હોય તેવા વિધેયને શ્રેણી કહે છે. એટલે કે, વિધેય $f: N \rightarrow R$ અથવા $f: \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow R$ ને શ્રેણી કહે છે.

$f: N \rightarrow N$ ને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શ્રેણી, $f: N \rightarrow Z$ ને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની શ્રેણી,

$f: N \rightarrow R$ ને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની શ્રેણી, $f: N \rightarrow Q$ ને સંમેય સંખ્યાઓની શ્રેણી કહે છે.

$f(1), f(2), \dots, f(n) \dots$ ને શ્રેણીનાં પદો કહે છે.

$f(n)$ ને a_n કે t_n અથવા u_n કે T_n વડે દર્શાવાય છે.

- શ્રેઢી : શ્રેણીનાં તમામ n પદોનો સરવાળો એ શ્રેઢી દર્શાવે છે. એટલે કે, કોઈ શ્રેણીનાં પદો $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ હોય, તો $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ એ શ્રેઢી દર્શાવે છે. આ પ્રથમ n પદોના સરવાળાને S_n વડે દર્શાવાય.

આપેલ શ્રેઢીને સંબંધિત શ્રેણી સૂત્ર $S_n - S_{n-1} = a_n$ તથા $S_1 = a_1$; $n \geq 2$ પરથી મેળવી શકાય.

- સમાંતર શ્રેણી : શ્રેણી $f: N \rightarrow R, f(n) = an + b$; $a, b \in R; a \neq 0$ ને સમાંતર શ્રેણી કહે છે.

સમાંતર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત શૂન્યેતર અચળ હોય. તેને d વડે દર્શાવાય. શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a લેતાં, સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ $t_n = f(n) = a_n = a + (n-1)d$ દ્વારા શોધી શકાય.

એટલે કે, $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n-1)d, \dots$ સમાંતર શ્રેણીનાં પદો છે.

નોંધ : (1) જો a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો $2b = a + c$ મળે.

(2) જો સમાંતર શ્રેણીનાં ત્રણ કે પાંચ કે સાત કે નવ ... ક્રમિક પદો આપેલ હોય ત્યારે ‘ a ’ ને મધ્યમ પદ તરીકે લઈ તેની પહેલાંનાં પદોમાં d ઘટાડવા તથા ત્યાર પછીનાં પદોમાં ક્રમશઃ d ઉમેરવા. ટૂંકમાં, ... $a - d, a, a + d$ કે ... $a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$... જેવાં પદો મળે.

(3) જો સમાંતર શ્રેણીનાં ચાર કે છ કે આઠ... ક્રમિક પદો આપેલ હોય ત્યારે બે મધ્યમ પદ થાય તથા બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત $2d$ રાખીએ તો ... $a - 5d, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, a + 5d, \dots$ જેવાં પદો મળે.

- સમાંતર શ્રેઢી : સમાંતર શ્રેણીને સંબંધિત શ્રેઢીને સમાંતર શ્રેઢી કહે છે એટલે કે, સમાંતર શ્રેણી $a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-1)d$ નાં તમામ n પદોનો સરવાળો લઈએ, તો તેને સમાંતર શ્રેઢી કહે છે. તેને S_n વડે દર્શાવાય.

$$\therefore S_n = a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + (a + (n-1)d)$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ એ સમાંતર શ્રેણીનાં } n \text{ પદોનો સરવાળો દર્શાવે છે.}$$

જો $l = a + (n-1)d$ લઈએ, તો $S_n = \frac{n}{2} (a+l)$ લખાય.

- સમગુણોત્તર શ્રેણી : શ્રેણી $f: N \rightarrow R, f(n) = ar^{n-1}$; $a, r \in R - \{0\}$ ને સમગુણોત્તર શ્રેણી કહે છે.

સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો ગુણોત્તર અચળ હોય તેને r વડે દર્શાવાય. શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a , સામાન્ય ગુણોત્તર r લેતાં સમગુણોત્તર શ્રેણીનું n મું પદ $a_n = t_n = f(n) = a.r^{n-1}$ દ્વારા મેળવી શકાય.

એટલે કે, $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે તેમ કહેવાય.

નોંધ : (1) a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો, $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ એટલે કે $b^2 = ac$ મળે. $a, b, c \in R^+$

(2) જો સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રણ કે પાંચ કે સાત ... ક્રમિક પદો આપેલ હોય ત્યારે 'a'ને મધ્યમ પદ તરીકે રાખી, તેની પહેલાંનાં પદોને $\frac{1}{r}$ વડે તથા પછીનાં પદોને r વડે ક્રમશઃ ગુણવા. ટૂંકમાં, ... $\frac{a}{r^2}, \frac{a}{r}, a, ar,$

ar^2 ... જેવાં પદો મળે. બે, ચાર, છ ... પદ માટે ... $\frac{a}{r^3}, \frac{a}{r}, ar, ar^3$... જેવા પદો મળે.

- **સમગુણોત્તર શ્રેણી :** સમગુણોત્તર શ્રેણીને સંબંધિત શ્રેણીને સમગુણોત્તર શ્રેણી કહે છે. એટલે કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં n પદો $a, ar, ar^2 \dots$ નો સરવાળો લઈએ, તો તેને સમગુણોત્તર શ્રેણી કહે છે. તેને S_n થી દર્શાવાય.

$$\text{અહીં } S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, r > 1 \text{ તથા } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, r < 1 \text{ તથા } S_n = n.a, r = 1$$

- **સ્વરિત શ્રેણી :** જો $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં શૂન્યેતર ક્રમિક પદો હોય, તો $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots$, $\frac{1}{a_n}$ એ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે તેમ કહેવાય. એટલે કે સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ $t_n = a + (n-1)d$ લેતાં, સ્વરિત શ્રેણીનું

$$n\text{મું પદ } \frac{1}{a + (n-1)d} \text{ મળે. } (a + (n-1)d \neq 0)$$

- **સમાંતર મધ્યક :** જો બે સંખ્યાઓ a તથા b માટે a, A તથા b સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો A ને a તથા b નો સમાંતર મધ્યક કહે છે. $A = \frac{a+b}{2}$
- **n સમાંતર મધ્યકો :** જો $a, A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, b$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ને સંખ્યાઓ a તથા b વચ્ચેના n સમાંતર મધ્યકો કહે છે.

$$A_1 = a + d, A_2 = a + 2d, A_3 = a + 3d, \dots, A_n = a + nd \text{ તથા } d = \frac{b-a}{n+1}$$

- **ગુણોત્તર મધ્યક :** બે ધન સંખ્યાઓ a તથા b માટે, a, G તથા b સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય, તો G ને સંખ્યાઓ a તથા b નો સમગુણોત્તર મધ્યક કહે છે. $G = \sqrt{ab}$
- **n સમગુણોત્તર મધ્યકો :** જો $a, G_1, G_2, G_3, \dots, G_n, b$ એ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય, તો $G_1, G_2, G_3, \dots, G_n$ ને ધન સંખ્યાઓ a તથા b વચ્ચેના n સમગુણોત્તર મધ્યકો કહે છે.

$$\text{જ્યાં, } G_1 = ar, G_2 = ar^2, G_3 = ar^3, \dots, G_n = ar^n. \text{ તથા } r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

- **સ્વરિત મધ્યક :** જો બે સંખ્યાઓ a તથા b માટે, a, H તથા b સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો H ને a તથા b નો સ્વરિત મધ્યક કહે છે. $\frac{1}{a}, \frac{1}{H}, \frac{1}{b}$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. $H = \frac{2ab}{a+b}$ સ્વરિત મધ્યક થાય.
- **n સ્વરિત મધ્યકો :** બે સંખ્યાઓ a તથા b માટે $a, H_1, H_2, H_3, \dots, H_n, b$ એ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ એ સંખ્યાઓ a તથા b વચ્ચેના n સ્વરિત મધ્યકો છે.

$$\therefore \frac{1}{a}, \frac{1}{H_1}, \frac{1}{H_2}, \dots, \frac{1}{H_n}, \frac{1}{b} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય. } d = \frac{a-b}{(n+1)ab}$$

$$\text{તથા } \frac{1}{H_1} = \frac{1}{a} + d, \frac{1}{H_2} = \frac{1}{a} + 2d, \frac{1}{H_3} = \frac{1}{a} + 3d, \dots, \frac{1}{H_n} = \frac{1}{a} + nd$$

નોંધ : બે સંખ્યા a તથા b ના સમાંતર મધ્યક, સમગુણોત્તર મધ્યક તથા સ્વરિત મધ્યક અનુક્રમે A , G તથા H હોય, તો $AH = G^2$

$\therefore A, G, H$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય, તથા $A > G > H$ મળે.

- સમાંતર-સમગુણોત્તર શ્રેઢી : $a + (a + d)r + (a + 2d)r^2 + (a + 3d)r^3 + \dots$ ને સમાંતર - સમગુણોત્તર શ્રેઢી કહે છે, જ્યાં $t_n = [a + (n - 1)d]r^{n-1}$.

$$S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{d \cdot r(1-r^{n-1})}{(1-r)^2} - \frac{[a + (n-1)d]r^n}{(1-r)}$$

જો $|r| < 1$ હોય, તો જેમ $n \rightarrow \infty$ હોય તેમ $r^n \rightarrow 0$. આથી $S_\infty = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2}$ થાય.

- ઘાત શ્રેઢી : કેટલીક વિશિષ્ટ શ્રેણીઓ માટે, પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યા, તેમના વર્ગ, તેમના ઘનના સરવાળા ધરાવતી શ્રેઢીઓ માટે આપણે સરવાળાને Σ સંકેતથી દર્શાવીશું.

Σ ના અગત્યનાં પરિણામો :

$$(1) \sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i$$

$$(2) \sum_{i=1}^n ka_i = k \sum_{i=1}^n a_i$$

$$(3) \sum_{i=1}^n 1 = (1 + 1 + 1 + \dots n \text{ વખત}) = n = \Sigma 1$$

$$(4) \sum_{i=1}^n i = \Sigma n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(5) \sum_{i=1}^n i^2 = \Sigma n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(6) \sum_{i=1}^n i^3 = \Sigma n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

નોંધ :

$$(i) \sum_{i=1}^n (a_i b_i) \neq \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n b_i ; \forall i \in \mathbb{N}$$

$$(ii) \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{b_i} \right) \neq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sum_{i=1}^n b_i} ; \forall i \in \mathbb{N}$$

બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો

(1) જો $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો,

(A) a^2, b^2, c^2 એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

(B) a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

(C) $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

(D) $\frac{1}{a^2}, \frac{1}{b^2}, \frac{1}{c^2}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

ઉકેલ : અહીં $\frac{2}{c+a} = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+b} = \frac{a+b+b+c}{(a+b)(b+c)}$

$$\therefore \frac{2}{c+a} = \frac{a+c+2b}{ab+ac+b^2+bc}$$

$$\therefore 2ab + 2ac + 2b^2 + 2bc = ac + a^2 + c^2 + ac + 2bc + 2ab$$

$$\therefore 2b^2 = a^2 + c^2$$

$$\therefore a^2, b^2, c^2 \text{ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (A)

(2) જો બે શ્રેણીઓ $3 + 10 + 17 + \dots$ તથા $63 + 65 + 67 + \dots$ ના n મા પદ સમાન હોય તો $n = \dots$

- (A) 9 (B) 11 (C) 13 (D) 19

ઉકેલ : અહીં $3, 10, 17, \dots$ તથા $63, 65, 67, \dots$ બંને સમાંતર શ્રેણીઓ છે.

પ્રથમ સમાંતર શ્રેણી $3, 10, 17, \dots$ માટે $a = 3, d = 7$

$$t_n = 3 + (n - 1)7 = 7n - 4$$

વળી, દ્વિતીય સમાંતર શ્રેણી $63, 65, 67, \dots$ માટે $a = 63, d = 2$

$$\therefore T_n = 63 + (n - 1)2 = 2n + 61$$

હવે, $t_n = T_n$ હોવાથી, $7n - 4 = 2n + 61$

$$\therefore 5n = 65$$

$$\therefore n = 13$$

જવાબ : (C)

(3) જો $\log 2, \log (2^x - 1)$ અને $\log (2^x + 3)$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો, $x = \dots$

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\log_5 2$ (C) $\log_2 5$ (D) $\log_3 5$

ઉકેલ : $2 \log (2^x - 1) = \log 2 + \log (2^x + 3)$

$$\therefore \log (2^x - 1)^2 = \log (2 \cdot (2^x + 3))$$

$$\therefore (2^x - 1)^2 = 2 \cdot (2^x + 3)$$

$$\therefore (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x + 1 = 2 \cdot 2^x + 6$$

$$\therefore (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x - 5 = 0$$

$$\therefore (2^x + 1)(2^x - 5) = 0$$

$$\therefore 2^x = -1 \text{ અથવા } 2^x = 5$$

પરંતુ $2^x = -1$ અશક્ય છે. આથી $2^x = 5$

$$\therefore x = \log_2 5$$

જવાબ : (C)

(4) કોઈ બહિર્મુખ બહુકોણના અંતર્ગત ખૂણાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તથા અંશ માપમાં સામાન્ય તફાવત 5 હોય તેમજ નાનામાં નાના ખૂણાનું અંશમાપ 120 હોય, તો તે બહુકોણને બાજુઓ હોય.

- (A) 9, 16 (B) 16 (C) 10 (D) 9

ઉકેલ : અહીં નાનામાં નાના ખૂણાનું અંશમાપ 120 છે. આથી $a = 120$ તથા $d = 5$

ધારો કે બહુકોણને n બાજુઓ છે.

બહુકોણના બધા ખૂણાઓનાં માપનો સરવાળો $(2n - 4) \times 90$ મળે.

$$\therefore \frac{n}{2} [2 (120) + (n - 1)5] = (2n - 4) 90 \text{ આથી } \frac{n}{2} (240 + 5n - 5) = (n - 2) 180$$

$$\therefore n (235 + 5n) = (n - 2) 360 \text{ આથી } 5n^2 - 125n + 720 = 0$$

$$\therefore n^2 - 25n + 144 = 0$$

$$\therefore (n - 16)(n - 9) = 0$$

$$\therefore n = 16 \text{ અથવા } n = 9$$

હવે $n = 16$ લેતાં, $t_{16} = a + 15d = 120 + 75 = 195$ અશક્ય છે. આથી $n = 9$

જવાબ : (D)

(5) $5^{1+x} + 5^{1-x}; \frac{a}{2}; 25^x + 25^{-x}$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદો હોય તો 'a' ની ન્યૂનતમ કિંમત હોય.

(A) 5

(B) 7

(C) 10

(D) 12

$$\begin{aligned} \text{ઉકેલ : અહીં } 2\left(\frac{a}{2}\right) &= 5^{1+x} + 5^{1-x} + 25^x + 25^{-x} = 5 \cdot 5^x + \frac{5}{5^x} + (5^2)^x + (5^2)^{-x} \\ &= 5 \cdot 5^x + \frac{5}{5^x} + (5^x)^2 + (5^x)^{-2} \end{aligned}$$

ધારો કે $5^x = m$

$$\begin{aligned} \therefore a &= 5m + \frac{5}{m} + m^2 + \frac{1}{m^2} = 5\left(m + \frac{1}{m}\right) + \left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right) \\ &= 5\left(\sqrt{m} - \frac{1}{\sqrt{m}}\right)^2 + \left(m - \frac{1}{m}\right)^2 + 12 \geq 12 \end{aligned}$$

$\therefore a$ ની ન્યૂનતમ કિંમત 12 મળે. (જે $x = 0$ ને સંગત મળે)

જવાબ : (D)

(6) $a_1, a_2, a_3, \dots$ એવી સમાંતર શ્રેણી છે કે જેથી, $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 240$ હોય, તો તે શ્રેણીનાં પ્રથમ 24 પદોનો સરવાળો થાય.

(A) 950

(B) 860

(C) 900

(D) 960

ઉકેલ : કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં શરૂઆત તથા અંતથી સમાન સ્થાને આવેલાં પદોનો સરવાળો એ પ્રથમ તથા અંતિમ પદોનાં સરવાળા જેટલો જ થાય.

અહીં $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{24}$ એ સમાંતર શ્રેણીનાં પ્રથમ 24 પદો છે.

હવે $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 240$ આપેલ છે.

$$\therefore (a_1 + a_{24}) + (a_5 + a_{20}) + (a_{10} + a_{15}) = 240$$

$$\therefore (a_1 + a_{24}) + (a_1 + a_{24}) + (a_1 + a_{24}) = 240$$

$$\therefore 3(a_1 + a_{24}) = 240$$

$$\therefore a_1 + a_{24} = 80$$

$$\text{હવે } S_{24} = \frac{24}{2} [a_1 + a_{24}] = 12(80) = 960$$

બીજી રીત :

$$a + a + 4d + a + 9d + a + 14d + a$$

$$+ 19d + a + 23d = 240$$

$$\therefore 6a + 69d = 240$$

$$\therefore 2a + 23d = 80$$

$$\therefore S_{24} = \frac{24}{2} (2a + 23d)$$

$$= (12)(80) = 960$$

જવાબ : (D)

$$(7) \text{ જો } \langle a_n \rangle \text{ એ સમાંતર શ્રેણી હોય, તો } D = \begin{vmatrix} a_p & a_q & a_r \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots$$

(A) 0

(B) -1

(C) 1

(D) pqr

ઉકેલ : અહીં $\langle a_n \rangle$ એ સમાંતર શ્રેણી છે.

$$\therefore a_p = a + (p-1)d, \quad a_q = a + (q-1)d \text{ અને } a_r = a + (r-1)d$$

$$\therefore D = \begin{vmatrix} a+(p-1)d & a+(q-1)d & a+(r-1)d \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & a & a \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$R_{31}(d), R_{21}(-d)$

$$= a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

જવાબ : (A)

(8) જો $\frac{a+b}{1-ab}, b, \frac{b+c}{1-bc}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો $\frac{1}{a}, b, \frac{1}{c}$ એ શ્રેણીમાં હોય.

(A) સમાંતર

(B) સમગુણોત્તર

(C) સ્વરિત

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : અહીં $\frac{a+b}{1-ab}, b, \frac{b+c}{1-bc}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore b - \left(\frac{a+b}{1-ab} \right) = \frac{b+c}{1-bc} - b$$

$$\therefore \frac{b-ab^2-a-b}{1-ab} = \frac{b+c-b+b^2c}{1-bc}$$

$$\therefore \frac{-ab^2-a}{1-ab} = \frac{c+b^2c}{1-bc}$$

$$\therefore \frac{-a(b^2+1)}{1-ab} = \frac{c(1+b^2)}{1-bc}$$

$$\therefore \frac{-a}{1-ab} = \frac{c}{1-bc}$$

$$\therefore -a + abc = c - abc$$

$$\therefore 2abc = a + c$$

$$\therefore 2b = \frac{a}{ac} + \frac{c}{ac} = \frac{1}{c} + \frac{1}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{a}, b, \frac{1}{c} \text{ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (A)

(9) જો $\log(a+c) + \log(a-2b+c) = 2 \log(a-c)$ હોય, તો $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ શ્રેણીમાં હોય.

(A) સ્વરિત

(B) સમગુણોત્તર

(C) સમાંતર

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : $\log(a+c) + \log(a-2b+c) = 2 \log(a-c)$

$$\therefore \log \{(a+c)(a-2b+c)\} = \log(a-c)^2$$

$$\therefore (a^2 - 2ab + ac + ac - 2bc + c^2) = (a^2 - 2ac + c^2)$$

$$\therefore (a^2 - 2ab + 2ac - 2bc + c^2) = (a^2 - 2ac + c^2)$$

$$\therefore 4ac = 2ab + 2bc. \text{ અર્થાત્ } 2ac = ab + bc$$

$$\therefore \frac{2}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \text{ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (C)

(10) જો $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તથા $\forall i, a_i > 0$ હોય, તો

$$\frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_n}} = \dots\dots$$

$$(A) \frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}} \quad (B) \frac{n}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}} \quad (C) \frac{n+1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}} \quad (D) \frac{n-1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}}$$

ઉકેલ : ધારો કે સમાંતર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત d છે.

$$\begin{aligned} & \text{હવે, } \frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_n}} \\ &= \frac{\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}}{a_1 - a_2} + \frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_3}}{a_2 - a_3} + \dots + \frac{\sqrt{a_{n-1}} - \sqrt{a_n}}{a_{n-1} - a_n} \\ &= \frac{\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}}{-d} + \frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_3}}{-d} + \dots + \frac{\sqrt{a_{n-1}} - \sqrt{a_n}}{-d} \\ &= -\frac{1}{d} [\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2} + \sqrt{a_2} - \sqrt{a_3} + \dots + \sqrt{a_{n-1}} - \sqrt{a_n}] \\ &= -\frac{1}{d} [\sqrt{a_1} - \sqrt{a_n}] = -\frac{1}{d} \left(\frac{a_1 - a_n}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}} \right) \end{aligned}$$

$$(a_n - a_1) = (n-1)d \text{ કારણ કે } a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$\therefore -\frac{1}{d} \left(\frac{-(n-1)d}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}} \right) = \frac{(n-1)}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_n}}$$

જવાબ : (D)

(11) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ m તથા અંતિમ પદ p હોય તેમજ n પદોનો સરવાળો S હોય, તો તે શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત હોય.

$$(A) \frac{p+m}{2S} \quad (B) \frac{m^2 - p^2}{2S - m + p} \quad (C) \frac{p^2 - m^2}{2S - (m+p)} \quad (D) \frac{p^2 + m^2}{2S + (m+p)}$$

ઉકેલ : અહીં $a = m$ તથા $p = m + (n-1)d$ છે.

$$\text{તેમજ } S_n = S = \frac{n}{2} (m + p) \text{ છે.}$$

$$\therefore p = m + (n-1)d \text{ પરથી, } d = \frac{p-m}{n-1} \text{ મળે તથા } n = \frac{2S}{m+p} \text{ મળે.}$$

$$\therefore d = \frac{p-m}{\frac{2S}{m+p}-1} = \frac{(p-m)(m+p)}{2S-m-p} = \frac{p^2-m^2}{2S-(m+p)} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(12) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીની n પદો હોય, તો
 $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - a_4^2 + \dots + a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2 = \dots$

(A) $\frac{n}{(2n-1)} (a_1^2 - a_{2n}^2)$ (B) $\frac{1}{(2n-1)} (a_1^2 + a_{2n}^2)$

(C) $\frac{1}{(2n-1)} (a_1^2 - a_{2n}^2)$ (D) $\frac{2n}{2n+1} (a_1^2 - a_{2n}^2)$

ઉકેલ : ધારો કે આપેલ સમાંતર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત d છે.

$$\therefore a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots = a_n - a_{n-1} = d \quad (1)$$

$$\text{હવે } (a_1^2 - a_2^2) + (a_3^2 - a_4^2) + \dots + (a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2)$$

$$= (a_1 - a_2)(a_1 + a_2) + (a_3 - a_4)(a_3 + a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n})(a_{2n-1} + a_{2n})$$

$$= -d[a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{2n-1} + a_{2n}]$$

$$= -nd[a_1 + a_{2n}] \quad (S_{2n} = \frac{1}{2}(2n)(a_1 + a_{2n}))$$

$$= -nd \frac{(a_1 + a_{2n})(a_1 - a_{2n})}{(a_1 - a_{2n})}$$

$$= -nd \frac{(a_1^2 - a_{2n}^2)}{(a_1 - a_{2n})} = \frac{nd(a_1^2 - a_{2n}^2)}{(a_{2n} - a_1)} \quad (2)$$

$$(a_1^2 - a_2^2) + (a_3^2 - a_4^2) + \dots + (a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2) = \frac{nd(a_1^2 - a_{2n}^2)}{(2n-1)d} \quad (a_{2n} = a_1 + (2n-1)d)$$

$$= \frac{n(a_1^2 - a_{2n}^2)}{(2n-1)} \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(13) જો p, q, r, s, t એ કોઈ સમાંતર શ્રેણી રહે, તો $p - 4q + 6r - 4s + t = \dots$

(A) 4 (B) 0 (C) 3 (D) 2

ઉકેલ : p, q, r, s, t સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો તે અનુક્રમે $p, p + d, p + 2d, p + 3d, p + 4d$ હોય.

$$\text{અહીં } q - p = r - q = s - r = t - s = d$$

$$\therefore p - 4q + 6r - 4s + t = p - 4(p + d) + 6(p + 2d) - 4(p + 3d) + p + 4d$$

$$= p - 4d + 6d - 4d + 4d = 0$$

જવાબ : (B)

(14) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીના પ્રત્યેક n પદોનો સરવાળો n^2 હોય તો તે શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત $\dots$ હોય.

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

ઉકેલ : અહીં $S_n = n^2$ છે. આથી $S_{n-1} = (n-1)^2$

$$\therefore a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1. \quad n \geq 2 \quad \text{વળી } S_1 = a_1 = 1$$

$$\therefore \text{સમાંતર શ્રેણી } 1, 3, 5, 7, \dots \text{ મળે.}$$

$$\therefore \text{સામાન્ય તફાવત } d = 2$$

જવાબ : (B)

- (15) જો કોઈ સમીકરણ $(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + \dots + (x + 34) = 216$ સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ n પદનો સરવાળો દર્શાવે, તો $x = \dots$

(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

ઉકેલ : અહીં $(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + \dots + (x + 34) = 216$ છે.

જ્યાં $(x + 34)$ એ અંતિમ પદ છે. આથી, $l = a + (n - 1)d$ પરથી,

$$x + 34 = (x + 1) + (n - 1)3. \text{ આથી } 33 = (n - 1)3$$

$$\therefore n - 1 = 11 \quad \text{આથી } n = 12 \text{ મળે.}$$

હવે આ 12 પદોનો સરવાળો 216 છે.

$$\therefore S_{12} = \frac{12}{2} [(x + 1) + (x + 34)] = 216$$

$$\therefore 6 (2x + 35) = 216$$

$$\therefore 2x + 35 = 36. \quad \text{આથી, } 2x = 1. \quad \text{આથી } x = \frac{1}{2}$$

જવાબ : (B)

- (16) જો S_n એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં પ્રથમ n પદોનો સરવાળો હોય તથા $S_{3n} = 4S_n$ હોય, તો $\frac{S_{4n}}{S_n} = \dots$

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

ઉકેલ : અહીં $S_{3n} = 4S_n$ છે.

$$\therefore \frac{3n}{2} [2a + (3n - 1)d] = 4 \cdot \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

$$\therefore 3 [2a + (3n - 1)d] = 4 \cdot [2a + (n - 1)d]$$

$$\therefore 6a + (9n - 3)d = 8a + (4n - 4)d$$

$$\therefore 2a = (5n + 1)d \quad (1)$$

$$\text{હવે } \frac{S_{4n}}{S_n} = \frac{\frac{4n}{2} [2a + (4n - 1)d]}{\frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]} = \frac{4[2a + (4n - 1)d]}{[2a + (n - 1)d]}$$

$$= \frac{4[5nd + d + 4nd - d]}{5nd + d + nd - d} \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$= 4 \left(\frac{9nd}{6nd} \right) = 6 \quad \text{જવાબ : (C)}$$

- (17) સમીકરણ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ નાં ક્રમિક બીજ વચ્ચેનો તફાવત $\dots$ હોય.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ઉકેલ : અહીં સમીકરણ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ માટે,

$$\therefore (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$\therefore (x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\therefore x = 1, 2 \text{ કે } 3 \text{ મળે.}$$

આથી બે ક્રમિક બીજ વચ્ચેનો તફાવત 1 મળે.

જવાબ : (A)

(18) સમીકરણ $\log_{\sqrt{2}} x + \log_{\sqrt[4]{2}} x + \log_{\sqrt[6]{2}} x + \dots + \log_{\sqrt[32]{2}} x = 136$ હોય, તો $x = \dots$ મળે.

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 2

ઉકેલ : $\log_{\sqrt{2}} x + \log_{\sqrt[4]{2}} x + \log_{\sqrt[6]{2}} x + \dots + \log_{\sqrt[32]{2}} x = 136$

$$\therefore \frac{\log x}{\log \sqrt{2}} + \frac{\log x}{\log \sqrt[4]{2}} + \frac{\log x}{\log \sqrt[6]{2}} + \dots + \frac{\log x}{\log \sqrt[32]{2}} = 136$$

$$\therefore \frac{\log x}{\frac{1}{2} \log 2} + \frac{\log x}{\frac{1}{4} \log 2} + \frac{\log x}{\frac{1}{6} \log 2} + \dots + \frac{\log x}{\frac{1}{32} \log 2} = 136$$

$$\therefore \frac{2 \log x}{\log 2} + \frac{4 \log x}{\log 2} + \frac{6 \log x}{\log 2} + \dots + \frac{32 \log x}{\log 2} = 136$$

$$\therefore (2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 32) \log_2 x = 136$$

$$\therefore \frac{16}{2} (2+32) \log_2 x = 136$$

$$\therefore 8(34) \log_2 x = 136$$

$$\therefore \log_2 x = \frac{136}{34 \times 8} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

જવાબ : (B)

(19) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું છઠ્ઠું પદ 2 હોય તથા જો તેના પ્રથમ, ચતુર્થ તથા પાંચમા પદનો ગુણાકાર ન્યૂનતમ હોય, તો તે શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત હોય.

(A) $\frac{8}{5}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{5}{8}$

ઉકેલ : ધારો કે સમાંતર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત d છે તથા તેનું પ્રથમ પદ a છે.

$$\text{હવે } t_6 = 2 \quad \text{આથી } a + 5d = 2 \quad (1)$$

$$\text{વળી, } t_4 = a + 3d \quad \text{તથા } t_5 = a + 4d \text{ હોવાથી,}$$

$$t_1 \cdot t_4 \cdot t_5 = a(a + 3d)(a + 4d) = F(d) \text{ ધારતાં,}$$

$$F(d) = (2 - 5d)(2 - 5d + 3d)(2 - 5d + 4d) \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$= (2 - 5d)(2 - 2d)(2 - d)$$

$$= (2 - 5d)(4 - 6d + 2d^2)$$

$$= -2(5d^3 - 17d^2 + 16d - 4)$$

$$\text{હવે ન્યૂનતમ કિંમત માટે } F'(d) = 0$$

$$\therefore -2(15d^2 - 34d + 16) = 0$$

$$\therefore -2(5d - 8)(3d - 2) = 0$$

$$\therefore d = \frac{8}{5} \text{ અથવા } d = \frac{2}{3}$$

$$\text{હવે } F''(d) = -2(30d - 34)$$

$$d = \frac{8}{5} \text{ લેતાં, } F''(d) = -2(30d - 34) = -28 < 0$$

$\therefore F(d)$ સ્થાનિક મહત્તમ થાય.

$\therefore d = \frac{2}{3}$ લેતાં $F''(d) = 28 > 0$. આથી $F(d)$ એ $d = \frac{2}{3}$ માટે સ્થાનિક ન્યૂનતમ છે. જવાબ : (B)

(20) જો $\frac{a-x}{px} = \frac{a-y}{qy} = \frac{a-z}{rz}$ હોય તથા p, q, r સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો x, y, z એ શ્રેણીમાં હોય.

(A) સમગુણોત્તર (B) સમાંતર-સમગુણોત્તર (C) સમાંતર (D) સ્વરિત

ઉકેલ : અહીં p, q, r સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2q = p + r \quad (1)$$

$$\text{હવે, } \frac{a-x}{px} = \frac{a-y}{qy} = \frac{a-z}{rz} = k \text{ લેતાં,}$$

$$\frac{a-x}{kx} = p, \frac{a-y}{ky} = q, \frac{a-z}{kz} = r \text{ મળે.}$$

$$\therefore (1) \text{ પરથી, } 2\left(\frac{a-y}{ky}\right) = \left(\frac{a-x}{kx}\right) + \left(\frac{a-z}{kz}\right) \quad \text{આથી } 2\left(\frac{a-y}{y}\right) = \left(\frac{a-x}{x}\right) + \left(\frac{a-z}{z}\right)$$

$$\therefore \frac{2a-2y}{y} = \frac{az-zx+ax-zx}{zx} \quad \text{આથી } \frac{2a}{y} = \frac{a}{x} + \frac{a}{z}$$

$$\therefore \frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z} \quad \text{આથી } x, y, z \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (D)

(21) કોઈ વધતી સમાંતર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદોનો સરવાળો 51 છે તથા તેના પ્રથમ અને ત્રીજા પદનો ગુણાકાર 273 હોય, તો તે શ્રેણીનું ત્રીજું પદ હોય.

(A) 9 (B) 13 (C) 17 (D) 21

ઉકેલ : ધારો કે વધતી સમાંતર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદો $a-d, a, a+d$ છે. તેમનો સરવાળો 51 છે.

$$\therefore 3a = 51, \quad \text{આથી } a = 17$$

$$\text{હવે, } (a-d)(a+d) = 273$$

$$\therefore a^2 - d^2 = 273$$

$$\therefore 289 - d^2 = 273. \quad \text{આથી } d^2 = 16. \quad \text{આથી } d = \pm 4.$$

$$d = 4 \text{ લેતાં, } a-d = 13, a = 17, a+d = 21 \text{ મળે. (વધતી શ્રેણી માટે } d = 4 \text{ લેવું જરૂરી છે.) જવાબ : (D)}$$

(22) જો $x^2(y+z), y^2(z+x), z^2(x+y)$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો x, y, z એ શ્રેણીમાં હોય ($xy + yz + zx = 0$)

(A) સ્વરિત (B) સમાંતર (C) સમગુણોત્તર (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

$$\text{ઉકેલ : } 2y^2(z+x) = z^2(x+y) + x^2(y+z)$$

$$\therefore z^2x + z^2y + x^2y + x^2z - 2y^2z - 2y^2x = 0$$

$$\therefore xz(x+z-2y) + y(z^2+x^2+2xz-4y^2) - 2y^2(z+x-2y) = 0$$

$$\therefore xz(x+z-2y) + y(z+x-2y)(z+x+2y) - 2y^2(z+x-2y) = 0$$

$$\therefore (z+x-2y)(zx+yz+xy+2y^2-2y^2)$$

$$\therefore z+x-2y = 0 \text{ અથવા } xy+yz+zx = 0$$

$$\text{જો } xy+yz+zx \neq 0 \text{ હોય તો } z+x-2y = 0$$

$$\therefore x, y, z \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (B)

(23) કોઈ સમાંતર શ્રેણી $\{a_n\}$ માટે, $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - a_4^2 + \dots + a_{99}^2 - a_{100}^2 = \dots$

(A) $\frac{50}{99} (a_1^2 - a_{100}^2)$ (B) $\frac{100}{99} (a_{100}^2 - a_1^2)$ (C) $\frac{50}{51} (a_1^2 - a_{100}^2)$ (D) $\frac{51}{50} (a_1^2 - a_{50}^2)$

ઉકેલ : સમાંતર શ્રેણી $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ માટે,

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots = a_{100} - a_{99} = d \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \therefore (a_1^2 - a_2^2) + (a_3^2 - a_4^2) + \dots + (a_{99}^2 - a_{100}^2) \\ = (a_1 - a_2)(a_1 + a_2) + (a_3 - a_4)(a_3 + a_4) + \dots + (a_{99} - a_{100})(a_{99} + a_{100}) \\ = (-d)(a_1 + a_2) + (-d)(a_3 + a_4) + \dots + (-d)(a_{99} + a_{100}) \\ = -d(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{100}) \\ = -d \cdot \frac{100}{2} [a_1 + a_{100}] \\ = -50d \frac{(a_1 + a_{100})(a_1 - a_{100})}{(a_1 - a_{100})} \end{aligned}$$

$$= \frac{-50d(a_1^2 - a_{100}^2)}{a_1 - (a_1 + 99d)} = \frac{-50d(a_1^2 - a_{100}^2)}{-99d} = \frac{50}{99} (a_1^2 - a_{100}^2) \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(24) જો દ્વિઘાત સમીકરણ $ax^2 + bx + c = 0$ નાં બે બીજનો સરવાળો એ બીજના વર્ગના વ્યસ્તના સરવાળા બરાબર હોય, તો $bc^2, ca^2, ab^2, \dots$ શ્રેણીમાં હોય.

(A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : ધારો કે દ્વિઘાત સમીકરણ $ax^2 + bx + c = 0$ નાં બીજ α અને β છે.

$$\text{અહીં } \alpha + \beta = \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} \text{ છે.}$$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{(\alpha\beta)^2} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} \quad (1)$$

$$\text{હવે } \alpha + \beta = \frac{-b}{a} \text{ તથા } \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ હોવાથી, (1) પરથી,}$$

$$\frac{-b}{a} = \frac{\frac{b^2}{a^2} - 2\left(\frac{c}{a}\right)}{\frac{c^2}{a^2}} = \frac{b^2 - 2ac}{c^2}$$

$$\therefore -bc^2 = ab^2 - 2a^2c$$

$$\therefore 2a^2c = ab^2 + bc^2$$

$$\therefore bc^2, ca^2, ab^2 \text{ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (A)

(25) જો $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તથા $\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, \dots, \frac{1}{h_{100}}$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તથા $a_1 = h_1 = 2$

તેમજ $a_{10} = h_{10} = 3$ હોય, તો $a_4 h_7 = \dots$

$$(A) \frac{1}{6}$$

$$(B) 6$$

$$(C) 3$$

$$(D) 2$$

ઉકેલ : $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. જ્યાં $a_1 = 2, a_{10} = 3$ છે.

$$\therefore a_{10} = a_1 + 9d. \quad \text{આથી, } 3 = 2 + 9d. \quad \text{આથી, } d = \frac{1}{9}$$

$$\therefore a_4 = a_1 + 3d = 2 + \frac{3}{9} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

હવે $\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, \dots, \frac{1}{h_{10}}$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, જ્યાં $h_1 = 2$ તથા $h_{10} = 3$ છે.

$$\therefore \frac{1}{h_{10}} = \frac{1}{h_1} + 9D. \quad \text{આથી } 9D = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{-1}{6}. \quad \text{આથી } D = \frac{-1}{54}$$

$$\therefore \frac{1}{h_7} = \frac{1}{h_1} + 6D = \frac{1}{2} - \frac{6}{54} = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \frac{7}{18}. \quad \text{આથી } h_7 = \frac{18}{7}$$

$$\therefore a_4 \cdot h_7 = \frac{7}{3} \cdot \frac{18}{7} = 6$$

જવાબ : (B)

$$(26) \quad 3 \cdot \overline{537} = \dots\dots$$

$$(A) \quad \frac{333}{1178}$$

$$(B) \quad \frac{1187}{333}$$

$$(C) \quad \frac{1178}{333}$$

$$(D) \quad \frac{1871}{333}$$

$$\begin{aligned} \text{ઉકેલ : } 3 \cdot \overline{537} &= 3.537537537\dots \\ &= 3 + (0.537 + 0.000537 + 0.000000537 + \dots) \\ &= 3 + \left[\frac{0.537}{1-0.001} \right] \quad (a = 0.537, r = 0.001) \\ &= 3 + \left(\frac{537}{999} \right) = 3 + \left(\frac{179}{333} \right) = \frac{999+179}{333} = \frac{1178}{333} \end{aligned}$$

$$\text{નોંધ : } 3 + \left(\frac{537}{999} \right) = \text{અનાવૃત્ત સંખ્યા} + \text{આવૃત્ત અંકોના જૂથના છેદમાં તેટલા જ નવડા.} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(27) કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદોનો સરવાળો 38 છે. તેમાં પ્રથમ તથા દ્વિતીય પદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તથા તૃતીય પદમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે તો મળતી સંખ્યાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો ત્રણેય સંખ્યાઓમાંથી નાનામાં નાની સંખ્યા હોય.

$$(A) \quad 6$$

$$(B) \quad 8$$

$$(C) \quad 12$$

$$(D) \quad 18$$

ઉકેલ : ધારો કે a, ar, ar^2 એ કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદો છે.

$$\therefore a + ar + ar^2 = 38 \quad (1)$$

હવે, પ્રથમ તથા દ્વિતીય પદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તથા તૃતીય પદમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો મળતી સંખ્યાઓ $a+1, ar+1$ તથા ar^2-1 એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2(ar+1) = a+1+ar^2-1$$

$$\therefore 2ar+2 = 38-ar \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$\therefore 3ar = 36. \quad \text{આથી } ar = 12 \quad (2)$$

$$\text{હવે, (1) પરથી, } a+12+12r = 38. \quad \text{આથી } a+12r = 26$$

$$\therefore a+12\left(\frac{12}{a}\right) = 26 \quad (r = \frac{12}{a})$$

$$\therefore a^2 - 26a + 144 = 0. \quad \text{આથી } (a-18)(a-8) = 0$$

$$\therefore a = 8 \text{ અથવા } a = 18. \quad \text{આથી નાનામાં નાની સંખ્યા 8 મળે. (સંખ્યાઓ 8, 12, 16)}$$

જવાબ : (B)

(28) જો a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય અને દ્વિઘાત સમીકરણો $ax^2 + 2bx + c = 0$ અને $dx^2 + 2ex + f = 0$ ને

એક બીજ સમાન હોય તો $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ એ શ્રેણીમાં હોય. $(a, b, c \in R^+)$

(A) સમાંતર

(B) સમગુણોત્તર

(C) સ્વરિત

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોવાથી, $b^2 = ac$

હવે, $ax^2 + 2bx + c = 0$

$$\therefore ax^2 + 2\sqrt{ac}x + c = 0$$

$$(b^2 = ac)$$

$$\therefore (\sqrt{a}x + \sqrt{c})^2 = 0$$

$$\therefore \text{એક બીજ} = -\sqrt{\frac{c}{a}}$$

હવે, $x = -\sqrt{\frac{c}{a}}$ દ્વિઘાત સમીકરણ $dx^2 + 2ex + f = 0$ નું એક બીજ છે.

$$\therefore d\left(\frac{c}{a}\right) - 2e\sqrt{\frac{c}{a}} + f = 0$$

$$\therefore \frac{dc}{a} - 2e\sqrt{\frac{c}{a}} + f = 0$$

$$\therefore \frac{dc}{a} + f = 2e\sqrt{\frac{c}{a}}$$

$$\therefore \left(\frac{d}{a} + \frac{f}{c}\right) = 2e\sqrt{\frac{1}{ac}} = 2e\left(\sqrt{\frac{1}{b^2}}\right) = \frac{2e}{b}$$

$\therefore \frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

જવાબ : (A)

(29) શ્રેણી $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^2 + \dots$ ની પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો મળે.

$$(A) \frac{(x^{40}-1)}{x^2-1} + 40 \quad (B) \left(\frac{x^{42}+1}{x^{40}}\right) - 40 \quad (C) \frac{(x^{40}-1)}{x^2-1} \left(\frac{x^{42}+1}{x^{40}}\right) + 40 \quad (D) \left(\frac{x^{40}-1}{x^2-1}\right) \left(\frac{x^{42}+1}{x^{40}}\right)$$

$$\text{ઉકેલ : } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^2 + \dots + \left(x^{20} + \frac{1}{x^{20}}\right)^2$$

$$= (x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{40}) + \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6} + \dots + \frac{1}{x^{40}}\right) + 40$$

$$= \frac{x^2[(x^2)^{20}-1]}{x^2-1} + \frac{\frac{1}{x^2}\left(1-\frac{1}{(x^2)^{20}}\right)}{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} + 40$$

$$= \frac{x^2(x^{40}-1)}{x^2-1} + \frac{(x^{40}-1)}{(x^2-1)x^{40}} + 40$$

$$= \left(\frac{x^{40}-1}{x^2-1}\right) \left(x^2 + \frac{1}{x^{40}}\right) + 40 = \left(\frac{x^{40}-1}{x^2-1}\right) \left(\frac{x^{42}+1}{x^{40}}\right) + 40$$

જવાબ : (C)

- (30) જો ΔABC ની બાજુઓનાં માપ a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય અને $\log a - \log 2b, \log 2b - \log 3c, \log 3c - \log a$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો ΔABC નો પ્રકાર..... હોય
- (A) કાટકોણ (B) લઘુકોણ (C) ગુરુકોણ (D) સમબાજુ

ઉકેલ : ΔABC ની બાજુઓનાં માપ a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore b^2 = ac \quad (1)$$

હવે, $\log a - \log 2b, \log 2b - \log 3c, \log 3c - \log a$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે એટલે કે,

$$\therefore \log \left(\frac{a}{2b} \right), \log \left(\frac{2b}{3c} \right), \log \left(\frac{3c}{a} \right) \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore 2\log \left(\frac{2b}{3c} \right) = \log \left(\frac{a}{2b} \right) + \log \left(\frac{3c}{a} \right)$$

$$\therefore \log \left(\frac{2b}{3c} \right)^2 = \log \left(\frac{a}{2b} \times \frac{3c}{a} \right)$$

$$\therefore \frac{4b^2}{9c^2} = \frac{3c}{2b}$$

$$\therefore 8b^3 = 27c^3$$

$$\therefore \left(\frac{b}{c} \right)^3 = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2} \right)^3$$

$$\therefore \frac{b}{c} = \frac{3}{2}. \quad \text{હવે, } \frac{b}{c} = \frac{a}{b}. \quad \text{આથી } \frac{a}{b} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore a = 9k, b = 6k, c = 4k$$

$$\text{હવે, } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{k^2 [36 + 16 - 81]}{k^2 (2)(6)(4)} = \frac{-29}{48} < 0$$

$$\therefore A \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$$

$$\therefore \Delta ABC \text{ ગુરુકોણ ત્રિકોણ હોય.}$$

જવાબ : (C)

- (31) જો $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો $\begin{vmatrix} \log a_1 & \log a_2 & \log a_3 \\ \log a_4 & \log a_5 & \log a_6 \\ \log a_7 & \log a_8 & \log a_9 \end{vmatrix} = \dots$

- (A) 0 (B) -1 (C) $\log a_1 a_9 - 2 \log a_5$ (D) $\log a_1 a_9 - 2 \log a_1 + 4$

ઉકેલ : ધારો કે $D = \begin{vmatrix} \log a_1 & \log a_2 & \log a_3 \\ \log a_4 & \log a_5 & \log a_6 \\ \log a_7 & \log a_8 & \log a_9 \end{vmatrix}$

$$\text{હવે } a_2 = ar, a_3 = ar^2, \dots, a_9 = ar^8.$$

$$D = \begin{vmatrix} \log a & \log a + \log r & \log a + 2 \log r \\ \log a + 3 \log r & \log a + 4 \log r & \log a + 5 \log r \\ \log a + 6 \log r & \log a + 7 \log r & \log a + 8 \log r \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \log a & \log r & \log r \\ \log a + 3 \log r & \log r & \log r \\ \log a + 6 \log r & \log r & \log r \end{vmatrix} C_{12}(-1), C_{23}(-1) = 0$$

જવાબ : (A)

- (32) $(444 \dots n \text{ વખત } 4) + (6666 \dots n \text{ વખત } 6)^2 = \dots$

- (A) $\frac{4}{9} (10^n - 1)$ (B) $\frac{4}{9} (10^n - 1)^2$ (C) $\frac{9}{4} \cdot 10^n (10^n - 1)^2$ (D) $\frac{4}{9} \cdot 10^n (10^n - 1)$

$$\text{ઉકેલ : } (444 \dots n \text{ વખત } 4) = (4 + 40 + 400 + 4000 + \dots + 400 \dots 0 (n-1) \text{ વખત}) = \frac{4[10^n - 1]}{9}$$

$$(666 \dots n \text{ વખત } 6) = (6 + 60 + 600 + 6000 + \dots + 600 \dots 0 (n-1) \text{ વખત})$$

$$= \frac{6[10^n - 1]}{9} = \frac{2}{3}(10^n - 1)$$

$$\therefore (666 \dots n \text{ વખત } 6)^2 = \frac{4}{9} (10^n - 1)^2$$

$$\therefore (444 \dots n \text{ વખત } 4) + (666 \dots n \text{ વખત } 6)^2 = \frac{4}{9} (10^n - 1) + \frac{4}{9} (10^n - 1)^2$$

$$= \frac{4}{9} (10^n - 1) [1 + 10^n - 1]$$

$$= \frac{4}{9} \cdot 10^n (10^n - 1)$$

જવાબ : (D)

(33) જો દ્વિઘાત સમીકરણ $x^2 - 3x + p = 0$ નાં બીજ a તથા b હોય અને દ્વિઘાત સમીકરણ $x^2 - 12x + q = 0$ નાં

બીજ c તથા d હોય જ્યાં a, b, c, d એ વધતી સમગુણોત્તર શ્રેણી રહે, તો $\frac{q+p}{q-p} = \dots$

(A) $\frac{7}{8}$

(B) $\frac{10}{11}$

(C) $\frac{15}{17}$

(D) $\frac{17}{15}$

ઉકેલ : a તથા b એ સમીકરણ $x^2 - 3x + p = 0$ નાં બીજ હોવાથી, $a + b = 3$ તથા $ab = p$ મળે. (1)

આ જ રીતે સમીકરણ $x^2 - 12x + q = 0$ નાં બીજ c તથા d હોવાથી, $c + d = 12$ તથા $cd = q$ મળે. (2)

હવે a, b, c, d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$$b = ar, c = ar^2, d = ar^3$$

$$\text{હવે } a(r+1) = 3, ar^2(r+1) = 12, \quad (3)$$

$$(1) \text{ પરથી } a + ar = 3 \text{ અને } (2) \text{ પરથી } ar^2 + ar^3 = 12$$

$$\therefore r^2 = 4$$

$$\therefore ab = a^2r = p, cd = a^2r^5 = q \quad \text{આથી } \frac{q}{p} = r^4 = \frac{16}{1} \quad (3) \text{ પરથી}$$

$$\therefore \frac{q+p}{q-p} = \frac{17}{15}$$

જવાબ : (D)

(34) જો ત્રિઘાત સમીકરણ $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ નાં બીજ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય, તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને ?

(A) $pr^3 = q^3s$

(B) $p^3r = qs^3$

(C) $p^3q = r^3s$

(D) $pq^3 = rs^3$

ઉકેલ : ધારો કે $\frac{a}{r}, a, ar$ એ ત્રિઘાત સમીકરણ $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ નાં બીજ છે.

$$\therefore \frac{a}{r} \cdot a \cdot ar = \frac{-s}{p}. \quad \text{આથી } a^3 = \frac{-s}{p}$$

હવે a એ આપેલ ત્રિઘાત સમીકરણનું બીજ હોવાથી, સમીકરણનું સમાધાન કરે.

$$\therefore p \left\{ \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{1}{3}} \right\}^3 + q \left\{ \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{1}{3}} \right\}^2 + r \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{1}{3}} + s = 0$$

$$\therefore p \left(-\frac{s}{p} \right) + q \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{2}{3}} + r \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{1}{3}} + s = 0$$

$$\therefore q \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{2}{3}} + r \left(-\frac{s}{p} \right)^{\frac{1}{3}} = 0$$

$$\therefore \frac{q^3 s^2}{p^2} = r^3 \left(\frac{s}{p} \right)$$

$$\therefore pr^3 = q^3 s$$

જવાબ : (A)

$$(35) \quad x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{4}} \cdot x^{\frac{1}{8}} \cdot x^{\frac{1}{16}} \dots = \dots\dots$$

(A) 0

(B) 1

(C) x

(D) $\frac{1}{x}$

$$\text{ઉકેલ : } x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{4}} \cdot x^{\frac{1}{8}} \cdot x^{\frac{1}{16}} \dots = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots} = x^{\left[\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \right]} = x^{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}} = x$$

જવાબ : (C)

(36) કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રણ ભિન્ન ક્રમિક પદોના વર્ગોનો સરવાળો s^2 હોય તથા તે ત્રણ સંખ્યાઓનો સરવાળો ps હોય, તો $p^2 \in \dots\dots$ જ્યાં $r \neq \pm 1$

(A) (1, 3)

(B) $\left(\frac{1}{3}, 3 \right)$

(C) $\left(\frac{1}{3}, 1 \right)$

(D) (0, 3)

ઉકેલ : ધારો કે $\frac{a}{r}$, a , ar એ કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રણ ક્રમિક પદો છે.

$$\text{હવે } \frac{a^2}{r^2} + a^2 + a^2 r^2 = s^2 \quad (1)$$

$$\text{તથા } \frac{a}{r} + a + ar = ps \quad (2)$$

$$\text{ધારો કે } r + \frac{1}{r} = x \text{ જ્યાં } r \neq \pm 1 \text{ હોવાથી } x \neq \pm 2$$

$$\text{હવે (1) પરથી, } a^2 \left(r^2 + 1 + \frac{1}{r^2} \right) = s^2$$

$$\therefore a^2 \left[\left(r + \frac{1}{r} \right)^2 - 1 \right] = s^2. \quad \text{અર્થાત્ } a^2 (x^2 - 1) = s^2 \quad (3)$$

$$(2) \text{ પરથી, } a \left(r + 1 + \frac{1}{r} \right) = ps. \quad \text{અર્થાત્ } a (x + 1) = ps$$

$$\therefore a^2 (x + 1)^2 = p^2 s^2 \quad (4)$$

$$\therefore p^2 (x^2 - 1) = (x + 1)^2 \quad (p^2 s^2 = p^2 a^2 (x^2 - 1) = a^2 (x + 1)^2)$$

$$\therefore p^2 = \frac{(x+1)^2}{x^2-1} = \frac{x+1}{x-1}$$

$$\therefore x = \frac{p^2+1}{p^2-1}. \quad \text{અથવા} \quad r + \frac{1}{r} = \frac{p^2+1}{p^2-1}$$

$$\therefore (p^2-1)r^2 - (p^2+1)r + (p^2-1) = 0. \quad \text{અથવા} \quad b^2 - 4ac = (p^2+1)^2 - 4(p^2-1)^2 \geq 0$$

$$\therefore (p^2+1-2(p^2-1))(p^2+1+2(p^2-1)) \geq 0 \quad \text{એટલે કે} \quad (3-p^2)(3p^2-1) \geq 0$$

$$\therefore p^2 \leq 3 \quad \text{તથા} \quad p^2 \geq \frac{1}{3}$$

$$\text{પરંતુ } x \neq \pm 2. \quad \text{અથવા} \quad p^2 \neq \frac{1}{3}; 3$$

$$\therefore \frac{1}{3} < p^2 < 3 \quad \text{અથવા} \quad p^2 \in \left(\frac{1}{3}, 3\right)$$

જવાબ : (B)

(37) જો a, b, c અને d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય, તો $(a-c)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 - (a-d)^2 = \dots$

(A) 0

(B) $a(1-r)$

(C) 1

(D) $a^2(1-r^2)$

ઉકેલ : a, b, c, d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોવાથી,

$$\therefore b = ar, c = ar^2; d = ar^3$$

$$\therefore (a-c)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 - (a-d)^2$$

$$= (a-ar^2)^2 + (ar-ar^2)^2 + (ar-ar^3)^2 - (a-ar^3)^2$$

$$= a^2 [(1-r^2)^2 + r^2(1-r)^2 + r^2(1-r^2)^2 - (1-r^3)^2]$$

$$= a^2 (1-r)^2 [(1+r)^2 + r^2 + r^2(1+r)^2 - (1+r+r^2)^2]$$

$$= a^2 (1-r)^2 [1+2r+r^2+r^2+2r^3+r^4-1-r^2-r^4-2r-2r^3-2r^2]$$

$$= a^2 (1-r)^2 (0) = 0$$

જવાબ : (A)

બીજી રીત : a, b, c, d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore b^2 = ac, c^2 = bd; ad = bc$$

(1)

$$\therefore (a-c)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 - (a-d)^2$$

$$= a^2 - 2ac + c^2 + b^2 - 2bc + c^2 + b^2 - 2bd + d^2 - a^2 + 2ad - d^2$$

$$= a^2 - 2b^2 + c^2 + b^2 - 2bc + c^2 + b^2 - 2c^2 + d^2 - a^2 + 2bc - d^2$$

((1) પરથી)

$$= 0$$

(38) જો $1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{x-1} = (1+a)(1+a^2)(1+a^4)$ હોય તો $x = \dots$

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

ઉકેલ : $1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{x-1} = (1+a)(1+a^2)(1+a^4)$

$$\therefore \frac{1 \cdot [a^x - 1]}{a - 1} = (1+a)(1+a^2)(1+a^4)$$

$$\therefore 1 - a^x = (1-a)(1+a)(1+a^2)(1+a^4) = 1 - a^8$$

$$\therefore x = 8$$

જવાબ : (C)

(39) જો કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીના p, q તથા r માં પદો અનુક્રમે a, b, c હોય તો $\left(\frac{c}{b}\right)^p \left(\frac{b}{a}\right)^r \left(\frac{a}{c}\right)^q = \dots$

(A) 0

(B) 1

(C) abc

(D) $\frac{1}{abc}$

ઉકેલ : અહીં $t_p = A \cdot R^{p-1} = a$

$$t_q = A \cdot R^{q-1} = b \quad \text{તથા} \quad t_r = A \cdot R^{r-1} = c$$

$$\therefore \frac{c}{b} = R^{r-1-q+1} = R^{r-q} \quad \text{તથા} \quad \frac{b}{a} = R^{q-1-p+1} = R^{q-p} \quad \text{તથા} \quad \frac{a}{c} = R^{p-1-r+1} = R^{p-r}$$

$$\therefore \left(\frac{c}{b}\right)^p \left(\frac{b}{a}\right)^r \left(\frac{a}{c}\right)^q = (R^{r-q})^p (R^{q-p})^r (R^{p-r})^q = R^0 = 1 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

(40) કોઈ અનંત ધન સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં તમામ પદોનો સરવાળો 7 હોય અને આ તમામ પદોના ધનનો સરવાળો 49 હોય, તો તે સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય ગુણોત્તર હોય.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

ઉકેલ : ધારો કે $a, ar, ar^2, \dots$ અનંત સમગુણોત્તર શ્રેણી છે.

$$\text{હવે, } S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = 7 \quad (1)$$

વળી, આ સમગુણોત્તર શ્રેણીના તમામ પદોના ધનનો સરવાળો 49 છે.

$$a^3 + a^3r^3 + a^3r^6 + \dots = 49$$

$$\therefore S'_{\infty} = \frac{a^3}{1-r^3} = 49$$

$$\therefore \frac{a}{1-r} \cdot \frac{a^2}{(1+r+r^2)} = 49$$

$$\therefore \frac{7 \cdot a^2}{1+r+r^2} = 49. \quad \text{આથી} \quad \frac{a^2}{1+r+r^2} = 7 \quad (2)$$

$$\text{વળી, (1) પરથી, } a^2 = 49(1-r)^2 = 49(1-2r+r^2)$$

$$\therefore 49(1-2r+r^2) = 7(1+r+r^2) \quad ((2) \text{ પરથી})$$

$$\therefore 7-14r+7r^2 = 1+r+r^2$$

$$\therefore 2r^2-5r+2=0$$

$$\therefore r=2 \text{ અથવા } r=\frac{1}{2}. \quad \text{પરંતુ } |r|<1$$

$$\therefore r=\frac{1}{2} \quad \text{જવાબ : (A)}$$

$$(41) \quad \text{જો } 0 < x, y, a, b < 1 \text{ હોય, તો } \sqrt{x}(\sqrt{a}+\sqrt{x}) + \sqrt{x}(\sqrt{ab}+\sqrt{xy}) + \sqrt{x}(b\sqrt{a}+y\sqrt{x}) + \dots = \dots$$

(A) $\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{y}}$ (B) $\frac{\sqrt{ax}}{1-\sqrt{b}} + \frac{x}{1-\sqrt{y}}$ (C) $\frac{ax}{1-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{y}}$ (D) $\frac{\sqrt{ax}}{1+\sqrt{b}} + \frac{x}{1+\sqrt{y}}$

$$\text{ઉકેલ : } \sqrt{x}(\sqrt{a}+\sqrt{x}) + \sqrt{x}(\sqrt{ab}+\sqrt{xy}) + \sqrt{x}(b\sqrt{a}+y\sqrt{x}) + \dots$$

$$= (\sqrt{ax} + \sqrt{abx} + \sqrt{ab^2x} + \dots) + (x + x\sqrt{y} + xy + \dots)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{ax}}{1-\sqrt{b}}\right) + \left(\frac{x}{1-\sqrt{y}}\right) \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(42) \quad \text{જો } a = 0.2, b = \sqrt{5} \text{ તથા } x = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots \infty \text{ હોય, તો } a^{\log_b x} = \dots$$

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}
\text{ઉકેલ : } a^{\log_b x} &= (0.2)^{\log_{\sqrt{5}}(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\dots)} \\
&= \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\dots\infty\right)} \\
&= (\sqrt{5})^{-2\log_{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\dots\infty\right)} \\
&= (\sqrt{5})^{-2\log_{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right)} \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4
\end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(43) જો x, y, z એ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને ?

(A) $x + z = 2y$ (B) $y^2 = zx$ (C) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ (D) $\sqrt{zx} > y$

ઉકેલ : x, y, z એ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. } \frac{1}{y} \text{ એ } \frac{1}{x} \text{ તથા } \frac{1}{z} \text{ નો સમાંતર મધ્યક છે.}$$

$$\text{હવે } A > G \text{ હોવાથી } \frac{1}{y} > \frac{1}{\sqrt{zx}}$$

$$\therefore y < \sqrt{zx}$$

જવાબ : (D)

$$\text{નોંધ : } G > H. \text{ આથી } \sqrt{xz} > y.$$

(44) જો x, y, z એ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો $\frac{x}{y+z}, \frac{y}{z+x}, \frac{z}{x+y}$ શ્રેણીમાં હોય.

(A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : x, y, z એ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{z+x}{xz}. \text{ આથી } 2zx = xy + yz \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
\frac{y+z}{x} + \frac{x+y}{z} &= \frac{yz+z^2+x^2+xy}{zx} \\
&= \frac{z^2+x^2+2zx}{zx} \quad ((1) \text{ પરથી}) = \frac{(z+x)^2}{zx} = (z+x) \left(\frac{z+x}{zx} \right) = \frac{2(z+x)}{y}
\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{y+z}{x}, \frac{z+x}{y}, \frac{x+y}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{x}{y+z}, \frac{y}{z+x}, \frac{z}{x+y} \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (C)

$$\text{બીજી રીત : } \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{x+y+z}{x}, \frac{x+y+z}{y}, \frac{x+y+z}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore 1 + \frac{y+z}{x}, 1 + \frac{z+x}{y}, 1 + \frac{x+y}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{y+z}{x}, \frac{z+x}{y}, \frac{x+y}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{x}{y+z}, \frac{y}{z+x}, \frac{z}{x+y} \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

(45) જો a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, b, c, d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તથા c, d, e સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો a, c, e શ્રેણીમાં હોય.

(A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2b = a + c \quad (1)$$

b, c, d સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore c^2 = bd \quad (2)$$

c, d, e સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.

$$\text{આથી } d = \frac{2ce}{c+e}$$

(1) તથા (2) પરથી,

$$c^2 = \left(\frac{a+c}{2} \right) \left(\frac{2ce}{c+e} \right) = \frac{ce(a+c)}{(c+e)}. \text{ આથી } c = \frac{e(a+c)}{c+e} \quad (3)$$

$$\therefore c^2 + ce = ae + ec$$

$$\therefore c^2 = ae$$

$\therefore a, c, e$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

બીજી રીત : (3) થી

$$\frac{c}{e} = \frac{a+c}{c+e} = \frac{a+c-c}{c+e-e}$$

$$= \frac{a}{c}$$

$$\therefore c^2 = ae$$

જવાબ : (B)

(46) જો x, y, z એ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો $\frac{x+y}{y-x} + \frac{y+z}{y-z} = \dots\dots$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

ઉકેલ : x, y, z સ્વરિત શ્રેણીમાં છે. આથી $y = \frac{2zx}{z+x} \quad (1)$

$$\therefore \frac{y}{x} = \frac{2z}{z+x}$$

$$\therefore \frac{y+x}{y-x} = \frac{2z+z+x}{2z-z-x} = \frac{3z+x}{z-x} \quad (\text{યોગ-વિયોગ પ્રમાણ}) \quad (2)$$

$$\text{હવે (1) પરથી, } \frac{y}{z} = \frac{2x}{z+x}$$

$$\therefore \frac{y+z}{y-z} = \frac{2x+z+x}{2x-z-x} = \frac{3x+z}{x-z} \quad (\text{યોગ-વિયોગ પ્રમાણ}) \quad (3)$$

$\therefore$ (2) તથા (3) પરથી,

$$\frac{y+x}{y-x} + \frac{y+z}{y-z} = \frac{3z+x}{z-x} + \frac{3x+z}{x-z}$$

$$= \frac{3z+x}{z-x} - \frac{3x+z}{z-x} = \frac{2z-2x}{z-x} = 2$$

જવાબ : (B)

(47) જો કોઈ સ્વરિત શ્રેણીના p, q, r માં પદો અનુક્રમે x, y, z હોય, તો $\begin{vmatrix} yz & xz & xy \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots$

- (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{xyz}$ (D) xyz

ઉકેલ : અહીં t_p, t_q, t_r સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.

$$\begin{vmatrix} yz & xz & xy \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = xyz \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & \frac{1}{y} & \frac{1}{z} \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} R_1 \left(\frac{1}{xyz} \right)$$

$$= xyz \begin{vmatrix} a+(p-1)d & a+(q-1)d & a+(r-1)d \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{જવાબ : (A)}$$

(48) જો a, b, c એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય p, q, r સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય અને pa, qb, cr એ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં

હોય, તો $\frac{p}{r} + \frac{r}{p} = \dots$

- (A) $\frac{a}{c} - \frac{c}{a}$ (B) $\frac{a}{b} - \frac{b}{c}$ (C) $\frac{a}{c} + \frac{c}{a}$ (D) $\frac{p}{q} + \frac{q}{r}$

ઉકેલ : a, b, c એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. આથી $2b = a + c$ (1)

p, q, r સ્વરિત શ્રેણીમાં છે. આથી $\frac{2}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{r} = \frac{p+r}{pr}$

આથી $p + r = \frac{2pr}{q}$ (2)

pa, qb, rc સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$\therefore q^2b^2 = pacr$ (3)

$$\text{હવે, } \frac{p}{r} + \frac{r}{p} = \frac{p^2+r^2}{pr} = \frac{(p+r)^2-2pr}{pr}$$

$$= \frac{\frac{4p^2r^2}{q^2}-2pr}{pr} \quad ((2) \text{ પરથી})$$

$$= \frac{4pr}{q^2} - 2$$

$$= \frac{4b^2}{ac} - 2 \quad ((3) \text{ પરથી})$$

$$= \frac{(a+c)^2}{ac} - 2 = \frac{a^2+c^2}{ac} = \frac{a}{c} + \frac{c}{a} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(49) જો $\frac{a^n + b^n}{a^{n-1} + b^{n-1}}$ એ સંખ્યાઓ a અને b નો સમાંતર મધ્યક હોય, તો $n = \dots\dots$ ($a \neq b$)

(A) 0

(B) - 1

(C) 1

(D) 2

ઉકેલ : સમાંતર મધ્યક $A = \frac{a+b}{2} = \frac{a^n + b^n}{a^{n-1} + b^{n-1}}$

$$\therefore a^n + ab^{n-1} + ba^{n-1} + b^n = 2a^n + 2b^n$$

$$\therefore ab^{n-1} + ba^{n-1} = a^n + b^n$$

$$\therefore ab^{n-1} - b^n = a^n - ba^{n-1}$$

$$\therefore b^{n-1}(a - b) = a^{n-1}(a - b)$$

જો $a \neq b$ તો $a^{n-1} = b^{n-1}$

હવે $a \neq b$ હોવાથી $n - 1 = 0$. આથી $n = 1$

જવાબ : (C)

(50) સંખ્યાઓ 2 અને 23 વચ્ચે કુલ છ સમાંતર મધ્યકો આવેલાં હોય, તો આ તમામ સમાંતર મધ્યકોનો સરવાળો થાય.

(A) 57

(B) 63

(C) 70

(D) 75

ઉકેલ : $a = 2, b = 23; n = 6, d = \frac{b-a}{n+1} = \frac{21}{7} = 3$

ધારો કે $a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d$ આ છ સમાંતર મધ્યકો સંખ્યાઓ 2 અને 23 ની વચ્ચે આવેલાં છે.

$\therefore$ છ સમાંતર મધ્યકોનો સરવાળો $= 6a + 21d = 6(2) + 21(3) = 12 + 63 = 75$ જવાબ : (D)

(51) સંખ્યાઓ 5 અને 21 ની વચ્ચે n સમાંતર મધ્યકો ઉમેરતાં બનતી સમાંતર શ્રેણીનાં તમામ પદોનો સરવાળો 117 થાય તો $n = \dots\dots$

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

ઉકેલ : અહીં $a = 5, b = 21$ તથા $d = \frac{b-a}{n+1}$

$$\text{અહીં } S_{n+2} = \frac{n+2}{2} (a + b)$$

$$\therefore 117 = \frac{n+2}{2} (a + b) = \frac{n+2}{2} (26) = 13 (n + 2)$$

$$\therefore 9 = n + 2 \quad \text{આથી } n = 7$$

જવાબ : (C)

(52) કોઈ બે ભિન્ન સંખ્યાઓ a અને b નો સમાંતર મધ્યક 2, ગુણોત્તર મધ્યક 4 હોય તો તે બે સંખ્યાઓનો સ્વરિત મધ્યક મળે.

(A) 4

(B) 2

(C) 6

(D) 8

ઉકેલ : અહીં $A = \frac{a+b}{2} = 2$. આથી $a + b = 4$ (1)

$$G = \sqrt{ab} = 4. \quad \text{આથી } ab = 16 \quad (2)$$

$$\therefore H = \frac{2ab}{a+b} = \frac{2(16)}{4} = 8$$

$$\text{અથવા } AH = G^2 \text{ પરથી } H = \frac{G^2}{A} = \frac{16}{2} = 8$$

જવાબ : (D)

(53) બે સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચે સમાંતર મધ્યકો A , તથા A_2 . સમગુણોત્તર મધ્યકો G_1 , G_2 તથા સ્વરિત મધ્યકો

$$H_1 \text{ અને } H_2 \text{ હોય, તો } \frac{A_1 + A_2}{H_1 + H_2} = \dots\dots$$

$$(A) \frac{A_1 A_2}{G_1 G_2}$$

$$(B) \frac{G_1 G_2}{A_1 A_2}$$

$$(C) \frac{G_1 G_2}{H_1 H_2}$$

$$(D) \frac{H_1 H_2}{G_1 G_2}$$

ઉકેલ : અહીં a , A_1 , A_2 , b સમાંતર શ્રેણી રહે.

$$\therefore A_1 = \frac{a + A_2}{2}, \quad A_2 = \frac{A_1 + b}{2}$$

$$\therefore A_1 + A_2 = \frac{a + A_1 + A_2 + b}{2}$$

$$\therefore A_1 + A_2 = a + b \quad (1)$$

આ જ રીતે, a , G_1 , G_2 , b સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોવાથી $G_1 = \sqrt{aG_2}$ અને $G_2 = \sqrt{bG_1}$

$$\therefore G_1 G_2 = \sqrt{abG_1 G_2} \quad \text{આથી} \quad G_1 G_2 = ab \quad (2)$$

તથા a , H_1 , H_2 , b સ્વરિત શ્રેણીમાં હોવાથી $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{H_1}$, $\frac{1}{H_2}$, $\frac{1}{b}$ સમાંતર શ્રેણીમાં થાય.

$$\therefore \frac{1}{H_1} + \frac{1}{H_2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad (3)$$

$$\text{આથી } \frac{H_1 + H_2}{H_1 H_2} = \frac{a + b}{ab} = \frac{A_1 + A_2}{G_1 G_2}$$

$$\therefore \frac{A_1 + A_2}{H_1 + H_2} = \frac{G_1 G_2}{H_1 H_2} \quad ((2) \text{ પરથી}) \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(54) જો બે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a અને b ના સ્વરિત મધ્યક અને સમગુણોત્તર મધ્યકનો ગુણોત્તર 4:5 હોય તો તે બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર મળે.

$$(A) 1 : 4$$

$$(B) 4 : 1$$

$$(C) 3 : 4$$

$$(D) 4 : 3$$

ઉકેલ : અહીં સ્વરિત મધ્યક $H = \frac{2ab}{a+b}$ તથા ગુણોત્તર મધ્યક $G = \sqrt{ab}$ છે.

$$\text{વળી, } \frac{2ab}{\sqrt{ab}(a+b)} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \frac{2\sqrt{ab}}{a+b} = \frac{4}{5} \quad \text{આથી } 2a - 5\sqrt{ab} + 2b = 0$$

$$\therefore (\sqrt{a} - 2\sqrt{b})(2\sqrt{a} - \sqrt{b}) = 0$$

$$\therefore \frac{a}{b} = 4 \quad \text{અથવા} \quad \frac{1}{4}$$

બીજી રીત :

$$\frac{A}{G} = \frac{5}{4} \quad \left(\frac{A}{G} = \frac{G}{H} \right)$$

$$\therefore \frac{a+b}{2\sqrt{ab}} = \frac{5}{4}$$

$$\therefore 4(a+b)^2 = 25ab$$

$$\therefore 4a^2 - 17ab + 4b^2 = 0$$

$$\therefore (4a-b)(a-4b) = 0$$

$$\therefore \frac{a}{b} = 4 \text{ or } \frac{1}{4}$$

જવાબ : (A), (B)

(55) જો a , b , c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય અને x એ a તથા b નો સમાંતર મધ્યક હોય તથા y એ b અને c નો

સમાંતર મધ્યક હોય તો $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \dots\dots$

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) 2$$

$$(C) \frac{2}{a}$$

$$(D) \frac{2}{b}$$

ઉકેલ : a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે. આથી $b^2 = ac$ (1)

હવે x એ a તથા b નો સમાંતર મધ્યક છે. આથી $x = \frac{a+b}{2}$ (2)

તેમજ y એ b તથા c નો સમાંતર મધ્યક છે. આથી $y = \frac{b+c}{2}$ (3)

$$\begin{aligned} \text{હવે } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{x+y}{xy} = \frac{\frac{a+b}{2} + \frac{b+c}{2}}{\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b+c}{2}\right)} \\ &= \frac{2(a+2b+c)}{(ab+ac+bc+b^2)} = \frac{2(a+c+2b)}{(ab+b^2+bc+b^2)} \end{aligned} \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$= \frac{2(a+c+2b)}{(ab+bc+2b^2)} = \frac{2(a+c+2b)}{b(a+c+2b)}$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{b}$$

જવાબ : (D)

બીજી રીત :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} = \frac{2}{a+\sqrt{a}\sqrt{c}} + \frac{2}{\sqrt{a}\sqrt{c}+c} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}(\sqrt{a}+\sqrt{c})} + \frac{2}{\sqrt{c}(\sqrt{a}+\sqrt{c})} \\ &= \frac{2(\sqrt{a}+\sqrt{c})}{\sqrt{a}\sqrt{c}(\sqrt{a}+\sqrt{c})} = \frac{2}{\sqrt{ac}} = \frac{2}{b} \end{aligned}$$

જવાબ : (D)

(56) જો સંખ્યાઓ 1 અને $\frac{1}{a}$ વચ્ચે $H_1, H_2, H_3, \dots, H_{10}$ સ્વરિત મધ્યકો હોય, તો $\frac{H_1}{H_{10}} = \dots$

(A) $\frac{10+a}{10a+1}$ (B) $\frac{10+a}{a+1}$ (C) $\frac{10a+1}{10+a}$ (D) $\frac{10-a}{10a-1}$

ઉકેલ : અહીં 1, $H_1, H_2, H_3, \dots, H_{10}, \frac{1}{a}$ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 1, \frac{1}{H_1}, \frac{1}{H_2}, \dots, \frac{1}{H_{10}}, \frac{1}{a} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, જ્યાં } d = \frac{a-1}{11}$$

$$\text{અહીં } H_1 = \frac{1}{1+d}, H_2 = \frac{1}{1+2d}, \dots, H_{10} = \frac{1}{1+10d}$$

$$\therefore \frac{H_1}{H_{10}} = \frac{1+10d}{1+d} = \frac{1+10\left(\frac{a-1}{11}\right)}{1+\left(\frac{a-1}{11}\right)} = \frac{11+10a-10}{11+a-1} = \frac{1+10a}{10+a}$$

જવાબ : (C)

- (57) બે સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચેનો એક સમાંતર મધ્યક A હોય તથા p અને q તે બે સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચેના બે ગુણોત્તર મધ્યકો હોય, તો $2A = \dots\dots$

(A) $\frac{p^3 - q^3}{pq}$ (B) $\frac{p^3 + q^3}{pq}$ (C) $\frac{p^2 + q^2}{pq}$ (D) $\frac{p+q}{2}$

ઉકેલ : a, p, q, b સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોવાથી,

$$\sqrt{aq} = p \text{ તથા } q = \sqrt{pb} \Rightarrow aq = p^2 \text{ અને } q^2 = pb$$

$$\therefore a = \frac{p^2}{q} \text{ અને } b = \frac{q^2}{p} \quad (1)$$

હવે A સમાંતર મધ્યક હોવાથી, $A = \frac{a+b}{2}$

$$\therefore 2A = a + b = \frac{p^2}{q} + \frac{q^2}{p} = \frac{p^3 + q^3}{pq} \quad \text{જવાબ : (B)}$$

- (58) બે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચેના બે સમાંતર મધ્યકો p તથા q હોય અને G ગુણોત્તર મધ્યક હોય, તો $G^2 = \dots\dots$

(A) $(2p - q)(p - 2q)$ (B) $(2p - q)(2q + p)$ (C) $(2p + q)(2q + p)$ (D) $(2p - q)(2q - p)$

ઉકેલ : p તથા q સમાંતર મધ્યકો હોવાથી, બે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a તથા b માટે, a, p, q, b સમાંતર શ્રેણી રહે.

$$\therefore p = \frac{a+q}{2}, q = \frac{b+p}{2}$$

$$\therefore a = 2p - q, b = 2q - p \quad (1)$$

હવે $G^2 = ab$ (G ગુણોત્તર મધ્યક છે.)

$$\therefore G^2 = (2p - q)(2q - p) \quad ((1) \text{ પરથી}) \quad \text{જવાબ : (D)}$$

- (59) જો $p = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $q = \sum_{n=0}^{\infty} y^n$, $r = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$ હોય (જ્યાં $|x|, |y| < 1$) તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને ?

(A) $pq - r = pr - qr$ (B) $pq + r = pr + qr$ (C) $pr + q = pq + qr$ (D) $qr + p = pr + pq$

ઉકેલ : અહીં $p = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = \frac{1}{1-x}$

$$q = \sum_{n=0}^{\infty} y^n = (1 + y + y^2 + y^3 + \dots) = \frac{1}{1-y}$$

$$r = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n = (1 + xy + x^2y^2 + x^3y^3 + \dots) = \frac{1}{1-xy}$$

હવે $pq = \frac{1}{(1-x)(1-y)} = \frac{1}{1-x-y+xy}$

$$\begin{aligned} \therefore pq + r &= \frac{1}{1-x-y+xy} + \frac{1}{1-xy} = \frac{1-xy+1-x-y+xy}{(1-xy)(1-x-y+xy)} \\ &= \frac{2-x-y}{(1-x)(1-y)(1-xy)} \end{aligned} \quad (1)$$

$$pr = \frac{1}{(1-x)(1-yx)} \text{ તથા } qr = \frac{1}{(1-y)(1-xy)}$$

$$\begin{aligned}
\therefore pr + qr &= \frac{1}{(1-x)(1-xy)} + \frac{1}{(1-y)(1-xy)} \\
&= \frac{1-y+1-x}{(1-x)(1-y)(1-xy)} \\
&= \frac{2-x-y}{(1-x)(1-y)(1-xy)} \quad (2)
\end{aligned}$$

$\therefore$ (1) તથા (2) પરથી, $pq + r = pr + qr$ જવાબ : (B)

(60) શ્રેણી $(1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + (5^2 - 6^2) + \dots$ માટે $S_n = \dots$

(A) $-n(n+1)$ (B) $-2n(n+1)$ (C) $-n(2n+1)$ (D) $2n+1$

ઉકેલ : અહીં $(1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + (5^2 - 6^2) + \dots$ n પદ સુધી

$$= (1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots n \text{ પદ સુધી}) - (2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots n \text{ પદ સુધી})$$

$$= \sum [1 + (n-1)2]^2 - 2^2 [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots n \text{ પદ સુધી}]$$

$$= \sum (2n-1)^2 - 4(\sum n^2)$$

$$= \sum (4n^2 - 4n + 1) - 4(\sum n^2)$$

$$= 4\sum n^2 - 4\sum n + \sum 1 - 4\sum n^2$$

$$= -4\sum n + \sum 1 = \frac{-4n(n+1)}{2} + n$$

$$= -2n(n+1) + n = n(-2n-2+1)$$

$$= -n(2n+1)$$

બીજી રીત :

$$\sum [(2n-1)^2 - (2n)^2] = \sum (-4n+1)$$

$$= \frac{-4n(n+1)}{2} + n$$

$$= -2n^2 - n = -n(2n+1)$$

જવાબ : (C)

ત્રીજી રીત : $(1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + (5^2 - 6^2) + \dots + [(2n-1)^2 - (2n)^2]$

$$= (-1)[1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 2n - 1 + 2n]$$

$$= \frac{(-1)2n(2n+1)}{2} = -n(2n+1)$$

(61) શ્રેણી $i, -2, -3i, 4, 5i \dots$ ની પ્રથમ 50 પદોનો સરવાળો થાય.

(A) $25 + 25i$ (B) $-25 + 25i$ (C) $-26 - 25i$ (D) $-26 + 25i$

ઉકેલ : $i, -2, -3i, 4, 5i \dots = i, 2i^2, 3i^3, 4i^4, \dots$

$\therefore$ 50 મું પદ $50i^{50}$ થાય.

$$\therefore S_{50} = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + 5i^5 + \dots + 50i^{50} \quad (1)$$

$$\therefore iS_{50} = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + 4i^5 + 5i^6 + \dots + 50i^{51} \quad (2)$$

∴ (1) તથા (2) પરથી,

$$S_{50} - iS_{50} = i + [i^2 + i^3 + i^4 + \dots + i^{50}] - 50i^{51}$$

$$\therefore S_{50} (1 - i) = i + \frac{i^2 (1 - i^{49})}{(1 - i)} - 50i^{51}$$

$$= i - \frac{(1 - i^{48} \cdot i)}{(1 - i)} - 50i^{51} = i - \frac{(1 - i)}{(1 - i)} - 50i^{48} \cdot i^2 \cdot i$$

$$\therefore S_{50} (1 - i) = i - 1 + 50i = -1 + 51i$$

$$\therefore S_{50} = \frac{-1 + 51i}{1 - i} = \frac{-1 + 51i}{(1 - i)} \times \frac{(1 + i)}{(1 + i)}$$

$$= \frac{-1 - i + 51i + 51i^2}{1 - i^2} = \frac{-52 + 50i}{2} = -26 + 25i$$

જવાબ : (D)

(62) શ્રેણી $20, 19\frac{1}{3}, 18\frac{2}{3}, \dots$ નો મહત્તમ સરવાળો મળે.

(A) 300

(B) 310

(C) 320

(D) 340

ઉકેલ : $20, 19\frac{1}{3}, 18\frac{2}{3}, \dots$

$= \frac{60}{3}, \frac{58}{3}, \frac{56}{3}, \dots$ નું n મું પદ ધન હોય તો તમામ પદોનો સરવાળો મહત્તમ થાય અને $(n + 1)$ મું પદ ઋણ થાય.

$$\therefore a = \frac{60}{3}, d = \frac{-2}{3} \text{ લેતાં, } t_n = \frac{60}{3} + (n - 1) \left(\frac{-2}{3} \right)$$

$$= \frac{60}{3} - \frac{2n}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{62}{3} - \frac{2n}{3}$$

હવે $t_n \geq 0$ લેતાં, $62 - 2n \geq 0$. આથી $62 \geq 2n$

$$\therefore n \leq 31$$

∴ મહત્તમ સરવાળા માટે 31 પદની જરૂર પડે.

$$\therefore S_{31} = \frac{31}{2} [2(20) + (31 - 1) \left(\frac{-2}{3} \right)] = \frac{31}{2} [40 - 20] = 310$$

જવાબ : (B)

(63) શ્રેણી $\frac{1}{1+1^2+1^4} + \frac{2}{1+2^2+2^4} + \frac{3}{1+3^2+3^4} + \dots$ ના n પદોનો સરવાળો મળે.

(A) $\frac{n^2+1}{n^2+n+1}$

(B) $\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}$

(C) $\frac{n+1}{n^2+n+1}$

(D) $\frac{n-1}{2n^2+n+3}$

ઉકેલ : અહીં $\frac{1}{1+1^2+1^4} + \frac{2}{1+2^2+2^4} + \frac{3}{1+3^2+3^4} + \dots$ આપેલ છે, જેનું n મું પદ $\frac{n}{1+n^2+n^4}$ મળે.

$$\text{હવે આ તમામ પદોનો સરવાળો } S_n = \sum \frac{n}{1+n^2+n^4}$$

$$= \sum \frac{n}{(n^2+1-n)(n^2+1+n)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum \frac{2n}{(n^2+n+1)(n^2-n+1)}$$

$$\therefore S_n = \frac{1}{2} \sum \left[\frac{(n^2+n+1) - (n^2-n+1)}{(n^2+n+1)(n^2-n+1)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sum \left[\frac{1}{n^2-n+1} - \frac{1}{n^2+n+1} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{13}\right) + \dots + \left(\frac{1}{1+n(n-1)} - \frac{1}{1+n(n+1)}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{1+n(n+1)} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1+n^2+n-1}{1+n(n+1)} \right] = \frac{n(n+1)}{2(1+n^2+n)}$$

જવાબ : (B)

$$(64) \quad \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \frac{15}{16} + \frac{31}{32} + \dots \text{ ની } n \text{ પદોનો સરવાળો } \dots \text{ થાય.}$$

(IIT : 1988)

$$(A) 2^n + n - 1$$

$$(B) 2^n$$

$$(C) 2^n \cdot n - 2^n + 1$$

$$(D) 2^n - n + 1$$

$$\text{ઉકેલ : } \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \frac{15}{16} + \frac{31}{32} + \dots n \text{ પદ સુધી}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(1 - \frac{1}{8}\right) + \left(1 - \frac{1}{16}\right) + \left(1 - \frac{1}{32}\right) + \dots n \text{ પદ સુધી}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) + \left(1 - \frac{1}{2^3}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

$$= \sum \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = \sum 1 - \sum 2^{-n}$$

$$= n - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots n \text{ પદ સુધી} \right] = n - \left[\frac{\frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} \right] = n - (1 - 2^{-n}) = 2^{-n} + n - 1 \text{ જવાબ : (A)}$$

$$(65) \quad \text{જો } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = 2025 \text{ હોય, તો } n = \dots$$

$$(A) 8$$

$$(B) 9$$

$$(C) 10$$

$$(D) 11$$

$$\text{ઉકેલ : અહીં } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = 2025$$

$$\therefore \sum n^3 = 2025$$

$$\therefore \frac{n^2(n+1)^2}{4} = 2025$$

$$\therefore \frac{n(n+1)}{2} = 45$$

$$\therefore n^2 + n - 90 = 0. \quad \text{અર્થાત્ } (n+10)(n-9) = 0. \quad \text{અર્થાત્ } n = 9 \quad \text{જવાબ : (B)}$$

$$(66) \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 1 = \dots\dots$$

$$(A) \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (B) \frac{n(n+1)}{2} \quad (C) \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad (D) \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\text{ઉકેલ : } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j 1$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j \quad (\Sigma 1 = n \text{ અને } n = j)$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i(i+1)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (i^2 + i) = \frac{1}{2} [\Sigma n^2 + \Sigma n]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{n \cdot (n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right]$$

$$= \frac{n(n+1)}{4} \left[\frac{2n+1}{3} + 1 \right] = \frac{n(n+1)}{4} \left(\frac{2n+4}{3} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad \text{જવાબ : (C)}$$

$$(67) \quad \text{જો } S_n = 1 + (1+2) + (1+2+3) + (1+2+3+4) + \dots n \text{ કૌંસ સુધી હોય, તો } S_n = \dots\dots$$

$$(A) \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad (B) \frac{n^2 - n + 1}{12} \quad (C) \frac{n(2n+1)(2n-1)}{12} \quad (D) \frac{n^2 + 4n + 1}{6}$$

$$\text{ઉકેલ : અહીં } t_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \Sigma n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ મળે.}$$

$$S_n = \Sigma t_n = \sum \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum n(n+1)$$

$$= \frac{1}{2} (\sum n^2 + \Sigma n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} + \frac{n(n+1)}{4} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad \text{જવાબ : (A)}$$

$$(68) \quad \forall n \in \mathbb{N}, 1 \cdot n + 2 \cdot (n-1) + 3 \cdot (n-2) + \dots n \cdot (1) \text{ નો સરવાળો } \dots\dots \text{ મળે.}$$

$$(A) \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (B) \frac{n(n+1)(2n-1)}{6} \quad (C) \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \quad (D) \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$\text{ઉકેલ : અહીં } 1 \cdot n + 2 \cdot (n-1) + 3 \cdot (n-2) + \dots n \cdot (1) \text{ આપેલ છે.}$$

$$\text{જ્યાં દરેક પદમાં પ્રથમ અવયવ } 1, 2, 3, \dots n \text{ છે જ્યારે દ્વિતીય અવયવ } n, (n-1), (n-2), \dots 1 \text{ છે.}$$

$$\text{આથી શ્રેણીનું } r \text{ મું પદ } t_r = r [n - (r-1)] \text{ મળે.}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \sum_{r=1}^n t_r &= \sum_{r=1}^n r(n-r+1) \\
&= (n+1) \sum_{r=1}^n r - \sum_{r=1}^n r^2 \\
&= (n+1) \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)}{6} [3(n+1) - (2n+1)] \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}
\end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(69) $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4^2 + \dots + n \text{ પદ સુધી}}{1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 4 + \dots + n \text{ પદ સુધી}} = \dots$

(A) $\frac{5n+3}{5n-1}$ (B) $\frac{5n+1}{5n+3}$ (C) $\frac{3n+5}{3n+1}$ (D) $\frac{3n+1}{3n+5}$

ઉકેલ : અહીં $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4^2 + \dots + n \text{ પદ સુધી} = \sum n(n+1)^2$

તથા $1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 4 + \dots + n \text{ પદ સુધી} = \sum n^2(n+1)$

$$\begin{aligned}
\therefore \frac{1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 4^2 + \dots + n \text{ પદ સુધી}}{1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 4 + \dots + n \text{ પદ સુધી}} &= \frac{\sum n(n+1)^2}{\sum n^2(n+1)} \\
&= \frac{\sum n(n^2 + 2n + 1)}{\sum (n^3 + n^2)} \\
&= \frac{\sum (n^3 + 2n^2 + n)}{\sum (n^3 + n^2)} \\
&= \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{2 \cdot n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}}{\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} \\
&= \frac{\frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(2n+1)}{3} + 1 \right]}{\frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{3} \right]} \\
&= \frac{3n(n+1) + 4(2n+1) + 6}{3n(n+1) + 2(2n+1)}
\end{aligned}$$

$$= \frac{3n^2+11n+10}{3n^2+7n+2}$$

$$= \frac{(3n+5)(n+2)}{(3n+1)(n+2)} = \frac{3n+5}{3n+1}$$

જવાબ : (C)

(70) $1^3 + \frac{1^3+2^3}{1+3} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5} + \dots + n$ પદ સુધીનો સરવાળો હોય.

(A) $\frac{2n^2+9n+13}{12}$ (B) $\frac{n(2n^2+9n+13)}{12}$ (C) $\frac{n(2n+9)(3n+2)}{24}$ (D) $\frac{n(2n^2+9n+13)}{24}$

ઉકેલ : $1^3 + \frac{1^3+2^3}{1+3} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5} + \dots + n$ પદ સુધીનો સરવાળો લેતાં,

$$t_n = \frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{1+3+5+\dots+(2n-1)} = \frac{\Sigma n^3}{\Sigma (2n-1)} = \frac{n^2(n+1)^2}{4n^2} = \frac{n^2+2n+1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \Sigma t_n = \frac{1}{4} \Sigma (n^2+2n+1) \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)}{2} + n \right] \\ &= \frac{n}{4} \left[\frac{2n^2+3n+1+6(n+1)+6}{6} \right] \\ &= \frac{n(2n^2+9n+13)}{24} \end{aligned}$$

જવાબ : (D)

(71) $2 + 12 + 36 + 80 + 150 + \dots$ નો પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો મળે.

(A) 64970

(B) 64790

(C) 49670

(D) 46970

ઉકેલ : અહીં $2 + 12 + 36 + 80 + 150 + \dots$ 20 પદ સુધીનો સરવાળો લેવા, માટે $2 + 12 + 36 + 80 + 150 + \dots$ ન પદ સુધીનો સરવાળો શોધી $n = 20$ મૂકવું પડે.

$$S_n = 1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 \cdot 4 + 4^2 \cdot 5 + 5^2 \cdot 6 + \dots + n^2(n+1)$$

$$\therefore S_n = \Sigma n^2(n+1) = \Sigma (n^3+n^2)$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{20} &= \sum_{i=1}^{20} i^3 + \sum_{i=1}^{20} i^2 = \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]_{n=20} \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]_{n=20} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{3} \right]_{n=20} \\ &= \frac{20(21)}{2} \left[\frac{20(21)}{2} + \frac{41}{3} \right] \\ &= \frac{210}{6} [1260 + 82] = \frac{210(1342)}{6} = 70(671) = 46970 \end{aligned}$$

જવાબ : (D)

(72) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = \dots$

(A) $(n+1)! - n$

(B) $(n+1)! - 1$

(C) $n! - 1 + n$

(D) $n! + 1 - n$

ઉકેલ : $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n!$

$$= \sum [(n+1) - 1] n!$$

$$= \sum (n+1) \cdot n! - \sum n!$$

$$= \sum (n+1)! - \sum (n!)$$

$$= (2! - 1!) + (3! - 2!) + \dots + ((n+1)! - n!)$$

$$= (n+1)! - 1$$

જવાબ : (B)

(73) $\frac{3}{1^2} + \frac{5}{1^2+2^2} + \frac{7}{1^2+2^2+3^2} + \dots$ ન પદ સુધીનો સરવાળો મળે.

(A) $\frac{6n^2}{n+1}$

(B) $\frac{6n}{n+1}$

(C) $\frac{6(2n-1)}{n+1}$

(D) $\frac{3(n^2+1)}{n+1}$

ઉકેલ : અહીં 3, 5, 7, ... સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore t_n = 2n + 1$$

$$\text{શ્રેણીનું } n \text{ મું પદ } t_n = \frac{2n+1}{1^2+2^2+\dots+n^2} = \frac{2n+1}{\sum n^2}$$

$$= \frac{(2n+1) 6}{n(n+1)(2n+1)} = \frac{6}{n(n+1)}$$

$$\text{હવે } n \text{ પદોનો સરવાળો} = \sum t_n$$

$$= 6 \sum \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= 6 \sum \left(\frac{n+1-n}{n(n+1)} \right) = 6 \sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= 6 \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right]$$

$$= 6 \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] = \frac{6n}{n+1}$$

જવાબ : (B)

(74) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \frac{1}{3^5} + \frac{2}{3^6} + \dots \infty$ સુધીનો સરવાળો મળે.

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{5}{8}$

(D) $\frac{7}{8}$

ઉકેલ : $\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \frac{1}{3^5} + \frac{2}{3^6} + \dots \infty$

$$= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^5} + \dots \infty \right) + 2 \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \dots \infty \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3^2}} + 2 \left(\frac{\frac{1}{3^2}}{1 - \frac{1}{3^2}} \right) = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{9}} + 2 \left(\frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} \right) = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

જવાબ : (C)

(75) $1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 + \dots$ ના n પદ સુધીનો સરવાળો મળે.

(A) $n \cdot 2^{n+1} - 2^n + 1$

(B) $(n-1) 2^{n+1} - 2^n + 3$

(C) $(n+1) 2^n - 2^{n-1} + 1$

(D) $2^{n-1} n - n \cdot 2^n + 3$

ઉકેલ : અહીં આપેલ શ્રેઢીના પ્રથમ અવયવો 1, 3, 5, 7, ... સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore t_n = 1 + (n-1)2 = 2n-1$$

તથા દ્વિતીય અવયવો $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \dots$ છે. જ્યાં $r = 2$ છે. આથી $t'_n = 2^{n-1}$ મળે.

આમ આપેલ શ્રેઢી માટે $T_n = (2n-1) \cdot 2^{n-1}$ થાય.

$$S_n = 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 + \dots + (2n-1) \cdot 2^{n-1} \quad (1)$$

(1) ને 2 વડે ગુણતાં,

$$2S_n = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2^3 + 7 \cdot 2^4 + \dots + (2n-3) \cdot 2^{n-1} + (2n-1) \cdot 2^n \quad (2)$$

(1)માંથી (2) બાદ કરતાં,

$$-S_n = 1 - 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 - 5 \cdot 2^3 + \dots + (2n-1) \cdot 2^{n-1} - (2n-3) \cdot 2^{n-1} - (2n-1) \cdot 2^n$$

$$\therefore -S_n = 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \dots + 2 \cdot 2^{n-1} - (2n-1) \cdot 2^n$$

$$\therefore -S_n = 1 + 2 [2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}] - (2n-1) \cdot 2^n$$

$$= 1 + 2 \left[\frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1} \right] - (2n-1) \cdot 2^n$$

$$= 1 + 2^2 (2^{n-1} - 1) - (2n-1) \cdot 2^n$$

$$= 1 + 2^{n+1} - 4 - n \cdot 2^{n+1} + 2^n$$

$$= (1-n) \cdot 2^{n+1} + 2^n - 3$$

$$\therefore S_n = (n-1) 2^{n+1} - 2^n + 3$$

જવાબ : (B)

બીજી રીત :

આપેલ શ્રેઢી સમાંતર-સમગુણોત્તર શ્રેઢી છે.

$$\text{જ્યાં } t_n = [a + (n-1)d]r^{n-1} \text{ છે તથા } S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{d r(1-r^{n-1})}{(1-r)^2} - \frac{[a+(n-1)d]r^n}{(1-r)} \text{ છે}$$

અહીં $a = 1, d = 2$ તથા $r = 2$ છે.

$$\therefore S_n = \frac{1}{1-2} + \frac{2 \cdot 2(1-2^{n-1})}{(1-2)^2} - \frac{[1+(n-1)2] \cdot 2^n}{(1-2)}$$

$$\therefore S_n = -1 + 4(1-2^{n-1}) + (2n-1)2^n$$

$$= -1 + 4 - 2^{n+1} + n \cdot 2^{n+1} - 2^n$$

$$= 3 + (n-1) 2^{n+1} - 2^n$$

$$\therefore S_n = (n-1) 2^{n+1} - 2^n + 3$$

(76) શ્રેઢી $3 \cdot 5 + 7 \cdot 5^2 + 11 \cdot 5^3 + \dots$ ની પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો થાય.

$$(A) \frac{2}{5} (1 + 20 \cdot 5^{39}) \quad (B) \frac{5}{2} (20 + 39 \cdot 5) \quad (C) \frac{5}{2} (1 + 39 \cdot 5^{20}) \quad (D) \frac{1}{2} (1 + 39 \cdot 5^{21})$$

ઉકેલ : અહીં આપેલ શ્રેઢી $3 \cdot 5 + 7 \cdot 5^2 + 11 \cdot 5^3 + \dots$ એ સમાંતર-સમગુણોત્તર શ્રેઢી છે. તેના પ્રથમ અવયવો 3, 7, 11...સમાંતર શ્રેણીમાં છે, જ્યાં $a = 3$, $d = 4$ તથા દ્વિતીય અવયવો $5, 5^2, 5^3 \dots$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે, જ્યાં $a = 5$, $r = 5$.

$\therefore$ સમાંતર શ્રેણીનું n મું પદ $= t_n = 3 + (n - 1)(4) = 4n - 1$ તથા સમગુણોત્તર શ્રેણીનું n મું પદ $= t_n = 5^n$ છે.

$\therefore$ શ્રેઢી નું n મું પદ $t_n = (4n - 1)5^n$ મળે.

$$\text{આથી, } S_n = 3 \cdot 5 + 7 \cdot 5^2 + 11 \cdot 5^3 + \dots + (4n - 1) 5^n \quad (1)$$

$$5S_n = 3 \cdot 5^2 + 7 \cdot 5^3 + 11 \cdot 5^4 + \dots + (4n - 5) 5^n + (4n - 1) 5^{n+1} \quad (2)$$

(1)માંથી (2) બાદ કરતાં,

$$-4S_n = 3 \cdot 5 + 7 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5^2 + 11 \cdot 5^3 - 7 \cdot 5^3 + \dots + (4n - 1) 5^n - (4n - 5) 5^n - (4n - 1) 5^{n+1} \text{ મળે.}$$

$$= 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^3 + \dots + 4 \cdot 5^n - (4n - 1) 5^{n+1} \quad \left| \begin{array}{l} n = 20 \text{ લેતાં,} \\ S_{20} = \frac{-15}{4} - \frac{25}{4} (5^{19} - 1) + \frac{79}{4} 5^{21} \\ = \frac{-15}{4} - \frac{1}{4} 5^{21} + \frac{25}{4} + \frac{79}{4} 5^{21} \\ = \frac{10}{4} + \frac{78}{4} \cdot 5^{21} = \frac{5}{2} + \frac{39}{2} \cdot 5^{21} \\ = \frac{5}{2} (1 + 39 \cdot 5^{20}) \end{array} \right.$$

$$= 15 + 4 [5^2 + 5^3 + \dots + 5^n] - (4n - 1) 5^{n+1}$$

$$= 15 + 4 \left[\frac{25 (5^{n-1} - 1)}{4} \right] - (4n - 1) 5^{n+1}$$

$$= 15 + 25 (5^{n-1} - 1) - (4n - 1) 5^{n+1}$$

$$\therefore S_n = \frac{-15}{4} - \frac{25}{4} (5^{n-1} - 1) + \frac{(4n - 1)}{4} 5^{n+1}$$

જવાબ : (C)

(77) $1 \cdot x + 4 \cdot x^2 + 7 \cdot x^3 + \dots$ ની પ્રથમ 10 પદોનો સરવાળો થાય.

$$(A) 28x^{16} + 31x^{10} - 2x + 1$$

$$(B) \frac{28x^{10} - x^9 + 1}{x - 1}$$

$$(C) \frac{82x^9 + 29x + 1}{(x - 1)^2}$$

$$(D) \frac{28x^{11} - 31x^{10} + 2x + 1}{(x - 1)^2}$$

ઉકેલ : $1 \cdot x + 4 \cdot x^2 + 7 \cdot x^3 + \dots$ એ સમાંતર-સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

જ્યાં $a = 1$, $d = 3$, $r = x$ તથા $n = 10$ છે.

$$\therefore S_{10} = \frac{1}{1 - x} + \frac{3 \cdot x(1 - x^{10-1})}{(1 - x)^2} - \frac{[1 + (10 - 1)3]x^{10}}{1 - x}$$

$$= \frac{1}{1 - x} + \frac{3x(1 - x^9)}{(1 - x)^2} - \frac{28x^{10}}{(1 - x)}$$

$$= \frac{(1 - x) + 3x(1 - x^9) - 28x^{10}(1 - x)}{(1 - x)^2}$$

$$= \frac{1 - x + 3x - 3x^{10} - 28x^{10} + 28x^{11}}{(1 - x)^2}$$

$$= \frac{28x^{11} - 31x^{10} + 2x + 1}{(x - 1)^2}$$

જવાબ : (D)

(78) કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનું ત્રીજું પદ 4 છે, તો તેનાં પ્રથમ પાંચ પદોનો ગુણાકાર હોય. (IIT : 1982)

- (A) 64 (B) 1024 (C) 256 (D) 16

ઉકેલ : ધારો કે $a, ar, ar^2 \dots$ સમગુણોત્તર શ્રેણી છે.

જ્યાં $ar^2 = 4$ છે.

$$\begin{aligned} \text{આ શ્રેણીનાં પ્રથમ 5 પદોનો ગુણાકાર} &= (a)(ar)(ar^2)(ar^3)(ar^4) \\ &= a^5 (r^{10}) = (ar^2)^5 = 4^5 = 1024 \end{aligned}$$

જવાબ : (B)

(79) જો a, b, c, d સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને? (IIT : 1970)

- (A) $a + b > c + d$ (B) $a + c > b + d$ (C) $a + d > b + c$ (D) $b + d > a + c$

ઉકેલ : a, b, c, d સ્વરિત શ્રેણીમાં હોવાથી, b એ a તથા c નો સ્વરિત મધ્યક છે તથા c એ b તથા d નો સ્વરિત મધ્યક છે.

હવે a તથા c નો સમાંતર મધ્યક એ તેના સ્વરિત મધ્યક કરતાં મોટો જ હોય.

$$\therefore \frac{a+c}{2} > b \quad \left| \quad \therefore a+c > 2b \text{ તથા } b+d > 2c \text{ થાય.} \right.$$

$$\text{આ જ રીતે, } \frac{b+d}{2} > c \quad \left| \quad \therefore a+b+c+d > 2b+2c \right.$$

$$\therefore a+d > b+c \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(80) જો a, b, c, d સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને? $a, b, c, d \in R^+$ (IIT : 1970)

- (A) $ab > cd$ (B) $ac > bd$ (C) $ad > bc$ (D) $bc = ad$

ઉકેલ : અહીં b એ a તથા c નો સ્વરિત મધ્યક છે. તથા c એ b તથા d નો સ્વરિત મધ્યક છે.

વળી, a તથા c નો ગુણોત્તર મધ્યક એ તેના સ્વરિત મધ્યક કરતાં મોટો જ હોય.

$$\therefore \sqrt{ac} > b. \text{ આથી } ac > b^2 \quad (1)$$

$$\text{આ જ રીતે, } \sqrt{bd} > c. \text{ આથી } bd > c^2 \quad (2)$$

$$(1) \text{ તથા } (2) \text{ પરથી, } abcd > b^2c^2. \quad \text{આથી } ad > bc \quad \text{જવાબ : (C)}$$

(81) જો a, b, c, d ભિન્ન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એવી મળે કે જેથી $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2p(ab + bc + cd) + (b^2 + c^2 + d^2) \leq 0$ થાય તો $a, b, c, d \dots$ શ્રેણીમાં હોય. (IIT : 1981)

- (A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : અહીં $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2p(ab + bc + cd) + (b^2 + c^2 + d^2) \leq 0$

$$\therefore (a^2p^2 - 2pab + b^2) + (b^2p^2 - 2pbc + c^2) + (c^2p^2 - 2pcd + d^2) \leq 0$$

$$\therefore (ap - b)^2 + (bp - c)^2 + (cp - d)^2 \leq 0$$

આ $(ap - b)^2 + (bp - c)^2 + (cp - d)^2 = 0$ માટે જ સત્ય હોય.

$$\therefore ap = b; bp = c; cp = d \text{ આથી } \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = \frac{d}{c} = p$$

$\therefore a, b, c, d$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે. જવાબ : (B)

(82) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ માટે, જો $x = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$, $y = \sum_{n=0}^{\infty} \sin^{2n} \theta$, $z = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta \sin^{2n} \theta$ હોય, તો નીચેનામાંથી

કયું સત્ય બને ? (IIT : 1993)

- (A) $xyz = xz + y$ (B) $xyz = xy + z$ (C) $xyz = x + y + z$ (D) $xyz = yz + x$

ઉકેલ : અહીં $x = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$

$$= 1 + \cos^2 \theta + \cos^4 \theta + \cos^6 \theta + \dots = \frac{1}{1 - \cos^2 \theta} = \operatorname{cosec}^2 \theta \quad (1)$$

આ જ રીતે, $y = \sum_{n=0}^{\infty} \sin^{2n} \theta = 1 + \sin^2 \theta + \sin^4 \theta + \sin^6 \theta + \dots = \frac{1}{1 - \sin^2 \theta} = \sec^2 \theta \quad (2)$

$$z = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta \sin^{2n} \theta = 1 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \sin^4 \theta \cos^4 \theta + \dots$$

$$\therefore z = \frac{1}{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{1}{1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y}} = \frac{xy}{xy - 1}$$

$$\text{હવે } x + y = \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$\therefore x + y = xy \quad \text{છે.}$$

$$(1) \text{ અને } (2) \text{ પરથી}$$

$$xyz = x + y + z \quad \text{જવાબ : (B),(C)}$$

(83) જો વિધેય $f(x)$ એ $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$; $\forall x, y \in \mathbb{N}$ નું સમાધાન કરે. અને $f(1) = 3$ અને

$$\sum_{x=1}^n f(x) = 120 \text{ હોય, તો } n = \dots \quad (\text{IIT : 1992})$$

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 8

ઉકેલ : $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$; $\forall x, y \in \mathbb{N} \quad (1)$

અહીં $x = y = 1$ લેતાં

$$f(1+1) = f(2) = f(1) \cdot f(1) = f(1)^2 \text{ મળે.}$$

$$\text{વળી, } f(1+2) = f(3) = f(1) \cdot f(2) = f(1) \cdot f(1)^2 = f(1)^3 \text{ મળે.}$$

આ જ રીતે ક્રમશઃ આગળ વધતાં, $f(x) = [f(1)]^x$ મળે.

$$\therefore f(x) = 3^x \quad (f(1) = 3)$$

$$\text{હવે } \sum_{x=1}^n f(x) = 120$$

$$\therefore 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = 120$$

$$\therefore \frac{3[3^n - 1]}{3 - 1} = 120. \text{ અર્થાત્ } 3^n = 81 = 3^4$$

$$\therefore n = 4$$

જવાબ : (A)

(84) જો પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો એ તેમના વર્ગોના સરવાળાથી $\frac{1}{5}$ ગણો હોય, તો $n = \dots \quad (\text{IIT : 1992})$

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

ઉકેલ : અહીં $\Sigma n = \frac{1}{5} \Sigma n^2$

$$\therefore 5 \Sigma n = \Sigma n^2 \quad \text{આથી} \quad \frac{5n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\therefore 2n + 1 = 15$$

$$\therefore n = 7$$

જવાબ : (C)

(85) $\log_3 2, \log_6 2, \log_{12} 2$, એ શ્રેણીમાં છે. (IIT : 1993)

(A) સમાંતર

(B) સમગુણોત્તર

(C) સ્વરિત

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : $\log_2 6 = \log_2 (3 \times 2) = \log_2 3 + \log_2 2 = 1 + \log_2 3$

તથા $\log_2 12 = \log_2 (4 \times 3) = \log_2 (2^2 \times 3) = 2 \log_2 2 + \log_2 3 = 2 + \log_2 3$ મળે.

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 3 + \log_2 12 &= \log_2 3 + 2 + \log_2 3 = 2 + 2 \log_2 3 \\ &= 2 (1 + \log_2 3) \\ &= 2 \log_2 6 \end{aligned}$$

$$\therefore \log_2 3, \log_2 6, \log_2 12 \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \log_3 2, \log_6 2, \log_{12} 2 \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (C)

નોંધ : $\log_2 3 + \log_2 12 = \log_2 36 = 2 \log_2 6$. આથી, $\log_2 3, \log_2 6, \log_2 12$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

(86) ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓની સમગુણોત્તર શ્રેણીનું n મું પદ a_n છે. ધારો કે $\sum_{n=1}^{100} a_{2n} = \alpha$ તથા $\sum_{n=1}^{100} a_{2n-1} = \beta$

એવા મળે કે જેથી $\alpha \neq \beta$ હોય, તો સામાન્ય ગુણોત્તર થાય. (IIT : 1992)

(A) $\frac{\alpha}{\beta}$

(B) $\frac{\beta}{\alpha}$

(C) $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$

(D) $\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$

ઉકેલ : ધારો કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a તથા સામાન્ય ગુણોત્તર r છે.

$$\text{હવે } \alpha = \sum_{n=1}^{100} a_{2n}.$$

$$\begin{aligned} \text{આથી } \alpha &= a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{200} \\ \therefore \alpha &= ar + ar^3 + ar^5 + \dots + ar^{199} = ar (1 + r^2 + r^4 + \dots + r^{198}) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{અને } \beta = \sum_{n=1}^{100} a_{2n-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \beta &= a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{199} = a + ar^2 + ar^4 + \dots + ar^{198} \\ &= a (1 + r^2 + r^4 + \dots + r^{198}) \end{aligned}$$

$$\therefore \beta = a \left(\frac{\alpha}{ar} \right) \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$\therefore \beta = \frac{\alpha}{r}$$

$$\text{આથી } r = \frac{\alpha}{\beta}$$

જવાબ : (A)

(87) ચાર સંખ્યાઓમાંથી પ્રથમ ત્રણ સંખ્યાઓ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તથા છેલ્લી ત્રણ સંખ્યાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, જેનો સામાન્ય તફાવત 6 છે. જો પ્રથમ તથા ચોથી સંખ્યાઓ સમાન હોય, તો પ્રથમ સંખ્યા હોય. (IIT : 1974)

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

ઉકેલ : ધારો કે ચાર સંખ્યાઓ $a, b, b + 6, b + 12$ છે.

$$b^2 = a(b + 6) \quad \text{તથા} \quad b + 12 = a$$

$$(a - 12)^2 = a(a - 12 + 6)$$

$$\therefore a^2 - 24a + 144 = a^2 - 6a$$

$$\therefore 18a = 144$$

$$\therefore a = 8$$

જવાબ : (D)

(88) જો a, b અને c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તથા $a^x = b^y = c^z$ હોય, તો x, y, z શ્રેણીમાં હોય. (IIT : 1970)

(A) સમાંતર (B) સમગુણોત્તર (C) સ્વરિત (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : અહીં a, b અને c સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore b^2 = ac \quad (1)$$

$$\text{ધારો કે } \frac{1}{a^x} = \frac{1}{b^y} = \frac{1}{c^z} = k,$$

$$\therefore a = k^x, b = k^y, c = k^z \text{ મળે.}$$

$$\therefore (1) \text{ પરથી, } (k^y)^2 = k^x \cdot k^z \text{ અર્થાત્ } k^{2y} = k^{x+z}$$

$$\therefore 2y = x+z \text{ અર્થાત્ } x, y, z \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (A)

(89) જો કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં n પદોનો સરવાળો S ; ગુણાકાર p તથા તમામ પદોના વ્યસ્તનો સરવાળો R હોય તો $p^2 = \dots$ (IIT : 1981)

$$(A) \frac{S}{R}$$

$$(B) \frac{R}{S}$$

$$(C) \left(\frac{R}{S}\right)^n$$

$$(D) \left(\frac{S}{R}\right)^n$$

ઉકેલ : ધારો કે $a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$ એ કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં n પદો છે.

$$\therefore S = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (1)$$

$$\text{હવે, } p = (a)(ar)(ar^2) \dots (ar^{n-1}) \text{ છે.}$$

$$\therefore p = a^n \cdot r^{1+2+3+\dots+(n-1)} = a^n \cdot r^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (2)$$

$$\text{તથા } \frac{1}{a}, \frac{1}{ar}, \frac{1}{ar^2}, \dots, \frac{1}{ar^{n-1}} \text{ નો સરવાળો } R \text{ છે.}$$

$$\therefore R = \frac{1}{a} + \frac{1}{ar} + \frac{1}{ar^2} + \dots + \frac{1}{ar^{n-1}}$$

$$= \frac{1}{a} \left[1 + \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} + \dots + \frac{1}{r^{n-1}} \right]$$

$$= \frac{1}{a} \left(\frac{1 - (r^{-1})^n}{1 - \frac{1}{r}} \right)$$

$$= \frac{1}{a} \left(\frac{(r^n - 1)r}{r^n (r - 1)} \right)$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{S}{a} \cdot r^{1-n} \right)$$

((1) પરથી)

$$\therefore a^2 \cdot r^{n-1} = \frac{S}{R} \quad (3)$$

$$\text{હવે } p^2 = \left(a^n \cdot r^{\frac{n(n-1)}{2}} \right)^2 = a^{2n} \cdot r^{n(n-1)} = [a^2 r^{(n-1)}]^n$$

$$\therefore p^2 = \left(\frac{S}{R} \right)^n$$

જવાબ : (D)

- (90) બે સંખ્યાઓનો સ્વરિત મધ્યક 4 છે, તેમનો સમાંતર મધ્યક A તથા સમગુણોત્તર મધ્યક G છે. જો $2A + G^2 = 27$ હોય, તો તે સંખ્યાઓ છે. (IIT : 1979)

(A) 5, 4

(B) 6, 4

(C) 6, 3

(D) 8, 6

ઉકેલ : ધારો કે બે સંખ્યાઓ a તથા b છે.

$$\text{અહીં } H = \frac{2ab}{a+b} = 4 \text{ છે. આથી } a + b = \frac{ab}{2} \quad (1)$$

$$2A = a + b \text{ તથા } G^2 = ab \text{ છે.}$$

$$\text{વળી, } 2A + G^2 = 27$$

$$\therefore a + b + ab = 27$$

$$\therefore \frac{ab}{2} + ab = 27. \quad \text{આથી } \frac{3}{2} ab = 27 \quad ((1) \text{ પરથી})$$

$$\therefore ab = 18$$

$$\therefore a + b = 9$$

((1) પરથી)

(નોંધ : આપેલ વિકલ્પોમાં વિકલ્પ (C)માં જ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 18 તથા સરવાળો 9 મળે છે આથી વિકલ્પ (C) સાચો જવાબ છે.)

$$\therefore a + \frac{18}{a} = 9 \quad \text{આથી } a^2 - 9a + 18 = 0 \text{ આથી } a = 6 \text{ કે } a = 3$$

$$\therefore \text{બે સંખ્યાઓ 6 અને 3 મળે.}$$

જવાબ : (C)

- (91) વિધેય $f(x)$ એ દ્વિઘાત બહુપદી $ax^2 + bx + c$ હોય તથા જો $f(1) = f(-1)$ અને a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો $f'(a), f'(b)$ અને $f'(c)$ શ્રેણીમાં હોય. (AIEEE 2003)

(A) સમાંતર

(B) સમગુણોત્તર

(C) સ્વરિત

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : ધારો કે દ્વિઘાત બહુપદી $f(x) = ax^2 + bx + c$ છે.

$$\text{વળી, } a, b, c \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. આથી, } 2b = a + c$$

$$\text{વળી, } f(1) = f(-1) \text{ આપેલ છે.}$$

$$\therefore f(1) = a + b + c \text{ તથા } f(-1) = a - b + c$$

$$\text{આથી, } a + b + c = a - b + c$$

$$\therefore 2b = 0. \quad \text{આથી } b = 0 \quad \text{આથી } c = -a$$

$$\text{હવે, } f(x) = ax^2 - a$$

$$\therefore f'(x) = 2ax$$

$$\therefore f'(a) = 2a^2, f'(b) = 2ab = 0,$$

$$f'(c) = 2ac = -2a^2$$

$$\therefore f'(a), f'(b), f'(c) \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. જવાબ : (A)}$$

- (92) સંખ્યાઓ x_1, x_2, x_3 અને y_1, y_2, y_3 સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તથા બંને શ્રેણીમાં ગુણોત્તર સમાન હોય, તો બિંદુઓ $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ હોય. (AIEEE : 2003)

- (A) એક જ રેખા પર આવેલાં બિંદુઓ (B) વર્તુળ પર આવેલાં બિંદુઓ
(C) ઉપવલય પર આવેલાં બિંદુઓ (D) ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ

ઉકેલ : ધારો કે બંને શ્રેણી માટે સામાન્ય ગુણોત્તર r હોય તો $x_2 = rx_1, x_3 = r^2x_1$, તથા $y_2 = ry_1$ અને $y_3 = r^2y_1$ મળે. હવે $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ તથા $C(x_3, y_3)$ બિંદુઓ અનુક્રમે $(x_1, y_1), (rx_1, ry_1), (r^2x_1, r^2y_1)$ થી દર્શાવાય.

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_1r & y_1r & 1 \\ x_1r^2 & y_1r^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= x_1y_1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ r & r & 1 \\ r^2 & r^2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\therefore A, B, C$ સમરેખ બિંદુઓ છે.

જવાબ : (A)

- (93) ΔABC માટે જો $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$ હોય, તો ત્રિકોણની બાજુઓ (AIEEE : 2003)

- (A) સમાંતર શ્રેણીમાં હોય (B) સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય
(C) સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય (D) $a + b = c$ નું સમાધાન કરે.

ઉકેલ : અહીં $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$ આપેલ છે.

$$\therefore a \left(\frac{1+\cos C}{2} \right) + c \left(\frac{1+\cos A}{2} \right) = \frac{3b}{2}$$

$$\therefore \frac{a}{2} + \frac{1}{2} (a \cos C) + \frac{c}{2} + \frac{1}{2} (c \cos A) = \frac{3b}{2}$$

$$\therefore \frac{a}{2} + \frac{c}{2} + \frac{1}{2} (a \cos C) + \frac{1}{2} (c \cos A) = \frac{3b}{2}$$

$$\therefore \frac{a}{2} + \frac{c}{2} + \frac{1}{2} (a \cos C + c \cos A) = \frac{3b}{2}$$

$$\therefore \frac{a+c}{2} + \frac{b}{2} = \frac{3b}{2}$$

(પ્રકેપ સૂત્ર)

$$\therefore b = \frac{a+c}{2}$$

$\therefore a, b, c$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

જવાબ : (A)

- (94) વિધેય $f: R \rightarrow R, f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in R$ તથા $f(1) = 7$ હોય, તો $\sum_{r=1}^n f(r) = \dots$

(AIEEE : 2003)

(A) $\frac{7n}{2}$

(B) $\frac{7(n+1)}{2}$

(C) $7n(n+1)$

(D) $\frac{7n(n+1)}{2}$

ઉકેલ : અહીં $f(1) = 7$ છે. આથી $f(1) = 1 \times 7$

$$f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 7 + 7 = 14 = 2 \times 7$$

$$f(3) = f(2 + 1) = f(2) + f(1) = 14 + 7 = 21 = 3 \times 7$$

$$(f(x + y) = f(x) + f(y))$$

આ જ રીતે ક્રમશઃ આગળ વધતાં, $f(n) = n \times 7$ મળે.

$$\therefore \sum_{r=1}^n f(r) = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = \frac{7n(n+1)}{2}$$

જવાબ : (D)

- (95) બે સંખ્યાઓનો સમાંતર મધ્યક તથા સમગુણોત્તર મધ્યક અનુક્રમે 9 તથા 4 છે તથા આ બે સંખ્યાઓ કોઈ દ્વિઘાત સમીકરણનાં બીજ હોય તો તે દ્વિઘાત સમીકરણ હોય. ($k \neq 0$) (AIEEE : 2004)

(A) $k(x^2 + 18x + 16) = 0$

(B) $k(x^2 - 18x - 16) = 0$

(C) $k(x^2 + 18x - 16) = 0$

(D) $k(x^2 - 18x + 16) = 0$

ઉકેલ : ધારો કે બે સંખ્યાઓ a તથા b કોઈ દ્વિઘાત સમીકરણનાં બીજ છે.

$$\text{હવે } A = \frac{a+b}{2} = 9$$

$$\therefore a + b = 18 = \text{બે બીજનો સરવાળો}$$

$$\text{વળી, } G = \sqrt{ab} = 4$$

$$\therefore ab = 16 = \text{બે બીજનો ગુણાકાર}$$

$$\therefore \text{માંગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ } k(x^2 - 18x + 16) = 0, \quad k \neq 0$$

જવાબ : (D)

- (96) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a , સામાન્ય તફાવત d તથા r મું પદ T_r હોય તથા કોઈ ધન પૂર્ણાંકો m અને

$$n \text{ (જ્યાં } m \neq n) \text{ માટે, } T_m = \frac{1}{n} \text{ તેમજ } T_n = \frac{1}{m} \text{ હોય તો } a - d = \dots\dots$$

(AIEEE : 2004)

(A) 1

(B) 0

(C) $\frac{1}{mn}$

(D) $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

ઉકેલ : અહીં $T_n = a + (n - 1)d = \frac{1}{m}$ તથા $T_m = a + (m - 1)d = \frac{1}{n}$ છે.

$$\therefore ma + (n - 1)md = 1 \text{ તેમજ } na + (m - 1)nd = 1 \text{ મળે}$$

$$\therefore (m - n)a = [(m - 1)n - (n - 1)m]d$$

$$\therefore (m - n)a = (m - n)d$$

$$\therefore a = d$$

$$(m \neq n \Rightarrow (m - n) \neq 0)$$

$$\therefore a - d = 0$$

જવાબ : (B)

(97) $\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots = \dots\dots$

(AIEEE : 2004)

(A) $\left(\frac{e^2 - 1}{2}\right)$

(B) $\frac{e^2 - 1}{2e}$

(C) $\frac{(e - 1)^2}{2e}$

(D) $\frac{e^2 - 1}{e}$

(સૂચન : $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$ નો ઉપયોગ કરો.)

ઉકેલ : $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$ માં $x = 1$ લેતાં,

$$\frac{e + \frac{1}{e}}{2} = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots$$

$$\therefore \frac{e^2+1}{2e} - 1 = \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots$$

$$\therefore \frac{e^2+1-2e}{2e} = \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots$$

$$\therefore \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} = \frac{(e-1)^2}{2e}$$

જવાબ : (C)

- (98) ΔABC નાં શિરોબિંદુઓ A, B તથા C માંથી સામેની બાજુઓ પર લંબ દોરવામાં આવે તથા લંબની લંબાઈના માપ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો $\sin A, \sin B, \sin C \dots\dots$ શ્રેણીમાં હોય. (AIEEE : 2005)

(A) સમગુણોત્તર (B) સ્વરિત (C) સમાંતર (D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

ઉકેલ : ધારો કે $\overline{AD}, \overline{BE}$ તથા $\overline{CF}$ એ ΔABC નાં શિરોબિંદુઓ A, B તથા C માંથી સામેની બાજુઓ $\overline{BC}, \overline{AC}$ તથા $\overline{AB}$ પર દોરેલા લંબ છે. તેમનાં માપ અનુક્રમે p_1, p_2 તથા p_3 છે. તથા $AB = c, BC = a, AC = b$ છે.

$$\text{હવે, } \Delta ABC \text{ નું ક્ષેત્રફળ} = \Delta = \frac{1}{2} p_1 \cdot a; \Delta = \frac{1}{2} p_2 \cdot b; \text{ તેમજ } \Delta = \frac{1}{2} p_3 \cdot c \text{ લેતાં,}$$

$$p_1 = \frac{2\Delta}{a}, p_2 = \frac{2\Delta}{b}, p_3 = \frac{2\Delta}{c} \text{ મળે.}$$

હવે p_1, p_2, p_3 સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.


$$\therefore \frac{1}{p_1}, \frac{1}{p_2}, \frac{1}{p_3} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{a}{2\Delta}, \frac{b}{2\Delta}, \frac{c}{2\Delta} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore a, b, c \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{a}{2R}, \frac{b}{2R}, \frac{c}{2R} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \sin A, \sin B, \sin C \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$



આકૃતિ 7.1

જવાબ : (C)

- (99) $a_1, a_2, a_3, \dots$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે. જો $\frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_p}{a_1+a_2+a_3+\dots+a_q} = \frac{p^2}{q^2}$ જ્યાં $p \neq q$ હોય, તો $\frac{a_6}{a_{21}} = \dots\dots$

(AIEEE : 2006)

(A) $\frac{41}{11}$

(B) $\frac{11}{41}$

(C) $\frac{2}{7}$

(D) $\frac{7}{2}$

ઉકેલ : અહીં $\frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_p}{a_1+a_2+a_3+\dots+a_q} = \frac{p^2}{q^2}$ આપેલ છે.

$$\therefore \frac{S_p}{S_q} = \frac{p^2}{q^2} \quad \text{અથવા} \quad \frac{\frac{p}{2}[2a_1+(p-1)d]}{\frac{q}{2}[2a_1+(q-1)d]} = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\therefore \frac{2a_1+(p-1)d}{2a_1+(q-1)d} = \frac{p}{q} \quad \text{અથવા} \quad \frac{a_1+\left(\frac{p-1}{2}\right)d}{a_1+\left(\frac{q-1}{2}\right)d} = \frac{p}{q} \quad (1)$$

હવે $\frac{a_6}{a_{21}} = \frac{a+5d}{a+20d}$ આથી (1) પરથી, $\frac{p-1}{2} = 5$ તથા $\frac{q-1}{2} = 20$ લઈ શકાય.

$\therefore p = 11$ તથા $q = 41$ થાય. આથી $\frac{a_6}{a_{21}} = \frac{p}{q} = \frac{11}{41}$ જવાબ : (B)

(100) $\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \dots = \dots$ (AIEEE 2007)

(A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{1}{e}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (D) $\sqrt{e}$

[સૂચન : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ નો ઉપયોગ કરો.]

ઉકેલ : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ માં $x = -1$ લેતાં,

$\therefore \frac{1}{e} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \dots$

$\therefore \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \dots = \frac{1}{e}$ જવાબ : (B)

(101) ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સમાવતી સમગુણોત્તર શ્રેણીનું દરેક પદ એ ત્યાર પછી આવતાં બે પદોના સરવાળા જેટલું હોય, તો તે શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર મળે. (AIEEE : 2007)

(A) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

ઉકેલ : ધારો કે $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ જેવાં ધન પદો ધરાવતી સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં બે ક્રમિક પદોનો સામાન્ય ગુણોત્તર r છે. $r > 0$

હવે $a_{n-2} = a_{n-1} + a_n$ આપેલ છે.

$\therefore a_1 \cdot r^{n-3} = a_1 \cdot r^{n-2} + a_1 \cdot r^{n-1}$

$\therefore r^{n-3} = r^{n-3} \cdot r + r^{n-3} \cdot r^2$

$\therefore 1 = r + r^2$

$\therefore r^2 + r - 1 = 0$

$\therefore r = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. પરંતુ $r > 0$

$\therefore r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

જવાબ : (D)

(102) કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં પ્રથમ બે પદોનો સરવાળો 12 છે તથા તે જ સમગુણોત્તર શ્રેણીનાં ત્રીજા તથા ચોથા પદનો સરવાળો 48 છે. આ શ્રેણીનાં પદો ક્રમશઃ ઋણ, ધન છે, તો તે શ્રેણીનું પ્રથમ પદ હોય. (AIEEE : 2008)

(A) -4 (B) 4 (C) -12 (D) 12

ઉકેલ : ધારો કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a તથા સામાન્ય ગુણોત્તર r છે. $a_2 = ar$, $a_3 = ar^2$, $a_4 = ar^3$ મળે.

હવે $a + ar = 12$. આથી $a(1 + r) = 12$ આથી $1 + r = \frac{12}{a}$ (1)

વળી $ar^2 + ar^3 = 48$. આથી $ar^2(1 + r) = 48$ આથી $1 + r = \frac{48}{ar^2}$ મળે. (2)

(1) તથા (2) પરથી, $\frac{12}{a} = \frac{48}{ar^2}$. આથી $r^2 = 4$

$\therefore r = \pm 2$

વળી, પદો ક્રમશઃ ધન, ઋણ છે. આથી $r = -2$ લેવો પડે કારણ કે $\frac{t_2}{t_1} = \frac{ar}{a} = r < 0$

$\therefore r = -2$ લેતાં, $a + ar = 12$ પરથી $a = -12$

$\therefore$ પ્રથમ પદ $= -12$

જવાબ : (C)

- (103) એક માણસને 4500 ચલણી નોટો ગણવાની છે. તથા a_n એ n મિનિટમાં ગણાયેલી ચલણી નોટોની સંખ્યા દર્શાવવાની છે. જો $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{10} = 150$ હોય તથા $a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય કે જેથી સામાન્ય તફાવત -2 થાય, તો તે માણસને તમામ ચલણી નોટો ગણતાં લાગતો સમય મિનિટ હોય. (AIEEE : 2010)

(A) 34

(B) 125

(C) 24

(D) 135

ઉકેલ : અહીં $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{10} = 150$ છે.

હવે $a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, જ્યાં $d = -2$ છે.

$$\therefore a_{11} - a_{10} = -2$$

$$\therefore a_{11} - 150 = -2 \quad \text{આથી } a_{11} = 148$$

વળી, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 10(150) = 1500$

$\therefore$ 10 મિનિટમાં ગણાયેલી નોટોની સંખ્યા = 1500 હોવાથી, ગણવાની બાકી રહેલી નોટોની સંખ્યા = $4500 - 1500 = 3000$

$$\therefore a_{11} + a_{12} + a_{13} + \dots + a_n = 3000$$

$$\therefore \frac{(n-10)}{2} [2(a_{11}) + (n-11)(-2)] = 3000$$

$$\therefore \frac{(n-10)}{2} [2(148) - 2(n-11)] = 3000$$

$$\therefore (n-10)(159-n) = 3000$$

$$\therefore n^2 - 169n + 4590 = 0$$

$$\therefore (n-135)(n-34) = 0$$

$$\therefore n = 34 \text{ કે } n = 135$$

પરંતુ $n = 135$ લેતાં, n મું પદ ઋણ થાય, જે અશક્ય છે.

$$\therefore n = 34$$

$\therefore$ માણસને ચલણી નોટો ગણતાં લાગતો સમય 34 મિનિટ છે.

જવાબ : (A)

- (104) સમાંતર શ્રેણી 2, 5, 8, 11... ના પ્રથમ $2n$ પદોનો સરવાળો એ અન્ય સમાંતર શ્રેણી 57, 59, 61... ના પ્રથમ n પદોના સરવાળા જેટલો હોય, તો $n = \dots$ (IIT Screening : 2001)

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

ઉકેલ : સમાંતર શ્રેણી 2, 5, 8, 11... માટે $a = 2; d = 3; N = 2n$ લેતાં,

$$S_N = \frac{2n}{2} [2(2) + (2n-1)3] = n(6n+1)$$

હવે સમાંતર શ્રેણી 57, 59, 61... માટે, $a = 57, d = 2, N = n$ લેતાં,

$$S'_N = \frac{n}{2} [2(57) + (n-1)2]$$

$$= n(56+n)$$

વળી, $S_N = S'_N$ આપેલ છે.

$$\therefore n(6n+1) = n(56+n) \quad \text{આથી } 6n+1 = 56+n \quad \text{આથી } 5n = 55$$

$$\therefore n = 11$$

જવાબ : (B)

- (105) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં n પદોનો સરવાળો cn^2 હોય, તો આ તમામ પદોનાં વર્ગોનો સરવાળો મળે. (IIT : 2009)

$$(A) \frac{n(4n^2-1)c^2}{6}$$

$$(B) \frac{nc^2(4n^2+1)}{3}$$

$$(C) \frac{nc^2(4n^2-1)}{3}$$

$$(D) \frac{nc^2(4n^2+1)}{6}$$

ઉકેલ : અહીં $S_n = cn^2$ આપેલ છે.

$$\therefore S_{n-1} = c(n-1)^2$$

$$\therefore t_n = S_n - S_{n-1} = cn^2 - c(n-1)^2 = c(2n-1) \quad n \geq 2, t_1 = c$$

હવે આ તમામ n પદોના વર્ગોનો સરવાળો શોધવો છે.

$\therefore$ શ્રેણી $(c)^2, (3c)^2, (5c)^2, (7c)^2 \dots ((2n-1)c)^2$ મળે.

$$\therefore t_n = (2n-1)^2 \cdot c^2$$

$$\therefore \Sigma t_n = \Sigma c^2 (2n-1)^2$$

$$= c^2 \Sigma (2n-1)^2$$

$$= c^2 \Sigma (4n^2 - 4n + 1)$$

$$= 4c^2 \Sigma n^2 - 4c^2 \Sigma n + c^2 \Sigma 1$$

$$= 4c^2 \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] - 4c^2 \frac{n(n+1)}{2} + nc^2$$

$$= nc^2 \left[\frac{2(2n^2+3n+1)}{3} - 2(n+1) + 1 \right]$$

$$= nc^2 \left(\frac{4n^2+6n+2-6n-6+3}{3} \right) = \frac{nc^2(4n^2-1)}{3}$$

જવાબ : (C)

(106) જો $1, \log_9(3^{1-x} + 2), \log_3(4 \cdot 3^x - 1)$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો $x = \dots$ (AIEEE : 2002)

(A) $\log_3 4$

(B) $1 - \log_4 3$

(C) $\log_4 3$

(D) $1 - \log_3 4$

ઉકેલ : અહીં $1, \log_9(3^{1-x} + 2), \log_3(4 \cdot 3^x - 1)$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2 \log_9(3^{1-x} + 2) = \log_3(4 \cdot 3^x - 1) + 1$$

$$\therefore \frac{2 \log_3(3^{1-x} + 2)}{\log_3 9} = \log_3(4 \cdot 3^x - 1) + \log_3 3$$

$$\therefore \frac{2 \log_3(3^{1-x} + 2)}{\log_3 3^2} = \log_3 [3 \cdot (4 \cdot 3^x - 1)]$$

$$\therefore \log_3(3^{1-x} + 2) = \log_3 [3 \cdot (4 \cdot 3^x - 1)]$$

$$\therefore 3^{1-x} + 2 = 12 \cdot 3^x - 3$$

$$\therefore \frac{3}{3^x} + 5 = 12 \cdot 3^x$$

$$\therefore 12(3^x)^2 - 5 \cdot 3^x - 3 = 0$$

$$\therefore (3 \cdot 3^x + 1)(4 \cdot 3^x - 3) = 0$$

$$\therefore 3 \cdot 3^x = -1 \text{ કે } 4 \cdot 3^x = 3$$

$$\therefore 3^x = \frac{-1}{3} < 0 \text{ અશક્ય છે.}$$

$$\therefore 3^x = \frac{3}{4}$$

$$\therefore x = \log_3 \frac{3}{4} = \log_3 3 - \log_3 4. \text{ આથી } x = 1 - \log_3 4$$

જવાબ : (D)

(107) કોઈ માણસ તેની નોકરીના પગારમાંથી પ્રથમ ત્રણ મહિના પૈકી પ્રત્યેક મહિને ₹ 200 ની બચત કરે છે. ત્યાર પછીના દરેક મહિને તેની બચતમાં ₹ 40 નો વધારો થાય છે. નોકરી શરૂ થઈ ત્યારથી મહિના સુધીની તેની બચત ₹ 11,040 થશે. (AIEEE : 2011)

(A) 18

(B) 19

(C) 20

(D) 21

ઉકેલ : કોઈ માણસ તેની નોકરીના પગારમાંથી પ્રથમ ત્રણ મહિના પૈકી પ્રત્યેક મહિને ₹ 200 ની બચત કરે છે.

$$\therefore \text{ત્રણ મહિનાની કુલ બચત} = ₹ 600$$

ત્રણ મહિના પછી દર મહિને તેની બચતમાં ₹ 40 વધારો થાય છે. આથી, 240, 280, 320,... જેથી સમાંતર શ્રેણી રચાશે.

$$\text{તેનો સરવાળો } 11040 - 600 = 10440 \text{ થશે.}$$

$$\therefore a = 240, d = 40, S_n = 10440$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] \text{ પરથી,}$$

$$10440 = \frac{n}{2} [2(240) + (n-1)40]$$

$$\therefore 10440 = n [240 + 20(n-1)] = 20n^2 + 220n$$

$$\therefore n^2 + 11n - 522 = 0$$

$$\therefore (n+29)(n-18) = 0. \text{ હવે } n = -29 < 0 \text{ અશક્ય છે.}$$

$$\therefore n = 18$$

$$\therefore 18 \text{ મહિના પછીની બચત ₹ 10440 થશે.}$$

$$\therefore 18 + 3 = 21 \text{ મહિના પછી ₹10440 + ₹600 = ₹11040 ની બચત થાય.}$$

$$\therefore n = 21$$

જવાબ : (D)

$$(108) \text{ જો } x = \sum_{n=0}^{\infty} a^n; y = \sum_{n=0}^{\infty} b^n; z = \sum_{n=0}^{\infty} c^n \text{ જ્યાં } a, b, c \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે તથા } |a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$$

હોય, તો x, y, z શ્રેણીમાં છે.

(AIEEE : 2005)

(A) સમાંતર

(B) સમગુણોત્તર

(C) સ્વરિત

(D) સમાંતર-સમગુણોત્તર

$$\text{ઉકેલ : અહીં } x = \sum_{n=0}^{\infty} a^n = 1 + a + a^2 + \dots = \frac{1}{1-a} \quad (|a| < 1)$$

$$\therefore 1 - a = \frac{1}{x}. \quad \text{આથી } a = 1 - \frac{1}{x}. \quad \text{આ જ રીતે } b = 1 - \frac{1}{y}; \quad c = 1 - \frac{1}{z} \text{ મળે.}$$

હવે a, b, c સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore a - 1, b - 1, c - 1 \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore -\frac{1}{x}, -\frac{1}{y}, -\frac{1}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore x, y, z \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

જવાબ : (C)

$$(109) \quad a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં હોય, તો } a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n = \dots$$

(AIEEE : 2006)

$$(A) n(a_1 - a_n)$$

$$(B) (n-1)(a_1 - a_n)$$

$$(C) n a_1 a_n$$

$$(D) (n-1) a_1 a_n$$

$$\text{ઉકેલ : } a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \text{ સ્વરિત શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n} \text{ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.}$$

$$\therefore \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1} = \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_2} = \dots = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n-1}} = d \text{ ધરતી,}$$

$$\therefore \frac{a_1 - a_2}{d} = a_1 a_2; \frac{a_2 - a_3}{d} = a_2 a_3; \dots, \frac{a_{n-1} - a_n}{d} = a_{n-1} a_n$$

$$\begin{aligned}
\therefore a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n &= \frac{a_1 - a_2}{d} + \frac{a_2 - a_3}{d} + \dots + \frac{a_{n-1} - a_n}{d} \\
&= \frac{1}{d} [a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + \dots + a_{n-1} - a_n] \\
&= \frac{1}{d} (a_1 - a_n)
\end{aligned} \tag{1}$$

$$\text{હવે, } \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + (n-1)d$$

$$\therefore \frac{a_1 - a_n}{a_1 a_n} = (n-1)d$$

$$\therefore d = \frac{a_1 - a_n}{(n-1) a_1 a_n}$$

$$\therefore (1) \text{ પરથી, } a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n = \frac{a_1 - a_n}{\frac{(a_1 - a_n)}{(n-1) a_1 a_n}} = (n-1) a_1 a_n \quad \text{જવાબ : (D)}$$

(110) શ્રેણી $0.7 + 0.77 + 0.777 + \dots$ ની પ્રથમ 20 પદોનો સરવાળો હોય. (JEE : 2013)

$$(A) \frac{7}{81} (179 - 10^{-20}) \quad (B) \frac{7}{9} (99 - 10^{-20}) \quad (C) \frac{7}{81} (179 + 10^{-20}) \quad (D) \frac{7}{9} (99 + 10^{-20})$$

ઉકેલ : $0.7 + 0.77 + 0.777 + \dots + 0.777\dots 7$ (20 વર્ષત)

$$= 7 [0.1 + 0.11 + 0.111 + \dots + 0.111\dots 1 \text{ (20 વર્ષત)}]$$

$$= \frac{7}{9} [(1 - 0.1) + (1 - 0.01) + (1 - 0.001) + \dots + (1 - 0.000\dots 0 \text{ (19 વર્ષત)}1)]$$

$$= \frac{7}{9} [(1 + 1 + 1 + \dots + 1 \text{ (20 વર્ષત)}) - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots + \frac{1}{10^{20}} \right)]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{7}{9} \left[20 - \frac{1 - \left(\frac{1}{10} \right)^{20}}{1 - \frac{1}{10}} \right] \quad \left| \quad \begin{aligned} &= \frac{7}{9} \left[20 - \frac{1 - 10^{-20}}{9} \right] \\ &= \frac{7}{9} \left[\frac{179}{9} + \frac{1}{9} \cdot 10^{-20} \right] \\ &= \frac{7}{81} (179 + 10^{-20}) \end{aligned} \right.
\end{aligned}$$

જવાબ : (C)

(111) જો x, y, z સમાંતર શ્રેણીમાં હોય અને $\tan^{-1}x, \tan^{-1}y$ તથા $\tan^{-1}z$ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો સત્ય બને. $0 < x, y, z < 1$ (JEE : 2013)

$$(A) x = y = z \quad (B) 2x = 3y = 6z \quad (C) 6x = 3y = 2z \quad (D) 6x = 4y = 3z$$

ઉકેલ : અહીં x, y, z સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2y = x + z \tag{1}$$

વળી, $\tan^{-1}x, \tan^{-1}y, \tan^{-1}z$ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2\tan^{-1}y = \tan^{-1}x + \tan^{-1}z$$

$$\therefore \tan^{-1}y + \tan^{-1}y = \tan^{-1} \left(\frac{x+z}{1-xz} \right)$$

$$\therefore \tan^{-1}\left(\frac{2y}{1-y^2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{x+z}{1-xz}\right)$$

$$\therefore \frac{2y}{1-y^2} = \frac{x+z}{1-xz}$$

$$\therefore \frac{x+z}{1-y^2} = \frac{x+z}{1-xz}$$

((1) પરથી,)

$$\therefore 1 - y^2 = 1 - xz \quad \text{આથી } y^2 = xz$$

$\therefore x, y, z$ સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

$x = y = z$ મળે.

અહીં x, y, z સમાંતર તથા સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોવાથી $x = y = z$ થાય.

જવાબ : (A)

- (112) p તથા q ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એવી મળે કે જેથી $p^2 + q^2 = 1$ હોય, તો $(p + q)$ ની મહત્તમ કિંમત
(AIEEE : 2007)

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\sqrt{2}$

ઉકેલ : અહીં સમાંતર મધ્યક (A) $\geq$ ગુણોત્તર મધ્યક (G) લેતાં,

$$\frac{p+q}{2} \geq \sqrt{pq}$$

$$\therefore p^2 + 2pq + q^2 \geq 4pq$$

$$\therefore 1 + 2pq \geq 4pq. \quad \text{આથી } 1 \geq 2pq. \quad \text{આથી } 2pq \leq 1 \quad (1)$$

$$\text{હવે } (p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 \leq 1 + 1 \quad ((p^2 + q^2 = 1) \text{ તથા } (1) \text{ પરથી})$$

$$\therefore p + q \leq \sqrt{2}$$

$$\therefore p + q \text{ ની મહત્તમ કિંમત } \sqrt{2} \text{ મળે.}$$

નોંધ : (1) $p = \frac{1}{\sqrt{2}}, q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ લેતાં $p^2 + q^2 = 1$ પણ થાય અને $p + q = \sqrt{2}$ પણ થાય

(2) ધારો કે $p = \cos\theta, q = \sin\theta$. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, હોય તો $p^2 + q^2 = 1$.

$\therefore \cos\theta + \sin\theta$ નો વિસ્તાર $= (0, \sqrt{2}]$. જો $\theta = \frac{\pi}{4}$, તો મહત્તમ કિંમત $\sqrt{2}$. જવાબ : (D)

- (113) કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં 100 મા પદના 100 ગણા એ તે જ શ્રેણીના 50 મા પદના 50 ગણા જેટલું હોય તો તે શ્રેણીનું 150 મું પદ મળે.
(AIEEE : 2012)

- (A) -150 (B) 0 (C) 150 (D) 50મા પદના 150 ગણા જેટલું

ઉકેલ : અહીં $100 t_{100} = 50 t_{50}$ આપેલ છે.

$$\therefore 100 [a + (99)d] = 50 [a + 49d]$$

$$\therefore 2(a + 99d) = a + 49d$$

$$\therefore a + 149d = 0$$

$$\therefore t_{150} = 0$$

જવાબ : (B)

- (114) કોઈ ત્રણ ધન સંખ્યાઓ વધતી સમગુણોત્તર શ્રેણી રચે છે. જો આ શ્રેણીનું મધ્યમ પદ બમણું કરતાં મળતી નવી સંખ્યાઓ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, તો તે સમગુણોત્તર શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર હોય.
(JEE 2014)

- (A) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (B) $3 + \sqrt{2}$ (C) $2 - \sqrt{3}$ (D) $2 + \sqrt{3}$

ઉકેલ : ધારો કે ત્રણ ધન સંખ્યાઓ a, b, c સમગુણોત્તર શ્રેણી રચે છે તથા બે ક્રમિક સંખ્યાઓ વચ્ચેનો ગુણોત્તર r છે.

અહીં, a, ar, ar^2 સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં છે.

હવે મધ્યમ પદ બમણું કરવામાં આવે છે.

$\therefore a, 2ar, ar^2$ સમાંતર શ્રેણી રચે.

$$\therefore 2ar = \frac{a+ar^2}{2}$$

$$\therefore r^2 - 4r + 1 = 0$$

$$(a \neq 0)$$

$$\therefore r = \frac{4 \pm \sqrt{16-4(1)(1)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

પરંતુ વધતી સમગુણોત્તર શ્રેણી હોવાથી ગુણોત્તર $2 + \sqrt{3}$ મળે.

જવાબ : (D)

(115) બે ભિન્ન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ l અને n ($l, n > 1$) નો સમાંતર મધ્યક m હોય તથા આ બે સંખ્યાઓ વચ્ચે G_1, G_2, G_3 ત્રણ સમગુણોત્તર મધ્યક હોય તો $G_1^4 + 2G_2^4 + G_3^4 = \dots$ (JEE 2015)

$$(A) 4l^2 mn$$

$$(B) 4lm^2 n$$

$$(C) 4lmn^2$$

$$(D) 4l^2 m^2 n^2$$

ઉકેલ : સંખ્યાઓ l તથા n નો સમાંતર મધ્યક m આપેલ છે.

$$\therefore m = \frac{l+n}{2}$$

$$(1)$$

હવે l તથા n ની વચ્ચે ત્રણ ગુણોત્તર મધ્યકો G_1, G_2, G_3 છે.

$$\therefore l, G_1, G_2, G_3, n \text{ સમગુણોત્તર શ્રેણી રચે છે. } \frac{G_1}{l} = \frac{G_2}{G_1} = \frac{G_3}{G_2} = \frac{n}{G_3} = r \text{ લેતાં}$$

$$\therefore G_1 = lr, G_2 = lr^2, G_3 = lr^3, n = lr^4$$

$$\therefore r^4 = \frac{n}{l}. \text{ આથી } r = \left(\frac{n}{l}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$(2)$$

$$\text{હવે, } G_1^4 + 2G_2^4 + G_3^4 = l^4 r^4 + 2(l^4 r^8) + l^4 r^{12} = l^4 r^4 (1 + 2r^4 + r^8)$$

$$\therefore G_1^4 + 2G_2^4 + G_3^4 = l^4 \left(\frac{n}{l}\right) \left[1 + 2\left(\frac{n}{l}\right) + \left(\frac{n}{l}\right)^2\right] = nl^3 \left[1 + \frac{n}{l}\right]^2 = nl(n+l)^2 = 4m^2 ln$$

જવાબ : (B)

(116) $1^3 + \frac{1^3+2^3}{1+3} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5} + \dots$ નો પ્રથમ 9 પદોનો સરવાળો હોય.

(JEE : 2015)

$$(A) 71$$

$$(B) 96$$

$$(C) 142$$

$$(D) 192$$

$$\text{ઉકેલ : અહીં } t_n = \frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{1+3+\dots+(2n-1)} = \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{\frac{2n(n+1)}{2}-n} = \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{4}$$

$$\text{હવે } S_9 = \sum_{n=1}^9 t_n = \sum_{n=1}^9 \frac{(n+1)^2}{4}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^9 (n+1)^2$$

$$= \frac{1}{4} [2^2 + 3^2 + \dots + 10^2]$$

$$= \frac{1}{4} [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 - 1^2]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{10(11)(21)}{6} - 1 \right] = \frac{1}{4} (384) = 96$$

જવાબ : (B)

(117) $\log_3 2, \log_3 (2^x - 5), \log_3 \left(2^x - \frac{7}{2}\right)$ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો $x = \dots$

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

ઉકેલ : અહીં $\log_3 2, \log_3 (2^x - 5), \log_3 \left(2^x - \frac{7}{2}\right)$ સમાંતર શ્રેણીમાં છે.

$$\therefore 2 \log_3 (2^x - 5) = \log_3 2 + \log_3 \left(2^x - \frac{7}{2}\right)$$

$$\therefore \log_3 (2^x - 5)^2 = \log_3 \left[2 \cdot \left(2^x - \frac{7}{2}\right)\right]$$

$$\therefore (2^x - 5)^2 = 2 \cdot \left(2^x - \frac{7}{2}\right)$$

$$\therefore (2^x)^2 - 10 \cdot 2^x + 25 = 2 \cdot 2^x - 7$$

$$\therefore (2^x)^2 - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$\therefore (2^x - 8)(2^x - 4) = 0$$

$$\therefore 2^x = 8 \text{ અથવા } 2^x = 4$$

$$\therefore x = 3 \text{ અથવા } x = 2$$

હવે $x = 2$ લેતાં, $\log_3 (2^x - 5) = \log_3 (-1)$ મળે જે અશક્ય છે કારણ કે $\log$ વિધેયનો પ્રદેશ R^+ હોય

આથી $x = 3$

જવાબ : (B)

એક કરતાં વધુ સાચા વિકલ્પ હોય તેવા પ્રશ્નો

(118) જો બે સંખ્યાઓ $5 - d$ તથા $5 + 2d$ નો સ્વરિત મધ્યક 4 હોય, તો $|2d| = \dots$ હોય. (JEE advanced : 2015)

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

ઉકેલ : ધારો કે $a = 5 - d, b = 5 + 2d$ છે.

$$\text{હવે } H = \frac{2ab}{a+b} = 4 \text{ આપેલ છે.}$$

$$\therefore (5 - d)(5 + 2d) = 2[(5 - d) + (5 + 2d)]$$

$$\therefore 25 + 5d - 2d^2 = 20 + 2d$$

$$\therefore 2d^2 - 3d - 5 = 0$$

$$\therefore (d + 1)(2d - 5) = 0$$

$$\therefore d = -1 \text{ અથવા } d = \frac{5}{2}$$

$$\therefore |2d| = |-2| = 2 \text{ અથવા } |2d| = 5$$

જવાબ : (A), (D)

પૂર્ણાંક જવાબ હોય તેવા બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો

(119) કોઈ એક શહેરની હદની બહાર એક વિશ્રામગૃહ આવેલ છે. આ વિશ્રામગૃહના રસ્તા પર બંને બાજુએ કિલોમીટર દર્શાવતા પથ્થર (માઈલસ્ટોન) મૂકેલ છે. કોઈ એક માણસ આ વિશ્રામગૃહથી 1 કિમી.ના અંતરે 1 કિમી લખેલ પથ્થરને લોડિંગ રીક્ષામાં લઈ જઈને મૂકે છે અને પછી પાછો આવે છે. ત્યાર બાદ 2 કિમી.ના અંતરે તે પથ્થરને મૂકીને પાછો આવે છે. આ રીતે તે માણસ રસ્તાની બંને બાજુએ અંતિમ પથ્થર ગોઠવીને પાછો આવે ત્યારે તેણે કાપેલ અંતર 210 કિમી હોય તો તેણે કેટલા કિમી સુધી રસ્તાની બંને બાજુએ પથ્થર ગોઠવ્યા હશે ?

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 12

ઉકેલ : માણસે કાપેલ અંતર (એક બાજુએ) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + \dots + n \cdot 2$ છે.

જ્યારે બીજી બાજુએ $1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + \dots + (n-1) \cdot 2 + n$ છે.

કારણ કે છેલ્લા પથ્થરેથી ઘર તરફ પ્રયાણ કરે છે.

$$\therefore \text{કુલ અંતર} = 2(1 + 2 + 3 + \dots + n) + 2(1 + 2 + 3 + \dots + n) - n$$

$$210 = 4(1 + 2 + 3 + \dots + n) - n = \frac{4n(n+1)}{2} - n$$

$$= 2n(n+1) - n$$

$$\therefore 210 = 2n^2 + n$$

$$\therefore 2n^2 + n - 210 = 0$$

$$\therefore (2n + 21)(n - 10) = 0$$

$$\therefore n = 10 \text{ અથવા } n = \frac{-21}{2} < 0 \text{ અશક્ય છે.}$$

$$\therefore n = 10$$

$\therefore$ રસ્તાની બંને બાજુએ 10 કિલોમીટર સુધી પથ્થર ગોઠવ્યા હશે.

જવાબ : (C)

$$(120) \quad 1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + \dots = \dots$$

(AIEEE-2009)

(A) 6

(B) 3

(C) 2

(D) 4

$$\text{ઉકેલ : અહીં } S = 1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + \dots \infty$$

(1)

$$\therefore \frac{1}{3} S = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{6}{3^3} + \frac{10}{3^4} + \dots \infty$$

(2)

(1) માંથી (2) બાદ કરતાં,

$$\therefore \frac{2}{3} S = 1 + \frac{1}{3} + \frac{4}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{4}{3^4} + \dots \infty$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{4}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \dots \infty$$

$$= \frac{\frac{4}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}} = 2. \text{ આથી } S = 3$$

જવાબ : (B)

નિષ્કર્ષ તથા કારકના પ્રશ્નો

આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચાર વિકલ્પો અને બે વિધાનો આપેલાં હોય છે. વિધાન 1 નિષ્કર્ષ તથા વિધાન 2 કારક કહેવાય છે. વિકલ્પો (A), (B), (C) તથા (D) નીચે મુજબ હોય છે.

(A) વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

(B) વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી.

(C) વિધાન 1 સત્ય છે તથા વિધાન 2 અસત્ય છે.

(D) વિધાન 1 અસત્ય છે તથા વિધાન 2 સત્ય છે.

(121) વિધાન 1 : 1, 2, 4, 8 ... સમગુણોત્તર શ્રેણી છે.

4, 8, 16, 32 ... સમગુણોત્તર શ્રેણી છે.

1 + 4, 2 + 8, 4 + 16, 8 + 32 ... પણ સમગુણોત્તર શ્રેણી છે.

વિધાન 2 : ધારો કે કોઈ એક સમગુણોત્તર શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર r છે.

તથા સામાન્ય પદ T_{k+1} છે તેમજ બીજી સમગુણોત્તર શ્રેણીનું સામાન્ય પદ T'_{k+1} તેમજ

$T''_{k+1} = T'_{k+1} + T_{k+1}$ એ અન્ય સમગુણોત્તર શ્રેણીનું સામાન્ય પદ હોય, જ્યાં r સામાન્ય ગુણોત્તર છે.

ઉકેલ : અહીં ધારો કે $T_{k+1} = ar^k$ તથા $T'_{k+1} = br^k$ છે.

$$\begin{aligned}\therefore T''_{k+1} &= T'_{k+1} + T_{k+1} \\ &= ar^k + br^k \\ &= (a + b)r^k\end{aligned}$$

$\therefore T''_{k+1}$ એ કોઈ સમગુણોત્તર શ્રેણીનું સામાન્ય પદ છે.

$\therefore$ કહી શકાય કે બંને વિધાન સત્ય છે.

તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.

જવાબ : (A)

(122) વિધાન 1 : $1 + (1 + 2 + 4) + (4 + 6 + 9) + (9 + 12 + 16) + \dots + (361 + 380 + 400)$ નો સરવાળો 8000 છે. (AIEEE-2012)

વિધાન 2 : $\sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = n^3, \forall n \in \mathbb{N}$

ઉકેલ : આપેલ શ્રેણીમાં દરેક કૌંસમાં ક્રમશઃ બે સંખ્યાનો વર્ગ તથા તે બે સંખ્યાના ગુણાકારનો સરવાળો દર્શાવેલ છે. જેમાં અંતિમ કૌંસમાં $19^2 + (19)(20) + (20)^2$ છે.

અહીં કુલ 20 પદ છે, જેમનો સરવાળો $1 + (1 + 2 + 4) + (4 + 6 + 9) + (9 + 12 + 16) + \dots + (361 + 380 + 400) = 8000$ જોઈએ છે.

$$\begin{aligned}\text{વળી, સ્પષ્ટ છે કે, } k^3 - (k-1)^3 &= (k - (k-1)) (k^2 + k(k-1) + (k-1)^2) \\ &= k^2 + k(k-1) + (k-1)^2\end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = \sum_{k=1}^{20} (k^2 + k(k-1) + (k-1)^2) = 20^3 = 8000$$

આથી વિધાન 1 સત્ય છે.

$$\therefore \sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = n^3 \text{ એ વિધાન 1 ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે.}$$

$\therefore$ વિધાન 1 તથા વિધાન 2 બંને સત્ય છે તથા વિધાન 2 એ વિધાન 1ની સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત છે. જવાબ : (A)

(123) વિધાન 1 : $\forall n, n \geq 2, n \in \mathbb{N}, \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$ (AIEEE : 2008)

વિધાન 2 : $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \sqrt{n(n+1)} < n+1$

ઉકેલ : $P(n) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ માં $n = 2$ લેતાં,

$$P(2) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} > \sqrt{2} \quad \text{કારણ કે} \quad \frac{1}{\sqrt{1}} > \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{ધારો કે } P(k) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{k} \text{ સત્ય છે. } \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2 \quad (1)$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} > \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \quad ((1) \text{ પરથી,})$$

$$= \frac{\sqrt{k^2+k+1}}{\sqrt{k+1}} > \frac{\sqrt{k^2+1}}{\sqrt{k+1}}$$

$$\therefore P(k+1) : \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} > \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1}$$

આથી વિધાન 1 સત્ય છે.

હવે, $n < n+1$

$$\therefore n(n+1) < (n+1)^2$$

$$\therefore \sqrt{n(n+1)} < n+1$$

આથી વિધાન 2 પણ સત્ય છે.

$\therefore$ વિધાન 2 એ વિધાન 1 ની યોગ્ય સમજૂતી માટે પર્યાપ્ત નથી.

જવાબ : (B)

