

● આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઈથર

આલ્કોહોલ : આલ્કેન, આલ્કીન, આલ્કાઈન અથવા આલ્કાઈલ બેન્ઝિનમાંના sp^3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલા H પરમાણુનું વિસ્થાપન $-OH$ સમૂહ વડે થવાથી બનતાં સંયોજનોને આલ્કોહોલ કહે છે.

આલ્કોહોલનું સામાન્ય સૂત્ર $R-OH$ છે.

● આલ્કોહોલનું વર્ગીકરણ

● $-OH$ સમૂહની સંખ્યાને અનુરૂપ આલ્કોહોલને મોનોહાઈડ્રીક, ડાયહાઈડ્રીક, ટ્રાયહાઈડ્રીક આલ્કોહોલ વગેરેમાં વર્ગીકૃત કરી શક્ય છે.

● $-OH$ સમૂહ ધરાવતો sp^3 સંકૃત કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તેને આધારે આલ્કોહોલનું

1° ($-CH_2OH$), 2° ($>CH-OH$) અને 3° ($-C-OH$) આલ્કોહોલમાં પણ વર્ગીકરણ કરી શકાય છે.

આલ્કોહોલમાં સમઘટકતા : આલ્કોહોલ સંયોજનોમાં બંધારણીય સમઘટકતા તેમજ વિન્યાસ સમઘટકતા જોવા મળે છે.

1. $C_5H_{12}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં પ્રાથમિક આલ્કોહોલ સમઘટકોની સંખ્યા છે.
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3
2. સાયકલો પેન્ટેનોલ પ્રકારનો પદાર્થ છે.
(A) દ્વિતીયક આલ્કોહોલ (B) ફિનોલિક (C) તૃતીયક આલ્કોહોલ (D) પ્રાથમિક આલ્કોહોલ
3. નીચે પૈકી કયું સંયોજન શક્ય નથી ?
(A) પ્રોપેન 1, 3-ડાયોલ (B) બ્યુટેન 2, 3-ડાયોલ (C) બ્યુટેન 2,2-ડાયોલ (D) પેન્ટેન 1, 2-ડાયોલ
4. $C_5H_{12}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં પ્રકાશક્રિયાશીલ આલ્કેનોલ સમઘટકોની સંખ્યા છે.
(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 3

જવાબો : 1. (C), 2. (A), 3. (C), 4. (D).


● આલ્કોહોલની બનાવટ :

આલ્કાઈલ હાઈડ્રોજન જળવિભાજન :




આલ્કાઈલ હાઈડ્રોજન


આલ્કીનનું હાઈડ્રેશન :




આલ્કીનનું હાઈડ્રોબોરેશન-ઑક્સિડેશન :




કાર્બોનિક સંયોજનોનું રિડક્શન :




આલ્ડીહાઈડ




કીટોન




એસિડ



એસિડ ક્લોરાઇડ





એનહાઇડ્રાઇડ




એસ્ટર

એસ્ટરનું જળવિભાજન :



ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયકની આલ્કીલાઇડ અને કીટોન સાથેની યોગશીલ પ્રક્રિયા :




ગ્રિગનાર્ડ આલ્કીલાઇડ

1° / 2° / 3°

પ્રક્રિયક અથવા કીટોન

આલ્કોહોલ

આથવણ પ્રક્રિયા :




સુક્રોઝ

ગ્લુકોઝ

ઇથેનોલ

આલ્કાઇલ એમાઇન (1°)ની HNO₂ સાથે પ્રક્રિયા :



5. ફિનાઈલ મિથેનેમાઈનની નાઈટ્રસ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં બને છે.
 (A) ફિનોલ (B) નાઈટ્રોબેઝિન (C) ફિનાઈલ મિથેનોલ (D) O-કેસોલ
6. ઈથેનોલ બનાવવા માટે નીચે પૈકી કયા પદાર્થો વચ્ચે પ્રક્રિયા કરવી પડે ?
 (A) CH_3MgI અને CH_3COCH_3 (B) CH_3MgI અને $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
 (C) CH_3MgI અને $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ (D) CH_3MgI અને HCOOC_2H_5
7. $\text{Q} \xleftarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{(i) B}_2\text{H}_6} \text{Cyclohexene} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{P}$ માં નીપજ P અને Q અનુક્રમે કઈ છે ?
 (A) બંને $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{OH}$ (B) બંને $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 (C) P = $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{OH}$ અને Q = $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (D) P = $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ અને Q = $\text{Cyclohexyl-CH}_2\text{OH}$
8. બ્યુટ-2 ઈનાલમાંથી બ્યુટ-2-ઈન 1-ઓલ મેળવવા માટે કયા પ્રક્રિયકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?
 (A) H_2/Ni (B) NaBH_4 (C) Zn/HCl (D) Zn-Hg/HCl
9. $\text{HC} \equiv \text{CH} \xrightarrow[\text{Pd+C}]{\text{H}_2} \text{P} \xrightarrow{\text{HBr}} \text{Q} \xrightarrow[\text{NaOH}]{\text{જલીય}} \text{R}$ (કાર્બનિક નીપજ)
 ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં અંતિમ કાર્બનિક નીપજ R કઈ છે ?
 (A) ઈથેનોલ (B) ઈથિનોલ (C) પ્રોપેન-1-ઓલ (D) પ્રોપ-2-ઈનોલ
10. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{MgBr} + \text{CH}_3\text{COCH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O/H}^+} \text{'X'}$ પ્રક્રિયાની નીપજ 'X' શું છે ?
 (A) 3-મિથાઈલહેક્ઝેન-1-ઓલ (B) 3-મિથાઈલ હેક્ઝેન-2-ઓલ
 (C) 2-મિથાઈલપેન્ટેન-2-ઓલ (D) 4-મિથાઈલ હેક્ઝેન-2-ઓલ

જવાબો : 5. (C), 6. (D), 7. (D), 8. (B), 9. (A), 10. (D)






● આલ્કોહોલના ભૌતિક ગુણધર્મો

- નીચા આણ્વિયદળ ધરાવતા આલ્કોહોલ લાક્ષણિક વાસ ધરાવતાં બાષ્પશીલ સંયોજનો છે.
- આલ્કોહોલનાં અણુઓ અણુઓ વચ્ચે આંતરઆણ્વિય H-બંધ બનતો હોવાને કારણે આલ્કોહોલના ઉત્કલનબિંદુ અનુવર્તી આલ્કેન, આલ્કાઈલ હેલાઈડ અને ઈથર સંયોજનો કરતાં વધુ હોય છે.
- સમઘટકીય આલ્કોહોલના ઉત્કલનબિંદુનો ક્રમ: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
- આલ્કોહોલના અણુઓ પાણીના અણુઓ સાથે આંતરઆણ્વિય H-બંધ બનાવતા હોવાથી, નીચા આણ્વિયદળ ધરાવતા આલ્કોહોલ પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે.
- આલ્કોહોલમાં જેમ -OH સમૂહની સંખ્યા વધે, તેમ ઉત્કલનબિંદુ અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધે છે.


● આલ્કોહોલના રાસાયણિક ગુણધર્મો

(I) આલ્કોહોલના O-H બંધના તૂટવાથી થતી પ્રક્રિયાઓ :

- આલ્કોહોલનો એસિડિક ગુણ :
- આલ્કોહોલની પ્રબળ ધાતુ, ધાતુ હાઈડ્રાઈડ અને ધાતુ એમાઈડ સાથેની પ્રક્રિયા પરથી સાબિત થાય છે કે આલ્કોહોલ એસિડિક ગુણ ધરાવે છે.
- આલ્કોહોલની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા H_2O કરતાં પણ ઓછી છે. (અપવાદ : મિથેનોલ)
 એટલે કે, આલ્કોહોલ અતિ નિર્બળ એસિડ છે.
- + I અસર આલ્કોહોલની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટાડે છે, જ્યારે - I અસર આલ્કોહોલની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધારે છે.











(II) આલ્કોહોલમાંના (C - O) બંધના તૂટવાથી થતી પ્રક્રિયાઓ :



હેલોજન એસિડની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ : $HI > HBr > HCl > HF$


ROH ની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ : $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$





(III) આલ્કોહોલનો આખો અણુ-પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતો હોય તેવી પ્રક્રિયાઓ :

નિર્જળીકરણ :

(a) આલ્કોહોલનું નિર્જળીકરણ નીચેની બે રીતે શક્ય બનવાથી બે નીપજોમાંની કોઈ પણ એક નીપજ-પ્રક્રિયાના તાપમાનને આધારે શક્ય બને છે.






- આલ્કોહોલના નિર્જળીકરણથી આલ્કીન બનવાની પ્રક્રિયાની સરળતાનો આધાર પ્રક્રિયા દરમિયાન બનતા મધ્યવર્તી કાર્બોકિટાયનની સ્થિરતા ઉપર રહેલો છે. તેને આધારે નિર્જળીકરણની પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ : $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ છે.
 - આલ્કોહોલના નિર્જળીકરણની પ્રક્રિયાથી એક કરતાં વધુ નીપજ મેળવવાની શક્યતાઓ હોય, તો સેટ્ઝેઈફ નિયમ તથા પુનર્વિન્યાસ (કાર્બોકિટાયનની)ને ધ્યાનમાં લઈ મુખ્ય નીપજ નક્કી થાય છે.
- (b) આલ્કોહોલની બાષ્પને, ગરમ કરેલા એલ્યુમિના પરથી 513-523 K તાપમાને પસાર કરતાં ઈથર તેમજ 633 K તાપમાને આલ્કીન આપે છે.




● ઓક્સિડેશન

- (a) આલ્કોહોલના ઓક્સિડેશનથી મળતી નીપજનો આધાર આલ્કોહોલના પ્રકાર તથા ઓક્સિડેશનકર્તા ઉપર રહેલો છે.
- 1° આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન મંદ ઓક્સિડેશનકર્તા જેવા કે, PCC વડે CH_2Cl_2 ની હાજરીમાં કરતાં અનુવર્તી આલ્કીલાઈડ મળે છે. જ્યારે પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા જેવા કે, સાંદ્ર HNO_3 , એસિડિક $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ અથવા એસિડિક અથવા બેઝિક અથવા તટસ્થ KMnO_4 વડે કરતાં અનુવર્તી એસિડ મળે છે.
 - 2° આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા વડે કરતા અનુવર્તી કીટોન મળે છે.
 - 3° આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન તટસ્થ અથવા આલ્કાઈન KMnO_4 વડે થઈ શકતું નથી. પરંતુ, એસિડિક (H_2SO_4) / $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ અથવા KMnO_4 વડે 3° આલ્કોહોલમાંથી આલ્કીન બની, ત્યાર બાદ ઓછા કાર્બન ધરાવતા કીટોન અને એસિડનું મિશ્રણ મળે છે.
- (b) જુદા જુદા પ્રકારના આલ્કોહોલની બાષ્પને 573 K તાપમાને ગરમ કરેલાં કોપર પરથી પસાર કરતાં જુદી-જુદી નીપજ મળે છે.




નોંધ :

- આલ્કોહોલના પ્રકારની પરખ ઉપર દર્શાવેલ ઓક્સિડેશન-પ્રક્રિયા દ્વારા મળતી નીપજને આધારે કરી શકાય છે.
- લ્યુકાસ કસોટી દ્વારા પણ પ્રયોગશાળામાં આલ્કોહોલના પ્રકારની પરખ કરી શકાય છે.
- વિક્ટર મેયર કસોટી : આ કસોટી દ્વારા પણ પ્રયોગશાળામાં આલ્કોહોલના પ્રકારની પરખ કરી શકાય છે જે નીચે મુજબ છે :



1° આલ્કોહોલ






લોહી જેવો લાલ રંગ

- $R_2CHOH \xrightarrow{P + I_2} R_2CH-I \xrightarrow{AgNO_2} R_2CH - NO_2 \xrightarrow{HNO_2} R_2 \cdot \begin{array}{c} C-NO_2 \\ | \\ N=O \end{array}$
 2° આલ્કોહોલ
 વાદળી રંગ $\xleftarrow{NaOH}$
- $R_3C - OH \xrightarrow{P + I_2} R_3C-I \xrightarrow{AgNO_2} R_3C - NO_2 \xrightarrow{HNO_2}$ પ્રક્રિયા થતી નથી.
 3° આલ્કોહોલ
 રંગવિહીન દ્રાવણ $\xleftarrow{NaOH}$

11. 3-મિથાઈલ બ્યુટેન-2-ઓલ $\xrightarrow{HBr}$





- (A) 2-બ્રોમો-3-મિથાઈલ બ્યુટેન (B) 3-બ્રોમો બ્યુટેન-2-ઓલ
 (C) 2-બ્રોમો-2-મિથાઈલ બ્યુટેન (D) 2-બ્રોમો બ્યુટેન-2-ઓલ

12. નીચે આપેલાં સંયોજનોની HBr સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો કયો ક્રમ સાચો છે ?







- (A) $r > q > p$ (B) $p > q > r$ (C) $q > p > r$ (D) $r > q > p$

13.  $\xrightarrow{H_2O / H^+}$ મુખ્ય નીપજ + ગૌણ નીપજ, પ્રક્રિયામાં મુખ્ય નીપજ કઈ છે ?







14. $CH_3 - \begin{array}{c} CH - CH_3 \\ | \\ OH \end{array} \xrightarrow{PBr_3} x \xrightarrow{Mg/ઇથર} y \xrightarrow{\begin{array}{c} O \\ \diagup \quad \diagdown \\ H_2C - CH_2 \end{array}} z \xrightarrow[\Delta]{H_2O} Q$





પ્રક્રિયાની અંતિમ નીપજ 'Q' કઈ છે ?








15. નીચે પૈકી કયાં સંયોજન માટે સૌથી ઓછો K_a છે ?



16. બેઈઝ તરીકેની પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ છે.



17. $\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_3\text{PO}_4}$ ની મુખ્ય નીપજ કઈ છે.



18. $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_3 \xrightarrow{\text{લ્યુકાસ પ્રક્રિયક}}$

(A) 2-ક્લોરો-3-મિથાઈલ બ્યુટેન

(B) 1-ક્લોરો-3-મિથાઈલ બ્યુટેન

(C) 2-ક્લોરો-2, 3-ડાયમિથાઈલ બ્યુટેન

(D) 2,3-ડાયમિથાઈલ બ્યુટ-2-ઈન

19. કાર્બનિક પદાર્થ A ની $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgI}$ સાથેની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજનું જળવિભાજન કરતાં પદાર્થ B મળે છે. પદાર્થ-B વિક્ટર મેયર કસોટીમાં લોહી જેવો લાલ રંગ આપે છે, તો પદાર્થ A અને B અનુક્રમે કયા છે ?

(A) એસિટાલ્ડીહાઈડ, પ્રોપેનોલ

(B) ફોર્માલ્ડીહાઈડ, n-પ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ

(C) એસિટાલ્ડીહાઈડ, આઈસો પ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ

(D) એસિટોન, n-પ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ

20. $\text{P} \xleftarrow{\text{HCl} / \text{ZnCl}_2} (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{SOCl}_2} \text{Q}$

ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં P અને Q નીપજો કઈ છે ?

(A) $\text{P} = (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{Cl}$, $\text{Q} = (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{Cl}$




(B) $\text{P} = (\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{Cl}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, $\text{Q} = (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{Cl}$

(C) $\text{P} = (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{Cl}$, $\text{Q} = (\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{Cl}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

(D) $\text{P} = (\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{Cl}) - \text{CH}_2\text{CH}_3$, $\text{Q} = (\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{Cl}) - \text{CH}_2\text{CH}_3$

21. આઈસોબ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 'X' $\xrightarrow{\text{HBr}}$ 'Y' $\xrightarrow{\text{જલીય KOH}}$ 'Z'

ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં X અને Y કાર્બનિક નીપજો છે, તો Z પદાર્થ કયો છે ?



22. ઈથેનોલને જ્યારે મિથાઈલ મેગ્નેશિયમ આયોડાઈડ સાથે ગરમ કરતાં વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.

(A) મિથેન

(B) ઈથેન

(C) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

(D) પ્રોપેન

23. નીચે પૈકી કયા આલ્કોહોલની એસ્ટરીકરણની પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી ઓછી છે ?

(A) બ્યુટેન-1-ઓલ

(B) બ્યુટેન-2-ઓલ

(C) 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-1-ઓલ





(D) 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-2-ઓલ

24. 0.0185 ગ્રામ ઇથેનોલની મિથાઈલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઈડ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં STP એ 5.6 મિલિ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, તો આલ્કોહોલનું આણ્વિયદળ કેટલું થશે ?
 (A) 74 (B) 46 (C) 32 (D) 60
25. CH_3OH નીચે પૈકી કયા પદાર્થ સાથે પ્રક્રિયા કરી એસ્ટર બનાવી શકતો નથી ?
 (A) ઇથેનોઈક એસિડ (B) ઇથેનાલ
 (C) ઇથેનોઈક એનહાઈડ્રાઈડ (D) ઇથેનોઈલ ક્લોરાઈડ


જવાબો : 11. (C), 12. (B), 13. (A), 14. (A), 15. (D), 16. (C), 17. (C), 18. (C), 19. (B), 20. (B), 21. (D), 22. (A), 23. (D), 24. (A), 25. (B).

● ફિનોલ


- એરોમેટિક રિંગમાંના કાર્બન સાથે જોડાયેલા H નું વિસ્થાપન $-\text{OH}$ સમૂહ વડે થવાથી બનતાં સંયોજનોને ફિનોલ કહે છે. ફિનોલનું સામાન્ય સૂત્ર $\text{Ar}-\text{OH}$ છે.
- ફિનોલમાં આવેલા $-\text{OH}$ સમૂહની સંખ્યાને આધારે તેનું મોનોહાઈડ્રીક, ડાયહાઈડ્રીક, ટ્રાયહાઈડ્રીક તથા પોલિહાઈડ્રીક ફિનોલમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય છે.
- આલ્કાઈલ વિસ્થાપિત ફિનોલ સંયોજનો એરાઈલ આલ્કોહોલ તથા આલ્કાઈલ એરાઈલ ઇથર સાથે ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકતા ધરાવે છે.
- ફિનોલની બનાવટ :



ઔદ્યોગિક રીતે ફિનોલ ડાઉ પદ્ધતિ અને ક્યુમિન પદ્ધતિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.



ક્યુમિન પદ્ધતિ :



● ફિનોલના ભૌતિક ગુણધર્મો

- ફિનોલના અણુઓ અણુઓ વચ્ચે પરસ્પર આંતરઆણ્વિક H-બંધ બનતો હોવાથી, ફિનોલનું ઉત્કલનબિંદુ અનુવર્તી એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન તથા એરાઇલ હેલાઇડ કરતાં ઊંચું હોય છે.
- ફિનોલ પાણી સાથે અંતરઆણ્વિક H-બંધ બનાવી આલ્કોહોલ કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ શકે છે.
- ફિનોલમાં જેમ -OH સમૂહની સંખ્યા વધે, તેમ તેનું ઉત્કલનબિંદુ અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધે છે.
- વિસ્થાપિત ફિનોલ સમઘટકો (o, m અને p)માં પણ ઉત્કલનબિંદુને આધારે વિવિધતા જોવા મળે છે.

● ફિનોલનો એસિડિક ગુણધર્મ

- ફિનોલ આલ્કોહોલ કરતાં પ્રબળ એસિડ છે પરંતુ તેની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા પ્રબળ એસિડ કરતાં ઓછી હોવાથી, તેનું તટસ્થીકરણ પ્રબળ આલ્કલી જેવા કે (NaOH) વડે થઈ શકે છે, પરંતુ Na_2CO_3 કે NaHCO_3 વડે તટસ્થીકરણ થઈ શકતું નથી.
- વિવિધ વિસ્થાપિત ફિનોલની એસિડિક પ્રબળતાના ક્રમ નીચે મુજબ છે :
 (1) 2,4,6 ટ્રાયનાઇટ્રોફિનોલ > 2, 4 ડાયનાઇટ્રોફિનોલ > 4 નાઇટ્રોફિનોલ > 2 નાઇટ્રોફિનોલ > 3 નાઇટ્રોફિનોલ > ફિનોલ
 (2) ફિનોલ > m-કેસોલ > p-કેસોલ > o-કેસોલ
 (3) o-હેલોફિનોલ, m-હેલોફિનોલ, p-હેલોફિનોલ > ફિનોલ
 (4) o-ક્લોરોફિનોલ > o-બ્રોમોફિનોલ > o-આયોડોફિનોલ > o-ફ્લોરોફિનોલ
 (5) m-મિથોક્સિ ફિનોલ > o-મિથોક્સિ ફિનોલ > p-મિથોક્સિ ફિનોલ

26. નીચેનામાંથી સૌથી વધુ પ્રબળ એસિડ કયો છે ?

- (A) o-ફ્લોરો ફિનોલ (B) o-ક્લોરો ફિનોલ (C) o-આયોડો ફિનોલ (D) o-બ્રોમો ફિનોલ

27. $\text{O}_2\text{N} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2 \xrightarrow[273-278\text{ K}]{\text{NaNO}_2 / \text{HCl}} \text{'X'} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}, \Delta]{\text{મંદ H}_2\text{SO}_4} \text{'Y'}$ પ્રક્રિયાની નીપજ 'Y' જણાવો.

- (A) p નાઇટ્રો ફિનોલ (B) બેન્ઝિન 1,4 ડાયોલ (C) નાઇટ્રોબેન્ઝિન (D) ફિનોલ

28. m નાઇટ્રોફિનોલમાંથી રિસોર્સિનોલ બનાવવા માટેની પ્રક્રિયાનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

- (A) હાઇડ્રોલિસિસ, ડાયએટાઇઝેશન, રિડક્શન (B) ડાયએટાઇઝેશન, રિડક્શન, હાઇડ્રોલિસિસ
 (C) રિડક્શન, ડાયએટાઇઝેશન, હાઇડ્રોલિસિસ (D) હાઇડ્રોલિસિસ, રિડક્શન, ડાયએટાઇઝેશન

29. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{આલ્કોહોલ}} \text{P} \xrightarrow[\text{H}_3\text{PO}_4, \Delta]{\text{C}_6\text{H}_6} \text{Q} \xrightarrow{\text{O}_2} \text{R} \xrightarrow{\text{મંદ H}_2\text{SO}_4} \text{T} + \text{S}$

ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયાની મુખ્ય એરોમેટિક નીપજ 'S' કઈ છે ?

- (A) ફિનાઇલ મિથેનોલ (B) o-કેસોલ (C) ફિનોલ (D) p-કેસોલ

30. $\text{X} \xrightarrow[\Delta]{\text{સંદ્ર H}_2\text{SO}_4} \text{બે સમઘટકોનું મિશ્રણ} \xrightarrow[\text{(ii) (મંદ) HCl}]{\text{(i) ઘન NaOH, } \Delta} \text{પેરાકેસોલ + ઓર્થોકેસોલ, પ્રક્રિયાનો}$

શરૂઆતનો પદાર્થ X = છે.









- (A) નાઇટ્રોબેન્ઝિન (B) બેન્ઝિન સલ્ફોનિક એસિડ
 (C) બેન્ઝિન (D) ટોલ્યુઇન

31. ફિનોલ અને ઇથેનોલની એસિડિક પ્રબળતાની સરખામણી માટે શું સાચું છે ?
- (A) ફિનોલ અને ઇથેનોલ બંને સ્થાયી ઋણ આયનો બનાવે છે તેથી તે બંનેની એસિડિક પ્રબળતા સમાન છે.
- (B) ફિનોલ સ્થાયી ઋણ આયન અને ઇથેનોલ અસ્થાયી ઋણ આયન બનાવતો હોવાથી, ફિનોલ, ઇથેનોલ કરતાં વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
- (C) ઇથેનોલ સ્થાયી ઋણ આયન અને ફિનોલ અસ્થાયી ઋણ આયન બનાવતો હોવાથી ઇથેનોલ, ફિનોલ કરતાં વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
- (D) ફિનોલ ઝડપથી ઋણ આયન બનાવે છે, જ્યારે ઇથેનોલ ધીમેથી ઋણ આયન બનાવે છે. તેથી ફિનોલ, ઇથેનોલ કરતાં વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
32. C_7H_8O સૂત્ર ધરાવતાં ફિનોલિક સમઘટકોને તેની એસિડ તરીકેની પ્રબળતાના યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો :
- (A) o-કેસોલ > m-કેસોલ > p-કેસોલ (B) m-કેસોલ > o-કેસોલ > p-કેસોલ
- (C) m-કેસોલ > p-કેસોલ > o-કેસોલ (D) p-કેસોલ > o-કેસોલ > m-કેસોલ

જવાબો : 26. (B), 27. A 28. (C), 29. (C), 30. (D), 31. (B), 32. (C)

• ફિનોલના ગુણધર્મો

(A) -OH સમૂહની પ્રક્રિયાઓ :




33. $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaHCO}_3$, પ્રક્રિયા દર્શાવે છે કે,

- (A) ફિનોલ કરતાં કાર્બોનિક એસિડ વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
- (B) ફિનોલ કરતાં પાણી વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
- (C) ફિનોલની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા કાર્બોનિક એસિડ કરતાં વધુ છે.
- (D) ફિનોલ કરતા કાર્બોનિક એસિડ વધુ પ્રબળ બેઈઝ છે.

34. ફિનોલ $\xrightarrow[\text{(ii) CO}_2/413\text{K}]{\text{(i) NaOH}} \text{X} \xrightarrow{\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}} \text{Y} \xrightarrow{(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2\text{O}} \text{Z}$ પ્રક્રિયાની અંતિમ નીપજ 'Z' કઈ છે ?

- (A) સેલિસાઈલિક એસિડ (B) સેલિસિલિક એસિડ (C) ફિનાઈલ એસિટેટ (D) એસ્પિરિન

35. રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા સાથે કયો ઈન્ટરમિડિએટ (મધ્યવર્તી) સંકળાયેલો છે ?
 (A) કાર્બોકિટાયન (B) કાર્બીન (C) કાર્બેનાયન (D) મુક્ત મુલક
36.  $\xrightarrow[\text{(ii) H}^+]{\text{(i) 6 થી 8\% NaOH, 600 K, 300 બાર}}$ 'X' $\xrightarrow[\text{C}_2\text{H}_5\text{COCl}]{\text{NaOH}}$ 'Y' $\xrightarrow{\text{નિ. AlCl}_3}$ 'Z',
 ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયાઓમાં X, Y અને Z કાર્બનિક પદાર્થો છે. પદાર્થ Y અને Z વચ્ચે કેવો સંબંધ છે ?
 (A) Z એ Yની વિલોપન નીપજ છે. (B) Z એ Yની વિસ્થાપિત નીપજ છે.
 (C) Z એ Yની પુનર્વિન્યાસ નીપજ છે. (D) Z એ Yની યોગશીલ નીપજ છે.
37. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ સાથે ઊભરા આપતું નથી ?
 (A) બેન્ઝોઈક એસિડ (B) પિક્સિક એસિડ
 (C) બેન્ઝિન સલ્ફોનિક એસિડ (D) ફિનોલ
38. ફિનોલની કયા પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા ઈથેનોલ કરતાં જુદી છે ?
 (A) તટસ્થ FeCl_3 (B) સોડિયમ ધાતુ (C) ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક (D) ઈથેનોઈલ ક્લોરાઈડ
39. ફિનોલની સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડમાં બનાવેલા દ્રાવણની કોની સાથેની પ્રક્રિયા વિલિયમસન સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય છે ?
 (A) આલ્કાઈલ હેલાઈડ (B) એસિડ હેલાઈડ (C) એસિડ એનહાઈડ્રાઈડ (D) હેલોજન એસિડ
40. ફિનોલની પ્રયોગશાળામાં પરખ કરવા માટે નીચે પૈકી કયા પ્રક્રિયકની જરૂર પડે છે ?
 (i) તટસ્થ FeCl_3 (ii) ડાયેઝોનિયમ ક્ષાર (iii) બ્રોમિન જળ
 (A) માત્ર (i), (ii) (B) માત્ર (i), (iii) (C) માત્ર (ii), (iii) (D) (i), (ii) અને (iii)
41. નીચે આપેલી પ્રક્રિયાઓ અને તેમાંથી મળતી નીપજ માટે કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?
 (A) ફાઈસ પુનર્વિન્યાસ $\rightarrow$ ફિનોલિક કીટોન (B) કોલ્બે સ્મીટ પ્રક્રિયા $\rightarrow$ હાઈડ્રોક્સિ કીટોન
 (C) રીમર ટીમાન પ્રક્રિયા $\rightarrow$ હાઈડ્રોક્સિ આલ્કાઈલ (D) વિલિયમસન પ્રક્રિયા $\rightarrow$ આલ્કાઈલ ફિનાઈલ ઈથર

જવાબો : 33. (A), 34. (D), 35. (B), 36. (C), 37. (D), 38. (A), 39. (A), 40. (D), 41. (B)

● ઈથર

આલ્કોહોલ અથવા ફિનોલમાંના હાઈડ્રોક્સિલ સમૂહમાંના H નું વિસ્થાપન આલ્કાઈલ અને/અથવા એરાઈલ સમૂહ વડે કરતાં બનતાં સંયોજનોને ઈથર કહે છે.

ઈથર સંયોજનોનું સામાન્ય અણુસૂત્ર : $\text{R} - \text{O} - \text{R}'$ છે.

ઈથર સંયોજનો અને આલ્કોહોલનું સામાન્ય અણુસૂત્ર $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ (સંતૃપ્ત આલ્કોહોલ / સંતૃપ્ત ઈથર માટે) છે.


ઈથર સંયોજનો સમમિત (દા.ત., $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$) તેમજ અસમમિત (દા.ત., $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) એમ બે પ્રકારના હોય છે.

ઈથરનું ઉત્કલનબિંદુ સમઘટકીય આલ્કોહોલ કરતાં નીચું હોય છે.


● ઈથરની બનાવટ

(A) આલ્કોહોલમાંથી :

- (i) (a) વધુ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ અને સાંદ્ર H_2SO_4 વચ્ચે 413 K તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં પાણીનો અણુ દૂર થઈ સમમિત ઈથર મળે છે.




- (b) આલ્કોહોલની બાષ્પને ગરમ કરેલા એલ્યુમિના પરથી 513-523 K તાપમાને પસાર કરતાં પાણીનો અણુ દૂર થઈ સમમિત ઈથર મળે છે.



- (ii) મિથાઈલ ઈથર બનાવવા માટે આલ્કોહોલને ડાયએઝો મિથેન સાથે HBF_4 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતાં ઈથર મળે છે.






- (iii) એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં આલ્કોહોલની, આલ્કીન સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયા કરતાં ઈથર મળે છે.



નોંધ : પરંતુ કેટલીક વખત આલ્કીનમાંથી ઉત્પન્ન થતાં કાર્બોકેટાયનમાં પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા થવાથી અન્ય ઈથર મળે છે.



(B) આલ્કાઈલ હેલાઈડમાંથી :

- (i) **વિલિયમ્સન સંશ્લેષણ :** સોડિયમ આલ્કોક્સાઈડ/સોડિયમ ફિનોક્સાઈડની આલ્કાઈલ હેલાઈડ સાથેની કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દ્વારા ઈથર બનાવી શકાય છે.











● ઈથરનાં રાસાયણિક ગુણધર્મો


(A) C - O બંધ તૂટવાથી થતી પ્રક્રિયાઓ :



ઉપર્યુક્ત બંને પ્રક્રિયાઓમાં HX ની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ : $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$.


- (ii) અસમમિત ઈથર માટે








42. તૃતીયક બ્યુટાઈલ મિથાઈલ ઈથર બનાવવા કઈ પ્રક્રિયા યોગ્ય છે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{Br} + (\text{CH}_3)_3\text{CONa} \rightarrow$ (B) $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + \text{CH}_3\text{ONa} \rightarrow$
 (C) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH} + \text{CH}_3\text{Cl} \rightarrow$ (D) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{Cl} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow$
43. $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$ અને $(\text{CH}_3)_3\text{COCH}_3$ ને HI સાથે ગરમ કરતાં મળતી નીપજો અનુક્રમે કઈ-કઈ છે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; $\text{CH}_3\text{I} + (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$ (B) $\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{I} + \text{CH}_3\text{OH}$
 (C) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$; $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{I} + \text{CH}_3\text{OH}$ (D) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$; $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH} + \text{CH}_3\text{I}$
44. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3 + \text{HBr} \rightarrow$
 (A) $\text{Br} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{OCH}_3$ અને H_2 (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{Br}$ અને CH_3Br
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH}$ અને CH_3Br (D) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{Br}$ અને CH_3OH
45.  પ્રક્રિયા,નું ઉદાહરણ છે.
 (A) વુર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા (B) ફિટિંગ પ્રક્રિયા (C) વિલિયમ્સન પ્રક્રિયા (D) વુર્ટ્ઝ-ફિટિંગ પ્રક્રિયા
46. $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{'P'} \xrightarrow[\text{CH}_3\text{COCl}]{\text{નિ. AlCl}_3} \text{'Q'}$ પ્રક્રિયાની કાર્બનિક નીપજો P અને Q અનુક્રમે કઈ છે ?
 (A) ફિનોલ, મિથોક્સિ બેન્ઝિન અને એસિટોફિનોન
 (B) મિથોક્સિ બેન્ઝિન, એસિટોફિનોન અને ફિનોલનું મિશ્રણ
 (C) મિથોક્સિ બેન્ઝિન, o અને p મિથોક્સિ એસિટોફિનોન
 (D) આયોડો બેન્ઝિન, એસિટોફિનોન
47. નીચે પૈકી કયા સંયોજનમાં C - O - C બંધકોણ સૌથી વધુ છે ?
 (A) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ (B) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$
 (C) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$ (D) $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$

જવાબો : 42. (A), 43. (B), 44. (C), 45. (C), 46. (C), 47. (D)

● સમગ્ર એકમ ઉપર આધારિત :

48.  P $\xrightarrow[\text{(ii) H}_3\text{O}^+]{\text{(i) O}_2/\Delta}$ Q + ફિનોલ પ્રક્રિયામાં P અને Q અનુક્રમે કઈ નીપજો છે ?
 (A)  અને $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (B)  અને CH_3COCH_3
 (C)  અને CH_3COCH_3 (D)  અને $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
49. $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ અને $\text{NaHCO}_{3(\text{aq})}$ વડે નીચે પૈકી કયા બે પદાર્થોના મિશ્રણમાંથી તે બે પદાર્થોને જુદા પાડી શકાય છે ?
 (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ અને $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ અને $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ અને $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ અને CH_3OH
50. નીચે પૈકી કયો પદાર્થ ફિનોલ અથવા ફિનોક્સાઈડ આયન બનાવી શકતો નથી ?
 (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{Na}$
51. CH_3OH અને $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ના મિશ્રણને સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં ગરમ કરતાં કઈ કાર્બનિક નીપજ મળશે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$ (B) CH_3OCH_3 અને $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$
 (C) $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$ અને $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ (D) CH_3OCH_3 , $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$ અને $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$

52. નીચેની પ્રક્રિયાની મુખ્ય નીપજ કઈ છે ?



53. o-નાઈટ્રોફિનોલ, p-નાઈટ્રોફિનોલ કરતાં પાણીમાં ઓછો દ્રાવ્ય છે. કારણ કે,

(A) o-નાઈટ્રોફિનોલ, p-નાઈટ્રોફિનોલ કરતાં વધુ બાષ્પશીલ વાયુ છે.

(B) o-નાઈટ્રોફિનોલનું ગલનબિંદુ p-નાઈટ્રોફિનોલ કરતાં વધુ છે.

(C) o-નાઈટ્રોફિનોલમાં આંતરઆણ્વિક H-બંધ છે.

(D) o-નાઈટ્રોફિનોલનું આણ્વિક દળ વધુ હોય છે.

54. નીચે આપેલાં સંયોજનમાંથી કયું સંયોજન આયોડિન અને NaOHના મિશ્રણ સાથે પીળા અવક્ષેપ આપશે નહિ ?

(A) ઈથેનોલ

(B) મિથેનોલ

(C) પ્રોપેન-2-ઓલ

(D) બ્યુટેન-2-ઓલ

55. (I) સાયક્લો હેક્ઝેનોલ, (II) એસિટિક એસિડ, (III) 2,4,6-ટ્રાયનાઈટ્રોફિનોલ (IV) ફિનોલને એસિડિક પ્રબળતાના યોગ્ય ક્રમમાં કઈ રીતે ગોઠવી શકાય ?





(A) II > III > IV > I

(B) III > IV > II > I

(C) III > II > IV > I

(D) III > II > I > IV

56. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન સૌથી વધુ એસિડિક છે ?



57. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ અણુસૂત્ર ધરાવતા પદાર્થ 'A' ની બે મોલ HI સાથે પ્રક્રિયા કરતાં, X અને Y મળે છે. Y ને જલીય આલ્કલી સાથે ઉકાળતા પદાર્થ Z મળે છે. પદાર્થ Z આયોડોફોર્મ કસોટી આપે છે, તો પદાર્થ A શું છે ?





(A) પ્રોપેન-2-ઓલ

(B) મિથોક્સિઇથેન





(C) પ્રોપેન-1-ઓલ

(D) ઈથોક્સિઇથેન

58. એનિસોલ $\xrightarrow[\text{નિ. AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{Cl}}$ P $\xrightarrow{\text{Cl}_2/\text{FeCl}_3}$ Q $\xrightarrow[\Delta]{\text{HBr}}$ S, પ્રક્રિયામાં અંતિમ નીપજ "S" કઈ છે ?



59. $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_5$ સંયોજન બનવા માટે નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા યોગ્ય છે ?



60. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા શક્ય છે ?

- (A) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{ONa} + (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{Br} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{O} - \text{C}(\text{CH}_3)_3$
 (B) $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{ONa} + (\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{Br} \rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OC}_6\text{H}_5$
 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{Br} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$

61. સાયક્લોહેક્ઝેનોલમાંથી સાયક્લોહેક્ઝીન મેળવવા કયો પ્રક્રિયક ઉપયોગી છે ?

- (A) સાંદ્ર $\text{HCl} + \text{ZnCl}_2$ (B) સાંદ્ર H_3PO_4 (C) HBr (D) સાંદ્ર HCl

62. વિલિયમસન સંશ્લેષણ પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

- (I) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2\text{Br}$ (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (III) $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2\text{Cl}$ (IV) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
 (A) $\text{III} > \text{II} > \text{IV} > \text{I}$ (B) $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{III}$ (C) $\text{II} > \text{III} > \text{IV} > \text{I}$ (D) $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

63. નીચે પૈકી કયો પદાર્થ આયોડોફોર્મ બનાવી શકે નહિ ?

- (A) આઈસો પ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ (B) 3-મિથાઈલ બ્યુટેન-2-ઓન
 (C) આઈસોબ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ (D) ઈથાઈલ મિથાઈલ કીટોન





64. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{P, I}_2} \text{A} \xrightarrow[\text{ઈથર}]{\text{Mg}} \text{B} \xrightarrow{\text{HCHO}} \text{C} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{D}$ પ્રક્રિયામાં અંતિમ નીપજ D =

- (A) n-બ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ (B) n-પ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ
 (C) પ્રોપેનાલ (D) બ્યુટેનાલ





65. ફિનોલની પ્રથમ સાંદ્ર H_2SO_4 અને ત્યાર બાદ નાઈટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા મળે છે.


- (A) નાઈટ્રોબેન્ઝિન (B) 2,4,6-ટ્રાયનાઈટ્રોબેન્ઝિન (C) O-નાઈટ્રોફિનોલ (D) m-નાઈટ્રોફિનોલ





66. નીચેના પૈકી કયા સંયોજનની Br_2 જળ સાથેની પ્રક્રિયાથી ટ્રાયબ્રોમો વ્યુત્પન્ન મળે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 


67. p-કેસોલ, ક્લોરોફોર્મ સાથે આલ્કલી માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરી નીપજ A મળે છે. પદાર્થ A ની HCN સાથે પ્રક્રિયા કરતાં નીપજ B મળે છે. પદાર્થ B નું જળવિભાજન કરતાં કિરાલ સંયોજન મળે છે. કિરાલ સંયોજન કયું છે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 

68.  + $\text{CO}_2 \xrightarrow[5 \text{ વાતી}]{125^\circ\text{C}} \text{B} \xrightarrow[\text{AC}_2\text{O}]{\text{H}^+} \text{C}$, પ્રક્રિયાની નીપજ "C" છે.

- (A)  (B)  (C)  (D) 

69. નીચે પૈકી કયો આલ્કોહોલ ઝડપથી લ્યુકાસ કસોટી આપશે ? કઈ ક્રિયાવિધિ દ્વારા ?
 (A) દ્વિતીયક આલ્કોહોલ, SN^1 (B) તૃતીયક આલ્કોહોલ, SN^1
 (C) દ્વિતીયક આલ્કોહોલ, SN^2 (D) તૃતીયક આલ્કોહોલ, SN^2



પ્રક્રિયાની અંતિમ નીપજ 'D' કઈ છે ?

- (A) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (B) $\text{CH}_3 - \text{O} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
 (C) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2\text{OH}$ (D) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 - \text{OH}$

જવાબો : 48. (C), 49. (A), 50. (C), 51. (D), 52. (B), 53. (C), 54. (B), 55. (C), 56. (B), 57. (B),
 58. (D), 59. (B), 60. (D), 61. (B), 62. (C), 63. (C), 64. (B), 65. (C), 66. (D), 67. (C),
 68. (A), 69. (B), 70. (D),

● એક કે તેથી વધુ વિકલ્પ ધરાવતાં પ્રશ્નો :


71. મિથાઈલ મેગ્નેશિયમ આયોડાઈડ સાથે નીચે પૈકી કયા પદાર્થની પ્રક્રિયા કરી 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-2-ઓલ બનાવી શકાય ?
 (A) પ્રોપેનો (B) ઈથાઈલ ઈથેનોએટ (C) ઈથેનાલ (D) ઈથિલિન ઓક્સાઈડ
72. 1° , 2° અને 3° આલ્કોહોલને દ્વારા અલગ પારખી શકાય.
 (A) $\text{Cu}/573 \text{ K}$ (B) વિક્ટર મેયર પદ્ધતિ (C) સાંદ્ર HCl/ZnCl_2 (D) બ્રોમિન જળ
73. ફિનોલ કરતાં ઓછો એસિડિક છે.
 (A) એસિટિક એસિડ (B) p-મિથોક્સિ ફિનોલ (C) p-નાઈટ્રો ફિનોલ (D) ઈથેનોલ
74. ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયકની સાથે પ્રક્રિયા કરતાં આલ્કેન મળે છે.
 (A) આલ્કોહોલ (B) ફિનોલ (C) પાણી (D) ઈથર
75. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા ઈથર બનાવી શકાય છે ?
 (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{CH}_3\text{ONa} \rightarrow$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{Br} \rightarrow$
 (C) $(\text{CH}_3)_2\text{CONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \rightarrow$ (D) $(\text{CH}_3)_2\text{CBr} + \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \rightarrow$
76. ફિનોલ નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા બનાવી શકાય ?
 (A) કલોરોબેન્ઝિનની $\text{KOH}_{(aq)}$ સાથેની જળવિભાજન પ્રક્રિયા દ્વારા
 (B) સોડિયમ સેલિસિલેટને $\text{NaOH} + \text{CaO}$ સાથે ગરમ કરીને
 (C) ક્યુમિન હાઈડ્રોપેરોક્સાઈડને મંદ H_2SO_4 સાથે પ્રક્રિયા કરાવીને
 (D) બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ જારને મંદ H_2SO_4 સાથે ગરમ કરીને
77. આલ્કોહોલમાંના $-\text{OH}$ સમૂહનું વિસ્થાપન કોના વડે કરી શકાતું નથી ?
 (A) SOCl_2 (B) Cl_2 (C) PCl_5 (D) $\text{P} + \text{Cl}_2$
78. નીચેનામાંથી કયાં વિધાનો સાચાં છે ?
 (A) ફિનોલનું બેન્ઝિન કરતાં સરળતાથી ઓક્સિડેશન થઈ શકે છે.
 (B) બેન્ઝાઈડાઈડ અને ફિનોલને NaHSO_3 વડે જુદા પાડી શકાય છે.
 (C) p-કેસોલ અને બેન્ઝોઈક એસિડને NaOH વડે જુદા પાડી શકાય છે.
 (D) ફિનોલ અને ઈથેનોલ વચ્ચેનો ભેદ તટસ્થ FeCl_3 વડે પારખી શકાય છે.

79. નીચેનામાંથી કયાં વિધાનો સાચાં છે ?

- (A) 4-ક્લોરોફિનોલ જલીય NaOH માં દ્રાવ્ય છે પરંતુ 4-ક્લોરો બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ જલીય NaOH માં દ્રાવ્ય નથી.
 (B) 4-મિથાઇલ બેન્ઝોઇક એસિડ $\text{NaHCO}_3(aq)$ માં દ્રાવ્ય છે પરંતુ 4-મિથાઇલ ફિનોલ $\text{NaHCO}_3(aq)$ માં દ્રાવ્ય નથી.
 (C) 2,4,6 ટ્રાયનાઇટ્રોફિનોલ, 4-મિથાઇલ ફિનોલ કરતાં વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
 (D) o-કેસોલ અને એનિસોલ વચ્ચેનો ભેદ જલીય NaOH વડે પારખી શકાય છે.

80. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા એસિડ-બેઇઝ છે ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa}$
 (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{જલીય HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaCl}$



81. કોલમ-Iમાં આપેલ પદાર્થોની જોડ વચ્ચેનો ભેદ પારખવા કોલમ-IIમાં આપેલ પદાર્થ/કસોટીને યોગ્ય રીતે જોડી વિકલ્પ પસંદ કરો :

કોલમ-I	કોલમ-II
(p) મિથેનોલ અને પ્રોપેન્-2-ઓલ	(i) સોડિયમ ધાતુ
(q) ફિનોલ અને સાયક્લોહેક્ઝેનોલ	(ii) લ્યુકાસ પ્રક્રિયક
(r) n-બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ અને તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ	(iii) $\text{NaOH} + \text{I}_2$
(s) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં ક્રિયાશીલસમૂહ સમઘટકો	(iv) FeCl_3

- (A) (p)-(iii), (q)-(iv), (r)-(ii), (s)-(i)
 (B) (p)-(ii), (q)-(iii), (r)-(iv), (s)-(i)
 (C) (p)-(iii), (q)-(i), (r)-(ii), (s)-(iv)
 (D) (p)-(ii), (q)-(iv), (r)-(i), (s)-(iii)

82. કોલમ-Iમાં આપેલી પ્રક્રિયાઓને કોલમ-IIમાં આ પ્રક્રિયાઓના નામ સાથે યોગ્ય રીતે જોડી વિકલ્પ પસંદ કરો.

કોલમ-I	કોલમ-II
(p) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{I} \rightarrow$	(i) કોલ્બે-સ્મીટ
(q) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2 / \text{OH}]{\text{(i) B}_2\text{H}_6}$	(ii) રીમર ટીમાન
(r) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 \xrightarrow[\text{દબાણ}]{\Delta}$	(iii) વિલિયમસન સંશ્લેષણ
(s) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{CHCl}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$	(iv) હાઇડ્રોબોરેશન-ઓક્સિડેશન
(A) (p)-(iii), (q)-(iv), (r)-(ii), (s)-(i)	(B) (p)-(iii), (q)-(iv), (r)-(i), (s)-(ii)
(C) (p)-(ii), (q)-(iii), (r)-(i), (s)-(iv)	(D) (p)-(ii), (q)-(iv), (r)-(i), (s)-(iii)

જવાબો : 71. (A), 72. (A), (B), (C), 73. (A), (C), 74. (A), (B), (C), 75. (B), (C), 76. (B), (C), (D), 77. (B), 78. (A), (B), (C), 79. (A), (B), (C), (D), 80. (B), (C), (D), 81. (A), 82. (B)

- નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં બે વિધાનો આપેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :


વિકલ્પો :

- (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને કારણ (R), વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપે છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે પરંતુ કારણ (R), વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપતું નથી.
 (C) વિધાન (A) સાચું છે પણ કારણ (R) ખોટું છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે પણ કારણ (R) સાચું છે.

83. વિધાન (A) : સમાન આણ્વિયદળ ધરાવતા ઈથર કરતાં આલ્કોહોલનું ઉત્કલનબિંદુ ઊંચું હોય છે.

કારણ (R) : આલ્કોહોલ અને ઈથર એકબીજાના સમઘટકો છે.

84. વિધાન (A) : નીચેનાં સંયોજનોમાં નિર્જળીકરણની પ્રક્રિયાની સરળતાનો ક્રમ :



કારણ (R) : -OH સમૂહ, દ્વિબંધ સાથે જેમ એકાંતરે હોય, તેમ નિર્જળીકરણ ઝડપથી થાય છે.

85. વિધાન (A) : $C_6H_5CH_2OCH_3$ સાથે HI ને ગરમ કરતાં $C_6H_5CH_2I$ અને CH_3OH મળે છે.

કારણ (R) : બેન્ઝાઈલ કાર્બોકિટાયનની સ્થિરતા મિથાઈલ કાર્બોકિટાયન કરતાં વધુ છે.

● ઈન્ટિજર ટાઈપનાં પ્રશ્નો : નીચે આપેલા પ્રત્યેક પ્રશ્નનો જવાબ 0 થી 9 સુધીના અંકોમાંનો કોઈ પણ એક અંક હોઈ શકે છે.

86. $C_5H_{12}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતા કેટલા સમઘટકો વિક્ટર મેયર કસોટીમાં લોહી જેવો લાલ રંગ આપશે ?

87. 64 ગ્રામ મિથેનોલની સોડિયમ ધાતુ સાથે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા થઈ કેટલા ગ્રામ ડાયહાઈડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે ?

88. $C_4H_{10}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં કેટલા સમઘટકો Na ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં નથી ?

89. ફિનોલની કાર્બનડાયસલ્ફાઈડમાં બનાવેલા બ્રોમિનના દ્રાવણની 0-5° સે તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં બેન્ઝિન વલયના કયા કાર્બન પર વિસ્થાપન થાય છે ?


90. C_7H_8O અણુસૂત્ર ધરાવતાં કેટલા સમઘટકો તટસ્થ $FeCl_3$ સાથે જાંબલી રંગ આપે છે ?

જવાબો : 83. (B) 84. (D), 85. (A), 86. 4 87. 2 88. 3 89. 4 90. 3


● કાર્બોનિલ સંયોજનો

કાર્બન-ઓક્સિજન દ્વિબંધ ($C=O$) ધરાવતા સમૂહને કાર્બોનિલ સમૂહ કહે છે. $C=O$ સમૂહ ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનોને કાર્બોનિલ સંયોજનો કહે છે.

કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ : કાર્બોનિલ સમૂહમાંનો કાર્બન અને ઓક્સિજન sp^2 સંકરણ ધરાવે છે. sp^2 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન પરમાણુ પોતાની sp^2 સંકૃત કક્ષકોનો ઉપયોગ કરી એક 'O' પરમાણુ અને બીજા બે અન્ય પરમાણુઓ સાથે ત્રણ σ -બંધ બનાવે છે. જે એક જ સમતલમાં એકબીજા સાથે 120°ના ખૂણે ગોઠવાયેલા હોય છે. કાર્બોનિલ કાર્બન, પોતાની 2p કક્ષકનું 'O' પરમાણુની 2p કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ કરી એક π બંધ બનાવે છે. 'O' પરમાણુ બે અબંધકારક ઈલેક્ટ્રોનયુગ્મ ધરાવે છે.




'O' પરમાણુની વિદ્યુત-ઋણતા "C" પરમાણુ કરતાં વધુ હોવાથી કાર્બોનિલ સમૂહ ઊંચી દ્વિધ્રુવી ચાકમાત્રા ધરાવે છે.




● આલ્ડિહાઈડ અને કીટોન

● કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે, એક આલ્કાઈલ (અથવા એરાઈલ) સમૂહ અને એક H જોડાયેલો હોય તેને આલ્ડિહાઈડ કહે છે.



- કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે, એક આલ્કાઈલ અને એક એરાઈલ સમૂહ અથવા બે સમાન કે અસમાન આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ સમૂહ જોડાયેલો હોય તેને કીટોન કહે છે.




- $\text{R}-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{R}'$ કીટોનમાં જો R અને R' સમૂહ સમાન હોય, તો તેને સાદા કીટોન કહે છે પરંતુ R અને R' સમૂહ અસમાન હોય, તો તેને મિશ્ર કીટોન કહે છે.
- આલ્ડિહાઈડ અને કીટોનમાં અણુસૂત્રો સમાન હોય, તો તેઓ એકબીજાં સાથે ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકતા ધરાવે છે.


● આલ્ડિહાઈડ અને કીટોનની બનાવટ

(A) આલ્કોહોલમાંથી :

(i) ઓક્સિડેશન



1° આલ્કોહોલ




2° આલ્કોહોલ

પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા : એસિડિક $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, આલ્કલાઈન KMnO_4 , $\text{CrO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ વડે નિયંત્રિત ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે છે.

મંદ ઓક્સિડેશનકર્તા : $\text{CrO}_3 \cdot 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ (પિરિડિનમાં), $\text{CrO}_3 \cdot 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ (CH_2Cl_2 માં),
(સેરેટ પ્રક્રિયક) (કોલીન પ્રક્રિયક)

PCC [પિરિડિનિયમ ક્લોરોકોમેટ (કોરેઝ પ્રક્રિયક)] અને PDC (પિરિડિનિયમ ડાયકોમેટ) વડે 1° આલ્કોહોલનું આલ્ડિહાઈડમાં ઓક્સિડેશન કરી શકાય છે.

(ii) ઓપનેર ઓક્સિડેશન



સંતૃપ્ત કે અસંતૃપ્ત


એસિટોન (વધુ)

કીટોન


આઈસોપ્રોપાઈલ આલ્કોહોલ

2° આલ્કોહોલ

(iii) ડિહાઈડ્રોજનેશન




1° આલ્કોહોલ




2° આલ્કોહોલ


(B) કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી :



કેલ્શિયમ ફોર્મેટ ફોર્માલ્ડિહાઇડ




મોનોબેઝિક એસિડનો કેલ્શિયમ ક્ષાર કીટોન (સાદો એટલે સમમિત)



આલ્ડિહાઇડ કીટોન ફોર્માલ્ડિહાઇડ

નોંધ : ઉપર્યુક્ત (b) અને (c) પ્રક્રિયાઓમાં $(RCOO)_2 Ca$ ફોર્મિક એસિડ સિવાયના કોઈ પણ મોનોબેઝિક એસિડનો કેલ્શિયમ ક્ષાર છે.







કેલ્શિયમ એડિયેટ

સાયક્લો પેન્ટેનોન

(ડાયબેઝિક એસિડનો Ca ક્ષાર)


(ચક્રીય કીટોન)

- (ii) એસિડની બાષ્પ અથવા જુદાં જુદાં એસિડના મિશ્રણની બાષ્પને MnO ઉદ્દીપક પરથી 573 K તાપમાને પસાર કરતાં આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન મળે છે.




(C) હાઈડ્રોકાર્બનમાંથી :

- (i) **આલ્કાઈનનું હાઈડ્રેશન :** ફક્ત ઇથાઈનના હાઈડ્રેશનથી ઇથેનાલ મળે, જ્યારે અન્ય કોઈ પણ આલ્કાઈનના હાઈડ્રેશનથી કીટોન મળે છે.




ઇનોલ (અસ્થાયી)


● નાઈટ્રાઈલ અને એસ્ટરનું રિડકશન




આ પ્રક્રિયાને સ્ટેફન રિડકશન પણ કહે છે.




AlH (iBu)_2 - ડાયઆસોલ્યુટાઈલએલ્યુમિનિયમ હાઈડ્રાઈડ છે.




● એરોમેટિક હાઈડ્રોકાર્બનમાંથી



(b) ગેટરમેન-સ્કોચ પ્રક્રિયા :





(c) ગેટરમેન-આલ્ડિહાઈડ સંશ્લેષણ :




ફિનોલની રીમરટીમાન પ્રક્રિયા : આગળની ફિનોલની પ્રક્રિયામાં ઉલ્લેખ કર્યો છે.

● ફક્ત કીટોનનું સંશ્લેષણ


● એસિડ ક્લોરાઇડમાંથી :



● નાઈટ્રાઈલમાંથી :



● બેન્ઝિન અથવા વિસ્થાપિત બેન્ઝિનનું એસાઈલેશન



● ફિનાઈલ એસ્ટરની પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા (ફાઈસ યુનર્વિન્યાસ) દ્વારા પણ ફિનોલિક કીટોન મેળવાય છે, જે ફિનોલની પ્રક્રિયામાં દર્શાવેલ છે.

91. એક મોલ સમમિત આલ્કિનનું ઓઝોનાલિસિસથી મળતી નીપજના જળવિભાજનથી કુલ 44g આણ્વિયદળ ધરાવતાં બે સમાન આલ્ડિહાઈડ આપે છે, તો આલ્કિન સંયોજન છે.

- (A) બ્યુટેન-2-ઈન (B) ઈથિન (C) પ્રોપિન (D) બ્યુટ-1-ઈન

92. કાર્બનિક સંયોજનના ઓઝોનાલિસિસથી એક નીપજ ફોર્માલ્ડિહાઈડ મળતી હોય, તો આ બાબત ની નિશ્ચિત હાજરી દર્શાવે છે.

- (A) વિનાઈલ સમૂહ (B) આઈસોપ્રોપાઈલ સમૂહ (C) એસિટિલિન ત્રિબંધ (D) બે ઈથિલિનિક દ્વિબંધ

93. $\text{PhC} \equiv \text{C} \cdot \text{Me} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+, \text{Hg}^{2+}} \dots\dots$

- (A) $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (B) $\text{PhCOCH}_2\text{CH}_3$ (C) $\text{PhCH}_2\text{COCH}_3$ (D) PhCOCOMe

94. બેન્ઝિન વલયમાં ફોર્માઈલ સમૂહ દાખલ કરવા કયા પ્રક્રિયકનો ઉપયોગ થાય છે ?

- (A) $\text{CrO}_2\text{Cl}_2/(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ (B) $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
(C) $\text{CO} + \text{HCl}$ (D) એસિડિક KMnO_4

95. પદાર્થને જલીય KOH સાથે ગરમ કરતાં એસિટાલ્ડિહાઈડ આપે છે.

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ (B) $\text{CH}_2\text{Cl} \cdot \text{CH}_2\text{Cl}$ (C) CH_3CHCl_2 (D) CH_3COCl





96. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{N} \xrightarrow{\text{"X"}} \text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CHO}$ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયક 'X' શું છે ?

- (A) $\text{SnCl}_2/\text{HCl}, \text{H}_2\text{O}/\Delta$ (B) $\text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4$ (C) $\text{LiAlH}_4/\text{ઈથર}$ (D) $\text{NaBH}_4/\text{ઈથર}, \text{H}_3\text{O}^+$

97. સૌથી વધુ દ્વિધ્રુવી ચાકમાત્રા ધરાવતો પદાર્થ છે.

- (A) ટ્રાન્સ બ્યુટ-2-ઈન (B) 1, 3-ડાયમિથાઈલ બેન્ઝિન
(C) એસિટોફિનોન (D) ઈથેનોલ

98.  $\xrightarrow{H_2, Pd-BaSO_4}$ પ્રક્રિયાની કાર્બનિક નીપજ કઈ છે ?
 (A) C_6H_5CHO (B) C_6H_5OH (C) $C_6H_5COCH_3$ (D) C_6H_5Cl

99.  $\xrightarrow[\text{એસિટોન}]{\text{એલ્યુમિનિયમ તૃતીયક બ્યુટોક્સાઈડ}}$
 (A)  (B)  (C)  (D) 

100. ગ્રીગનાર્ડ પ્રક્રિયકનું આલ્ડિહાઈડમાં રૂપાંતર કરવા કયા પદાર્થની જરૂર પડે ?
 (A) ઈથાઈલ ફોર્મેટ (B) ઈથાઈલ એસ્ટેટ
 (C) ઈથાઈલ સાયનાઈડ (D) હાઈડ્રોજન સાયનાઈડ

101. કેલ્શિયમ એસિટેટને ગરમ કરતાં નિસ્પંદન થઈ આપે છે.
 (A) એસિટાલ્ડિહાઈડ અને કેલ્શિયમ એક્સાઈડ (B) કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને એસિટિક એસિડ
 (C) એસિટોન અને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ (D) કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ અને CO_2

102. $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{OH}{|}}{C}} - CH_2 - OH \xrightarrow{H_2SO_4}$
 (A) $(CH_3)_2C=CH_2$ (B) $CH_3 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$
 (C) $(CH_3)_2\overset{\overset{OH}{|}}{C} - CHO$ (D) $(CH_3)_2CH - CHO$

103. નીચે પૈકી કયા પરિબળો $>C=O$ સમૂહની ધ્રુવીયતા વધારે છે ?
 (i) ધન પ્રેરક અસર ઉત્પન્ન કરતાં સમૂહની હાજરી
 (ii) ઋણ પ્રેરક અસર ઉત્પન્ન કરતાં સમૂહની હાજરી
 (iii) મોટા આલ્કાઈલ સમૂહની હાજરી
 (A) ફક્ત (i) (B) ફક્ત (ii) (C) (ii) અને (iii) (D) (i) અને (ii)

જવાબો : 92. (A), 93. (B), 94. (C), 95. (C), 96. (A), 97. (C), 98. (A), 99. (C), 100. (D), 101. (C), 102. (D), 103. (B)

● ભૌતિક ગુણધર્મો


- લગભગ સમાન આણ્વીયદળ ધરાવતાં કાર્બનિક સંયોજનો માટે ઉત્કલનબિંદુનો ક્રમ :
 કાર્બોક્સિલિક એસિડ > આલ્કોહોલ > સમઘટકીય કીટોન > સમઘટકીય આલ્ડિહાઈડ > ઈથર > હાઈડ્રોકાર્બન
- $>C=O$ સમૂહ ધ્રુવીય હોવાને કારણે આલ્ડિહાઈડ અને કીટોન સંયોજનોમાં અણુઓ અણુઓ વચ્ચે દ્વિધ્રુવી આકર્ષણબળ હોય છે.
- ઓછા આણ્વીયદળ ધરાવતા આલ્ડિહાઈડ અને કીટોન સંયોજન પાણી સાથે આંતર આણ્વીય H-બંધ બનાવતા હોવાથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે.

● રાસાયણિક ગુણધર્મો

● ઓક્સિડેશન :



(i) આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન :

- નિર્બળ (મંદ) ઓક્સિડેશનકર્તા જેવા કે, ટોલેન્સ પ્રક્રિયક (એમોનિકલ AgNO_3) ફેલ્ડિંગ પ્રક્રિયક (આલ્કાઇલાઇન Cu^{2+} નું ટાર્ટ્રેટ આયન સાથેના સંકીર્ણનું દ્રાવણ) તથા બેનેડિક્ટ પ્રક્રિયક (આલ્કાઇન Cu^{2+} નું સાઇટ્રેટ આયન સાથેના સંકીર્ણનું દ્રાવણ) તેમજ બ્રોમિન જળ વડે આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન અનુવર્તી એસિડમાં થાય છે.
- આ ઉપરાંત પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા જેવા કે, સાંદ્ર HNO_3 , $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}^+$ વડે પણ આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન અનુવર્તી એસિડમાં થાય છે.



(ii) કીટોનનું ઓક્સિડેશન :





- (a) માત્ર પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા વડે કીટોનનું ઓક્સિડેશન થઈ મૂળ સંયોજનમાં આવેલા કાર્બન કરતાં ઓછા કાર્બન ધરાવતા એસિડ મળે છે.



(iii) આલ્ડિહાઇડ અને કીટોનનું ઓક્સિડેશન




- (a) $\text{CH}_3 - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} -$ સમૂહ ધરાવતા (ફક્ત ઈથેનાલ અથવા અન્ય કીટોન) સંયોજનનું ઓક્સિડેશન NaOI

Or $(\text{NaOH} + \text{I}_2)$ વડે કરતાં પીળા રંગના આયોડોફોર્મના અવક્ષેપ મળે છે.




ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં $>\text{C} = \text{O}$ સમૂહની પડોશમાં આવેલ $[\text{CH}_3 -]$ Or $[- \text{CH}_2 -]$ સમૂહનું $>\text{C} = \text{O}$ માં ઓક્સિડેશન થાય છે.


● રિડક્શન



આ પ્રક્રિયાને મિરવિન-પોનડોર્ફ વર્લી રિડક્શન કહે છે.




(d) કીટોનનું દ્વિઆણ્વિક રિડક્શન :




● કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા





- આલ્ડિહાઈડ અને કીટોનમાં આવેલ $\begin{array}{c} \diagdown \\ C = O \\ \diagup \end{array}$ સમૂહ ધ્રુવીય છે તથા 'O' ઋણ વીજભારિત અને 'C' ધનવીજભારિત હોવાથી તેના તરફ કેન્દ્રાનુરાગી આકર્ષણ યોગશીલ નીપજ આપે છે.
- આલ્ડિહાઈડ અને કીટોનની કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ-પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા અવકાશીય અવરોધક અસર અને પ્રેરક અસર ઉપર આધાર રાખે છે.
- પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ :**
HCHO > CH₃CHO > CH₃COCH₃ > [(CH₃)₂CH]₂CO > [(CH₃)₃C]₂CO > C₆H₅CHO > C₆H₅COCH₃ > C₆H₅COC₆H₅
- કેટલીક કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયાઓ :**



આલ્ડિહાઈડ અથવા સાયનોહાઈડ્રિન
કીટોન





સોડિયમ બાયસલ્ફાઈટ



● આલ્ડોલ સંઘનન

- આલ્ડિહાઈડ અને કીટોનમાં α -કાર્બન પર આવેલો હાઈડ્રોજન એસિડિક હોવાથી તે આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. આ એસિડિક હાઈડ્રોજનની હાજરીને કારણે આલ્ડિહાઈડ અને કીટોન સંઘનન પ્રક્રિયા આપે છે.


(a) **સ્વયં સંઘનન** : α -હાઈડ્રોજન ધરાવતા આલ્ડિહાઈડ અથવા કીટોન મંદ આલ્કલીની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી β -હાઈડ્રોક્સિ આલ્ડિહાઈડ અથવા કીટોન આપે છે.





નોંધ : ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં **R = H** અથવા આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ સમૂહ હોઈ શકે.

(b) કોસ આલ્ડોલ સંઘનન : બે જુદા-જુદા આલ્ડિહાઈડ અથવા કીટોન અથવા એક આલ્ડિહાઈડ અને એક કીટોન કે જે દરેકમાં ઓછામાં ઓછો એક α -H પરમાણુ આવેલ હોય, તોપણ મંદ આલ્કલીની હાજરીમાં સંઘનન પ્રક્રિયા કરી ચાર નીપજોનું મિશ્રણ આપે છે. જેમાંની બે નીપજ સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનનથી અને બે નીપજ કોસ આલ્ડોલ સંઘનને કારણે પ્રાપ્ત થાય છે.

- જો બે જુદા-જુદા આલ્ડિહાઈડ અથવા બે જુદા-જુદા કીટોન અથવા એક આલ્ડિહાઈડ અને એક કીટોન સંયોજનમાંથી એક સંયોજનમાં α -H પરમાણુ ન હોય, તો માત્ર કોસ આલ્ડોલ સંઘનનથી એક જ નીપજ મળે છે.






- એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ અને ઓછામાં ઓછો એક α -H પરમાણુ ધરાવતા એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન સાથેની પ્રક્રિયાને ક્લેઈઝન-સ્મિથ સંઘનન પ્રક્રિયા કહે છે.





● કેનિઝરો પ્રક્રિયા :

- α -H પરમાણુ નુ ધરાવતા આલ્ડિહાઇડને સાંદ્ર આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયા કરતાં વિષમીકરણની પ્રક્રિયા થઈ આલ્કોહોલને એસિડ નીપજ આપે છે. આ પ્રક્રિયાને કેનિઝરો પ્રક્રિયા કહે છે.



ઇલેટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન (ઑરોમેટિક આલ્કિલાઇઝ/કીટોન)





નોંધ : >C=O સમૂહ નિ. AlCl_3 સાથે પ્રક્રિયા કરતો હોવાથી, એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ તેમજ કીટોન ફિઝલ કાફ્ટ પ્રક્રિયા આપતા નથી.

● આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવતી પ્રક્રિયાઓ

કસોટી	આલ્ડિહાઇડ	કીટોન
(i) ટોલેન્સ પ્રક્રિયક	ચાંદીનો અરીસો	કોઈ પ્રક્રિયા થાય નહિ.
(ii) ફેલિંગ પ્રક્રિયક	Cu_2O ના લાલ રંગના અવક્ષેપ (ફક્ત એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ)	કોઈ પ્રક્રિયા થાય નહિ.
(iii) બેનેડિક્ટ પ્રક્રિયક	Cu_2O ના લાલ રંગના અવક્ષેપ (ફક્ત R-CHO)	કોઈ પ્રક્રિયા થાય નહિ.
(iv) LiAlH_4 વડે રિડક્શન	1° આલ્કોહોલ	2° આલ્કોહોલ
(v) HCl વાયુની હાજરીમાં આલ્કોહોલ સાથેની પ્રક્રિયા	એસિટાલ	કેટાલ આપે નહિ.
(vi) સ્કિફ પ્રક્રિયક	ગુલાબી રંગ	કોઈ પ્રક્રિયા થાય નહિ.

104. મિથાઇલ કીટોનની પરખ વડે થઈ શકે છે.

- (A) સ્કિફ પ્રક્રિયક (B) $\text{NaOH} + \text{I}_2$ પ્રક્રિયક
(C) આલ્કલાઇન Cu^{2+} પ્રક્રિયક (D) એમોનિકલ AgNO_3 પ્રક્રિયક

105. કયું સંયોજન સાંદ્ર આલ્કલી સાથે પ્રક્રિયા કરી આલ્કોહોલ અને એસિડનો ક્ષાર આપતું નથી ?





- (A) ફોર્માલ્ડિહાઇડ (B) એસિટાલ્ડિહાઇડ (C) ટ્રાયક્લોરો ઇથેનાલ (D) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ

106. એસિટોફિનોન અને હાઇડ્રેઝીનને જ્યારે ઇથિલિન ગ્લાયકોલમાં KOH સાથે 453k તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે નીપજ મળે છે.

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_3$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

107. નીચેનાં સંયોજનોને ઉત્કલનબિંદુના ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવતાં બીજા ક્રમે કયું સંયોજન આવે ?

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (B) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_2\text{OH}$ (C) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$ (D) $\text{CH}_3\cdot(\text{CH}_2)_3\cdot\text{CH}_3$

108. નીચેનાં સંયોજનોની HCN સાથેની યોગશીલ પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો કયો ક્રમ સાચો છે ?
 I : CH_3CHO , II : CH_3COCH_3 , III : $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$, IV : HCHO
 (A) $\text{III} < \text{II} < \text{I} < \text{IV}$ (B) $\text{IV} < \text{I} < \text{II} < \text{III}$ (C) $\text{III} < \text{I} < \text{II} < \text{IV}$ (D) $\text{IV} < \text{II} < \text{I} < \text{III}$
109. નીચેનામાંથી કયો પ્રક્રિયક એસિટોન અને બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી ?
 (A) સોડિયમ હાઇડ્રોજનસલ્ફાઇટ (B) ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝિન
 (C) ફેલ્ડિંગ દ્રાવણ (D) ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક
110. કેલ્શિયમ એસિટેટ $\xrightarrow{\Delta}$ x $\xrightarrow{\text{Zn-Hg}+\text{HCl}}$ y પ્રક્રિયાની અંતિમ નીપજ y કઈ છે ?
 (A) પેન્ટેન ડાયલ (B) સાયકલો પેન્ટેનાલ (C) સાયકલો પેન્ટેનોલ (D) સાયકલો પેન્ટેનોન
111. પદાર્થ 'X' + $\text{HCN} \rightarrow \text{Y} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ α -હાઇડ્રોક્સિ એસિડનું રેસેમિક મિશ્રણ. આ પ્રક્રિયામાં પદાર્થ 'X' શું છે ?
 (A) HCHO (B) CH_3CHO (C) CH_3COCH_3 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5$
112. CH_3CHO અને $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$ નાં મિશ્રણમાંથી CH_3CHO ને અલગ કરવા કયો પ્રક્રિયક જરૂરી છે ?
 (A) NaHSO_3 (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$ (C) NH_2OH (D) $\text{NaOH}+\text{I}_2$
113. $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{N}-\text{OH} \xrightarrow{[\text{H}^+]}$ $\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}-\text{OH}$ પ્રક્રિયા કેવા પ્રકારની છે ?
 (A) ઇલેક્ટ્રોનઅનુરાગી યોગશીલ, વિલોપન પ્રક્રિયા (B) મુક્ત મુલક યોગશીલ, વિલોપન પ્રક્રિયા
 (C) ઇલેક્ટ્રોનઅનુરાગીવિલોપન પ્રક્રિયા (D) કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા
114. $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CH}=\text{CHCOCH}_3 \rightarrow \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ પ્રક્રિયા માટે કયો પ્રક્રિયક સૌથી વધારે યોગ્ય છે ?
 (A) Zn-Hg/HCl (B) $\text{NH}_2\cdot\text{NH}_2/\text{OH}^-$ (C) NaBH_4 (D) પ્રવાહી NH_3 અને Na
115. બ્યુટેનોન અને પેન્ટેન-3-ઓન વચ્ચેનો તફાવત આ પ્રક્રિયકની મદદથી જાણી શકાય છે ?
 (A) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (B) Zn-Hg/HCl (C) SeO_2 (D) $\text{I}_2 + \text{NaOH}$
116. પ્રબળ બેઈઝમાંથી α -હાઇડ્રોજન આકર્ષી શકે છે.
 (A) ક્વીનોન (B) આલ્ડેન (C) આલ્ડિન (D) એમાઈન
117.  $\xrightarrow[\text{(ii) Zn/H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$ x $\xrightarrow[\text{NaOH}]{\text{મંદ}}$ y, પ્રક્રિયાની અંતિમ કાર્બનિક નીપજ 'Y' કઈ છે ?
 (A)  (B)  (C)  (D) 
118. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા એકમાત્ર કાર્બનિક નીપજ 3-હાઇડ્રોક્સિ બ્યુટેનાલ નીપજ મળે છે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{CHO} + (\text{CH}_3)_2\text{CO} \xrightarrow{\text{મંદ NaOH}}$ (B) $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{મંદ NaOH}}$
 (C) $(\text{CH}_3)_2\text{CO} + (\text{CH}_3)_2\text{CO} \xrightarrow{\text{મંદ NaOH}}$ (D) $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{મંદ NaOH}}$

119. $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CHO} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} \xrightarrow[\text{(ii)}-\text{H}_2\text{O}]{\text{(i)}\text{OH}^-} \text{x} \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{y}$ પ્રક્રિયાની નીપજ y કઈ છે ?

- (A) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH} = \text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (B) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{OH}$
 (C) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{OH}$ (D) $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

120. બ્યુટેન-2-ઓનનું પ્રોપેનોઈક એસિડમાં રૂપાંતર કયા પ્રક્રિયક વડે કરી શકાય છે ?


- (A) NaOH, NaI/H⁺ (B) ફેલ્ડિંગ પ્રક્રિયક (C) NaOH, I₂/H⁺ (D) ટોલેન્સ પ્રક્રિયક





121. બેન્ઝાલિહાઈડ અને ફોર્માલિહાઈડનું મિશ્રણ જલીય NaOH (50%)ના દ્રાવણ સાથે ગરમ કરતાં _____ આપે છે.

- (A) બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ અને સોડિયમ ફોર્મેટ (B) સોડિયમ બેન્ઝોએટ અને મિથાઈલ આલ્કોહોલ
 (C) સોડિયમ બેન્ઝોએટ અને સોડિયમ ફોર્મેટ (D) બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ અને મિથેનોલ

122. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH}_3 \xrightarrow{\text{CN}^-} \text{x} \xrightarrow{95\%\text{H}_2\text{SO}_4} \text{y}$ પ્રક્રિયાની નીપજ y કઈ છે ?

- (A) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{COOH}$ (B) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CN}$
 (C) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}} - \text{COOH}$ (D) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CO} - \text{NH}_2$


123.  $\xrightarrow[\text{(ii)}\text{H}_3\text{O}^+]{\text{(i)}\text{CH}_3\text{MgBr, સૂકા ઇથર}}$

- (A)  (B)  (C)  (D) 


જવાબો : 104. (B), 105. (B), 106. (C), 107. (C), 108. (A), 109. (C), 110. (D), 111. (B),
 112. (A), 113. (D), 114. (B), 115. (D), 116. (A), 117. (A), 118. (D), 119. (B),
 120. (C), 121. (A), 122. (A), 123. (D)

● કાર્બોક્સિલિક એસિડ

કાર્બોનિલ સમૂહ ($\text{C}=\text{O}$)માંના કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે એક આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ સમૂહ જોડાયેલો હોય અને બીજો હાઈડ્રોક્સિલ સમૂહ જોડાયેલો હોય, તો આવાં સંયોજનોને કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો કહે છે. આ સંયોજનોમાં $-\text{COOH}$ સમૂહ (કાર્બોક્સિલ સમૂહ) હોય છે.



● $-\text{COOH}$ સમૂહનું બંધારણ




સમતલીય બંધારણ






- આલ્કિહાઈડ અને કીટોનમાંના કાર્બોનિલ કાર્બન કરતાં એસિડમાંનો કાર્બોક્સિલિક કાર્બન ઓછો ઇલેક્ટ્રોનઅનુરાગી છે.

● કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ


- આલ્ડિહાઇડ, કીટોન, મિથાઇલ કીટોન અને આલ્કોહોલ (1°, 2°)નું ઓક્સિડેશન :
- આ એકમના આગળના ભાગમાં દર્શાવેલ છે.
- જળવિભાજન પ્રક્રિયા દ્વારા :




- આ પ્રક્રિયામાં મધ્યવર્તી એમાઇડ સંયોજન મળે છે.




- આલ્કિન, આલ્કાઇન અને સાયકલો આલ્કિનનું ઓક્સિડેશન :







અલ્ડિન




ચક્રીય અલ્ડિન

● ઓલિફિનમાંથી (ક્રોય પ્રક્રિયા) :



● ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયકમાંથી :




● સોડિયમ આલ્કોક્સાઈડમાંથી :




● આલ્કાઈલબેન્ઝિનનું ઓક્સિડેશન :

(i) મોનો આલ્કાઈલ બેન્ઝિન



(ii) ડાયઆલ્કાઈલ બેન્ઝિન



124. પદાર્થ 'X' $\xrightarrow[(ii) H_3O^+]{(i) CO_2, \text{સૂકો ઇથર}}$  CH_2COOH પ્રક્રિયામાં પદાર્થ 'X' શું છે ?






- (A) C_6H_5MgBr (B) C_6H_5OH (C) $C_6H_5CH_2MgBr$ (D) C_6H_5CHO



125. નીચે પૈકી કયા પદાર્થના જળવિભાજનથી બેન્ઝોઈક એસિડ બનાવી શકાતો નથી ?





- (A) ઇથાઈલ બેન્ઝિન (B) ફિનાઈલ સાયનાઈડ (C) મિથાઈલ બેન્ઝોએટ (D) બેન્ઝાઈલ ક્લોરાઈડ

126. $R - CH_2 - OH \xrightarrow{"x"} R - CH_2Cl \xrightarrow{KCN} 'y' \xrightarrow{"z"} R - CH_2COOH$ પ્રક્રિયામાં પદાર્થ x, y અને z જણાવો.





- | x | y | z |
|-------------|-----------|-----------------|
| (A) PCl_5 | RCH_2CN | $H^+, 2H_2O$ |
| (B) HCl | RCN | $OH^-, +2H_2O$ |
| (C) PCl_3 | RCH_2NC | $KMnO_4 / OH^-$ |
| (D) Cl_2 | RCH_2CN | $OH^-, +2H_2O$ |








128.  અને  મેળવવા માટે નીચે પૈકી કયા પદાર્થની જળવિભાજન-પ્રક્રિયા કરવી પડે ?



129. નીચે પૈકી કયા પદાર્થના એસિડિક અથવા બેઝિક $KMnO_4$ વડે થતાં ઓક્સિડેશનથી આઈસોબ્યુટિરિક એસિડ મળી શકતો નથી ?



130.  $\xrightarrow{NaBH_4}$ 'P' $\xrightarrow{ZnCl_2 + HCl}$ 'Q' $\xrightarrow{KCN}$ 'R' $\xrightarrow{H_3O^+}$ 'S' પ્રક્રિયામાં અંતિમ નીપજ 'S' કઈ છે ?






જવાબો : 124. (B), 125. (A), 126. (A), 127. (D), 128. (B), 129. (D), 130. (C)

● કાર્બોક્સિલિક એસિડના ભૌતિક ગુણધર્મો


- RCOOH, પાણીના અણુઓ સાથે આંતરઆણ્વિક H-બંધ બનાવતો હોવાથી, ઓછા આણ્વિક દળ ધરાવતા એસિડ પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે.
- RCOOH ના અણુઓ વચ્ચે પ્રબળ H-બંધ બનતો હોવાથી તે ઊંચું ઉત્કલનબિંદુ ધરાવે છે. તે ઘન, પ્રવાહી તેમજ બાષ્પ અવસ્થામાં ડાયમર તરીકે વર્તે છે.

● કાર્બોક્સિલિક એસિડનો એસિડિક સ્વભાવ

- RCOOHનું પ્રબળ તેમજ નિર્બળ બેઈઝ વડે તટસ્થીકરણ થાય છે. પ્રયોગશાળામાં RCOOHની NaHCO_3 સાથેની પ્રક્રિયા અથવા Na_2CO_3 સાથેની પ્રક્રિયા દરમિયાન CO_2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે.
- RCOO^- ની સ્થિરતા $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$ કરતા વધારે હોવાથી, RCOOH સંયોજક $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ કરતાં પ્રબળ એસિડિક છે.
- વિવિધ એલેક્ટ્રિક કાર્બોક્સિલિક એસિડની સાપેક્ષ પ્રબળતાનો આધાર વિસ્થાપિત સમૂહની + I અથવા - I અસર ઉપર આધાર રાખે છે, જે નીચેનાં ઉદાહરણોમાં દર્શાવેલ છે :








● સામાન્ય સ્વરૂપમાં ક્રમ :



● વિવિધ વિસ્થાપિત એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડની પ્રબળતા માટે નીચે મુજબના ક્રમ દર્શાવી શકાય :








(m-સ્થાનમાં સંસ્પંદન અસર ધ્યાનમાં લેવી નહિ)







● કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંના - COOH માં C - OH બંધનું ખંડન

(કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નોની બનાવટ)








● સમગ્ર - COOH સમૂહની પ્રક્રિયાઓ

(i) રિડક્શન :




(ii) ડીકાર્બોક્સિલેશન



(e) એસિડના કેલ્શિયમ ક્ષારનું નિસ્ચંદન કરતાં આલ્ડીહાઇડ તેમજ કીટોન મળે છે, જે આગળના ભાગમાં આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનની બનાવટમાં દર્શાવેલ છે.


● એલિફેટિક એસિડમાંના આલ્કાઇલ સમૂહનું હેલોજીનેશન



α હેલો કાર્બોક્સિલિક એસિડ


આ પ્રક્રિયાને હેલ-વોલહાર્ડ ઝેલિસ્કાય કહે છે.

● એરોમેટિક એસિડમાંના એરાઇલ સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોનઅનુરાગી વિસ્થાપન



- COOH, $AlCl_3$ સાથે બંધ બનાવતો હોવાથી ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા થતી નથી.

131. નીચે આપેલાં એસિડ સંયોજનોને તેમની એસિડિક પ્રબળતાના યોગ્ય ક્રમમાં કઈ રીતે ગોઠવી શકાય :




(A) $s < p < q < r$ (B) $p < s < r < q$ (C) $s < p < r < q$ (D) $q < s < p < r$

132. નીચે આપેલ કયો વિકલ્પ એસિડની પ્રબળતા માટે સાચો છે ?

- (A) 4- મિથોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ < બેન્ઝોઇક એસિડ < 4-નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ < 3,4 ડાયનાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ
 (B) બેન્ઝોઇક એસિડ < 4- મિથોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ < 4-નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ < 3-4 ડાયનાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ
 (C) 3-4- ડાયનાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ < 4-નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ < 4-મિથોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ < બેન્ઝોઇક એસિડ
 (D) 4-મિથોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ < 4-નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ < બેન્ઝોઇક એસિડ < 3,4 ડાયનાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ

133. નીચે આપેલાં સંયોજનોની એસિડિક પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?



(A) III > IV > II > I (B) IV > III > I > II (C) III > II > I > IV (D) II > III > IV > I

134. નીચે પૈકી કયાં સંયોજનોની જોડ NaHCO_3 ના જલીય દ્રાવણ સાથે CO_2 વાયુના ઊભરા આપશે ?

(i) CH_3COCl (ii) CH_3COCH_3 (iii) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ (iv) $\text{CH}_3\text{CO} - \text{O} - \text{COCH}_3$
 (A) (i), (ii) (B) (i), (iv) (C) (ii), (iii) (D) (i), (iii)




135. કયા સંયોજનની બાષ્પશીલતા સૌથી વધુ છે ?

(A) o-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ (B) p-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ
 (C) m-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ (D) બેન્ઝોઇક એસિડ

136. એસાઇલ સંયોજનોની કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન-પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ :

(A) એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ > એમાઇડ > એસ્ટર > એસાઇલ ક્લોરાઇડ
 (B) એસાઇલ ક્લોરાઇડ > એસ્ટર > એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ > એમાઇડ
 (C) એસાઇલ ક્લોરાઇડ > એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ > એસ્ટર > એમાઇડ
 (D) એસ્ટર > એસાઇલ ક્લોરાઇડ > એમાઇડ > એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ

137. નીચેનાં સંયોજનોને જળવિભાજન પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાના ઊતરતા ક્રમમાં કઈ રીતે યોગ્ય ગોઠવી શકાય ?

(i)  (ii)  (iii)  (iv) 
 (A) (ii) > (iv) > (i) > (iii) (B) (ii) > (i) > (iii) > (iv)
 (C) (i) > (ii) > (iii) > (iv) (D) (iv) > (ii) > (i) > (iii)

138. LiAlH_4 વડે પ્રોપ-2 ઈનોઇક એસિડ રિડક્શન કરતાં કઈ નીપજ મળે ?


(A) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ (B) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$
 (C) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2\text{OH}$ (D) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CHO}$

139. એસિટાઇલ ક્લોરાઇડને સોડિયમ પ્રોપિયોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં કઈ નીપજ મળે છે ?

(A) એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ (B) n-પ્રોપાઇલ એસિટેટ
 (C) એસિટિક પ્રોપિયોનિક એનહાઇડ્રાઇડ (D) પેન્ટેન 2,4-ડાયોન

140. કયા સંયોજનનો pKa સૌથી ઓછો છે ?


(A) p-નાઇટ્રોફેનિક એસિડ (B) p-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ
 (C) o-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ (D) p-ટોલ્યુઇક એસિડ



141. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} \rightarrow$  પ્રક્રિયા માટે જરૂરી પ્રક્રિયકોનો કયો સેટ સાચો છે ?

(A) P_4 / Cl_2 , Na, સંદ્ર H_2SO_4 (B) P_2O_5 , LiAlH_4
 (C) $\text{P}_2\text{O}_5 / \Delta$, H_2O , P_4 / Cl_2 , Na (D) P_4 / Cl_2 , Na, $\text{P}_2\text{O}_5 / \Delta$

142. ફિનોલ $\xrightarrow[\text{રજ., } \Delta]{\text{Zn}}$ P $\xrightarrow{[\text{નિ. AlCl}_3]} \text{CH}_3\text{Cl}$ Q $\xrightarrow[\text{H}_3\text{O}^+]{\text{KMnO}_4 / \text{OH}^-}$ R પ્રક્રિયામાં નીપજ “R” છે ?

- (A) બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ (B) બેન્ઝોઇક એસિડ (C) બેન્ઝિન (D) ટોલ્યુઇન





143.  $\xrightarrow[\text{જ.વિ.}]{\text{H}_3\text{O}^+}$ P $\xrightarrow{\Delta}$ Q, પ્રક્રિયાની કાર્બનિક નીપજ Q કઈ છે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 

144. $\text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) લાલ P / Br}_2}$ x $\xrightarrow[\text{(ii) H}_3\text{O}^+]{\text{(i) KCN}}$ y, પ્રક્રિયામાં અંતિમ નીપજ y કઈ છે ?

- (A) ગ્લાયકોલિક એસિડ (B) સક્સિનિક એસિડ
(C) α - હાઇડ્રોક્સિ પ્રોપિયોનિક એસિડ (D) મેલોનિક એસિડ


145. o-ટોલ્યુઇક એસિડની FeBr_3 ની હાજરીમાં Br_2 સાથે પ્રક્રિયા કરતાં કઈ નીપજ મળે છે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 


જવાબો : 131. (A), 132. (A), 133. (B), 134. (B), 135. (A), 136. (C), 137. (A), 138. (C), 139. (B), 140. (C), 141. (D), 142. (B), 143. (A), 144. (D), 145. (B),

● કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નો


કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નો નીચે મુજબ છે :




એસિડ ક્લોરાઇડ



એસિડ એમાઇડ



એસ્ટર



એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ

આ સંયોજનોને પણ કાર્બોનિલ સંયોજનો કહે છે કારણ કે તે દરેકમાં $\text{C}=\text{O}$ (કાર્બોનિલ સમૂહ) હાજર છે.

આ સંયોજનોની બનાવટ અને તેમની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આ એકમમાં અગાઉના અલગ-અલગ વિભાગમાં દર્શાવેલ છે.

146. કોઈ એક પ્રવાહીને ઈથેનોલ સાથે મિશ્ર કરી તેમાં થોડાં ટીપાં સાંદ્ર H_2SO_4 ના ઉમેરતાં ફળ જેવી વાસ ધરાવતો પદાર્થ બને છે, તો તે પ્રવાહી કયું છે ?

- (A) HCHO (B) CH_3COCH_3 (C) CH_3COOH (D) CH_3OH

147. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}}$ x $\xrightarrow[\text{NaOH}]{\text{જલીય}}$ y $\xrightarrow[\text{I}_2\text{વધુ}]{\text{Na}_2\text{CO}_3}$ z ↓ પ્રક્રિયામાં પદાર્થ “z” શું છે ?

- (A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (C) CHI_3 (D) CH_3CHO

148. જો કોઈ એક કાર્બનિક સંયોજનના 1 મોલનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થઈ એસિડ મેળવવા માટે 0.5 મોલ O_2 વાયુની જરૂર પડે છે, તો તે કાર્બનિક સંયોજન શું હોઈ શકે ?

- (A) આલ્કોહોલ (B) આલ્ડીહાઇડ (C) ઈથર (D) કિટોન

149. C_6H_{12} અણુસૂત્ર ધરાવતો હાઈડ્રોકાર્બન બ્રોમિન જળનો રંગ દૂર કરે છે અને હાઈડ્રોજનેશનથી n-હેક્ઝેન આપે છે. $KMnO_4$ વડે ઓક્સિડેશન કરતાં તે જુદા જુદા બે કાર્બોક્સિલિક એસિડ ($R - COOH$) આપે છે, તો સંયોજન કયું હશે ?
 (A) સાયક્લોહેક્ઝેન (B) હેક્ઝ-2-ઇન (C) હેક્ઝ-1-ઇન (D) હેક્ઝ-3-ઇન

150. $PhMe \xrightarrow[(ii) H_3O^+]{(i) KMnO_4 / OH^-} P \xrightarrow{SOCl_2} Q \xrightarrow{PhCOONa} R$. ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયાની અંતિમ નીપજ R કઈ છે ?


- (A) C_6H_5COCl (B) $C_6H_5CONH_2$ (C) C_6H_5COOH (D) $(C_6H_5CO)_2O$

151. $CH_3CH_2COOH \xrightarrow{NH_3} P \xrightarrow{Br_2 + KOH} Q \xrightarrow{HNO_2} R$. પ્રક્રિયાની અંતિમ કાર્બનિક નીપજ કઈ છે ?
 (A) CH_3OH (B) C_2H_5OH (C) $C_2H_5NH_2$ (D) $CH_3CH_2CH_2OH$

152. $CH_3COOH + PCl_5 \rightarrow X \xrightarrow[નિ. AlCl_3]{C_6H_6} Y \xrightarrow[H_2O]{C_6H_5MgBr} Z$ આ પ્રક્રિયામાં અંતિમ કાર્બનિક નીપજ Z કઈ છે ?


- (A) $CH_3CH(OH)C_6H_5$ (B) $CH_3C(C_2H_5)(OH)C_6H_5$
 (C) $(C_6H_5)_2C(OH)(CH_3)$ (D) $CH_3COC_6H_5$

153. નીચે આપેલાં સંયોજનો P અને Q નું જળ-વિભાજન કરતાં મળતી નીપજોને કયા પ્રક્રિયક વડે અલગ પારખી શકાય ?







- (A) લ્યુકાસ પ્રક્રિયક (B) 2,4 DNP (C) ફેલ્ડિંગ પ્રક્રિયક (D) $NaHSO_3$

154. નીચેની પ્રક્રિયાઓ ધ્યાનમાં લઈ નક્કી કરો કે કઈ પ્રક્રિયાની નીપજ કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે ?



- (A) I, II, III (B) I, III (C) I, II (D) I

155. $C_4H_8O_3$ અણુસૂત્ર ધરાવતો કાર્બનિક સંયોજન 'X' પ્રકાશક્રિયાશીલ છે. તે $NaHCO_3$ સાથે CO_2 ના ઊભરા આપે છે. આ પદાર્થ $LiAlH_4$ સાથે પ્રક્રિયા કરી બિનકિરાલ સંયોજન આપે છે. પદાર્થ 'X' શું છે ?



156. $CH_3COOH \xrightarrow{LiAlH_4} X \xrightarrow{PCl_5} Y \xrightarrow[KOH]{આલ્કોહોલ} Z$ અંતિમ નીપજ Z કઈ છે ?

- (A) એસિટાલ્કીહાઈડ (B) એસિટિલિન (C) ઇથિલિન (D) એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ

157. કાર્બનિક સંયોજન 'A' એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરી નીપજ B મળે છે. B ને ગરમ કરતાં પદાર્થ 'C' મળે છે. પદાર્થ C ની Br_2 અને KOH સાથે પ્રક્રિયા કરતાં $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ મળે છે. પદાર્થ A છે.

- (A) CH_3COOH (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CHOOH}$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

158. પદાર્થ સોડિયમ કાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરી CO_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરતો નથી.

- (A) બેન્ઝોઈક એસિડ (B) બેન્ઝિન સલ્ફોનિક એસિડ
(C) સેલિસિલિક એસિડ (D) કાર્બોલિક એસિડ

159. 180 આણ્વીયદળ ધરાવતું કાર્બનિક સંયોજન CH_3COCl વડે એસાઈલેશન પામી 390 આણ્વીયદળ ધરાવતું સંયોજન આપે છે, તો મૂળ કાર્બનિક સંયોજનમાં $-\text{NH}_2$ સમૂહની સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (A) 2 (B) 5 (C) 4 (D) 6





160. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow[\text{KOH}]{\text{આલ્કો}} \text{x} \xrightarrow[\text{CCl}_4]{\text{Br}_2} \text{y} \xrightarrow[\text{વધુ}]{\text{KCN}} \text{z} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{M}$

ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયામાં નીપજ "M" કઈ છે ?

- (A) સક્સિનિક એસિડ (B) મેલોનિક (C) મલેઈક એસિડ (D) ઓક્ઝોલિક એસિડ

● એક કે એકથી વધુ વિકલ્પ ધરાવતા પ્રશ્નો :

161. કયું સંયોજન ચલરૂપકતા ધરાવે છે ?



162. ફિનોલ અને બેન્ઝોઈક એસિડ વચ્ચેનો ભેદ સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા જાણી શકાય છે.

- (A) જલીય NaOH (B) જલીય NaHCO_3 (C) તટસ્થ FeCl_3 (D) Br_2 જળ





163. નવો કાર્બન-કાર્બન બંધ બનતો હોય તેવી પ્રક્રિયા છે.

- (A) કેનિઝારો પ્રક્રિયા (B) ફ્રિડલ-ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા (C) રિમર ટિમાન પ્રક્રિયા (D) કલેમેનસન પ્રક્રિયા

164. નીચે પૈકી કયું પરિવર્તન વૃદ્ધકિસ્નર રિડક્શન દ્વારા શકાય છે ?

- (A) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડમાંથી બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ (B) સાયક્લોહેક્ઝેનોનમાંથી સાયક્લોહેક્ઝેન
(C) બેન્ઝોઈલ ક્લોરાઈડમાંથી બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ (D) બેન્ઝોફિનોનમાંથી ડાયફિનાઈલ મિથેન

165. નીચેની પ્રક્રિયાની કોસ આલ્ડોલ નીપજ કઈ છે ?



166. કોલમ-Iમાં આપેલ પદાર્થની વિશેષતાને કોલમ-II સાથે યોગ્ય રીતે જોડી વિકલ્પ પસંદ કરો :

કોલમ-I	કોલમ-II
(p) એસિટિક એસિડ	(i) સોડિયમહાઈડ્રોપોઆયોડાઈટ
(q) ફોર્મિક એસિડ	(ii) વિષનીકરણ
(r) એસિટોન	(iii) ફેહલીંગ દ્રાવણ
(s) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ	(iv) હોલ વોલહાર્ડ ઝેલિસ્કાય

(A) (p)-(iv), (q)-(i), (r)-(ii), (s)-(iii)

(B) (p)-(iv), (q)-(iii), (r)-(i), (s)-(ii)

(C) (p)-(iii), (q)-(ii), (r)-(i), (s)-(iv)

(D) (p)-(iii), (q)-(iv), (r)-(i), (s)-(ii)

- નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં બે વિધાનો આપેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

(A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને કારણ (R), વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપે છે.

(B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચા છે પરંતુ કારણ (R), વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી આપતું નથી.

(C) વિધાન (A) સાચું છે પણ કારણ (R) ખોટું છે.

(D) વિધાન (A) ખોટું છે પણ કારણ (R) સાચું છે.

167. વિધાન (A) : ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક અને ડાયઆલ્કાઇલ કેડમિયમ બંને એસિડ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી તૃતીયક આલ્કોહોલ આપે છે.

કારણ (R) : ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયક, ડાયઆલ્કાઇલ કેડમિયમની જેમ ક્રિયાશીલ છે.

168. વિધાન (A) : ઈથાઇલ એસિટેટ કરતાં એસિટેમાઇડમાં આવેલ $>C=O$ સમૂહ વધુ ધ્રુવીય છે.

કારણ (R) : $-OC_2H_5$ સમૂહ કરતાં $-NH_2$ સમૂહ વધુ ઇલેક્ટ્રોનદાતા છે.

169. વિધાન (A) : p-હાઇડ્રોક્સિબેન્ઝોઇક એસિડનું ઉત્કલનબિંદુ o-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડ કરતાં ઓછું છે.

કારણ (R) : o-હાઇડ્રોક્સિ બેન્ઝોઇક એસિડમાં આંતરઆણ્વિક હાઇડ્રોજન-બંધ આવેલો છે.

170. વિધાન (A) : $CH_2 = CH - COOH$ એ C_6H_5COOH કરતાં નિર્બળ એસિડ છે.

કારણ (R) : ઈથિલિન દ્વિબંધ, બેન્ઝિન કરતાં ઓછો ઇલેક્ટ્રોનદાતા છે

- ઈન્ટિજર પ્રકારના પ્રશ્નો :

171. $C_5H_{10}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં સમઘટકીય આલ્કીલાઇડ અને કીટોનની સંખ્યા કેટલી છે ?

172. $C_5H_{10}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતાં કેટલા સમઘટકો આયોડોફોર્મ કસોટી આપે ?

173. C_8H_{10} અણુસૂત્ર ધરાવતાં દ્વિવિસ્થાપિત બેન્ઝિનના કેટલા વ્યુત્પન્નોનું આલ્કલાઇન $KMnO_4$ વડે ઓક્સિડેશનથી એસિડના ક્ષાર મળે ?

જવાબો : 146. (B), 146. (C), 147. (C), 148. (B), 149. (B), 150. (D), 151. (B), 152. (C), 153. (C), 154. (D), 155. (C), 156. (C), 157. (A), 158. (D), 159. (B), 160. (A), 161. (A), 162. (B), 163. (B), 164. (B), 165. (C), (D), 166. (B), 167. 1, 168. (A), 169. (D), 170. (C), 171. 7, 172. 2, 173. 3.

