


● એમાઈન સંયોજનોનું બંધારણ

એમોનિયામાં રહેલા હાઈડ્રોજનનું વિસ્થાપન હાઈડ્રોકાર્બન વડે કરવાથી એમાઈન બને છે.



● N નું સંકરણ : sp^3

● એમાઈન સંયોજનનો આકાર : ત્રિકોણિય પિરામિડલ

● R – N – H અથવા R – N – R બંધકોણ : 109.5°

ઉદાહરણ : ટ્રાયમિથાઈલ એમાઈનનો બંધકોણ : 108°

એમાઈન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ

● આલ્કાઈલ એમાઈન : – (એલિફેટિક એમાઈન)

- એમોનિયામાં રહેલ હાઈડ્રોજનના વિસ્થાપનથી જો નાઈટ્રોજન સાથે આલ્કાઈલ સમૂહ જોડાયેલ હોય, તેને આલ્કાઈલ એમાઈન કહે છે.

(i) પ્રાથમિક એલિફેટિક એમાઈન (1°)

સામાન્ય સૂત્ર : $(R - NH_2)$ R = આલ્કાઈલસમૂહ

ઉદાહરણ : $CH_3CH_2 - NH_2$ ઇથાઈલ એમાઈન

(ii) દ્વિતીયક એલિફેટિક એમાઈન (2°)

સામાન્ય સૂત્ર : $R - NH - R$

ઉદાહરણ : $CH_3CH_2 - NH - CH_2CH_3$ ડાયઇથાઈલ એમાઈન

(iii) તૃતીયક એલિફેટિક એમાઈન (3°)

R
|
સામાન્ય સૂત્ર : $R - N - R$


ઉદાહરણ : $(CH_3CH_2)_3N$ ટ્રાયઇથાઈલ એમાઈન

● એરાઈલ એમાઈન (એરોમેટિક એમાઈન)

- એમોનિયામાં રહેલ હાઈડ્રોજનના વિસ્થાપનથી જો નાઈટ્રોજન સાથે એરાઈલ સમૂહ જોડાયેલ હોય, તેને એરાઈલ એમાઈન કહે છે.


(i) પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઈન (1°)

સામાન્ય સૂત્ર : $\text{Ar}-\text{NH}_2$ $\text{Ar} =$ એરાઈલ સમૂહ

ઉદાહરણ :  એનિલિન


(ii) દ્વિતીયક એરોમેટિક એમાઈન (2°)

સામાન્ય સૂત્ર : $\text{Ar}-\text{NH}-\text{Ar}$ અથવા $\text{Ar}-\text{NH}-\text{R}$

ઉદાહરણ :  ડાયફિનાઈલ એમાઈન

(ii) તૃતીયક એરોમેટિક એમાઈન (3°)

સામાન્ય સૂત્ર : $(\text{Ar})_3\text{N}$

ઉદાહરણ :  ટ્રાયફિનાઈલ એમાઈન

● એમાઈન સંયોજનોનું નામકરણ

● સામાન્ય નામકરણ :

(i) પ્રાથમિક આલ્કાઈલ એમાઈન

નાઈટ્રોજન સાથે જોડાયેલા આલ્કાઈલ સમૂહના નામને અંતે ‘એમાઈન’ શબ્દ મૂકવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ : $\text{CH}_3\text{NH}_2 \rightarrow$ મિથાઈલ એમાઈન

(ii) દ્વિતીયક આલ્કાઈલ એમાઈન

● નાઈટ્રોજન સાથે જોડાયેલા બંને આલ્કાઈલ સમૂહના નામ (અંગ્રેજી મૂળાક્ષર) લખી અંતે ‘એમાઈન’ શબ્દ મૂકવો.

● જો બંને સમૂહ સમાન હોય, તો ડાય પૂર્વગ લખવો.


ઉદાહરણ : $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \rightarrow$ ઈથાઈલ મિથાઈલ એમાઈન

$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3 \rightarrow$ ડાયમિથાઈલ એમાઈન

(iii) તૃતીયક આલ્કાઈલ એમાઈન

● N સાથે જોડાયેલા ત્રણે આલ્કાઈલ સમૂહના (અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે) નામ લખી અંતે ‘એમાઈન’ શબ્દ મૂકવો


ઉદાહરણ : $\text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_3$ ટ્રાય મિથાઈલ એમાઈન


ઉદાહરણ : $\text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ ઈથાઈલ મિથાઈલ પ્રોપાઈલ એમાઈન

(E) (M) (P)


(iv) પ્રાથમિક એરાઈલ એમાઈન

ઉદાહરણ :  એનીલીન

(v) દ્વિતીયક એરાઈલ એમાઈન




(vi) તૃતીયક એરાઈલ એમાઈન




• IUP(A),(C), નામકરણ

(i) પ્રાથમિક આલ્કાઈલ એમાઈન

- કાર્બનની સંખ્યાના આધારે આલ્કેન નામ + એમાઈન



- જો કાર્બનની સંખ્યા ત્રણ કે તેથી વધુ હોય, તો $-\text{NH}_2$ સમૂહ ધરાવતા કાર્બનને લઘુત્તમ ક્રમાંક આપવો.




(ii) દ્વિતીયક આલ્કાઈલ એમાઈન

- સમૂહનું સ્થાન દર્શાવવા 'N' સંજ્ઞા વપરાય છે.




(iii) તૃતીયક આલ્કાઈલ એમાઈન


- સમૂહનું સ્થાન દર્શાવવા "N" સંજ્ઞા વપરાય છે.




(iv) પ્રાથમિક એરાઈલ એમાઈન





(v) દ્વિતીયક એરાઈલ એમાઈન :






(vi) તૃતીયક એરાઈલ એમાઈન



• એક કરતાં વધુ $-\text{NH}_2$ સમૂહ ધરાવતાં સંયોજનો નું IUPAC નામકરણ







● નાઈટ્રોજનયુક્ત એમાઈન સંયોજનો

ક્રમ	બંધારણીય સૂત્ર	સામાન્ય નામ	IUP(A),(C), નામ	પ્રકાર	ઉત્કલનબિંદુ
(1)	$\text{CH}_3 \text{NH}_2$	મિથાઈલ એમાઈન	મિથેનેમાઈન	1°	280 K
(2)	$\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NH}_2$	ઈથાઈલ એમાઈન	ઈથેનેમાઈન	1°	290 K
(3)	$\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{NH}_2$	પ્રોપાઈલ એમાઈન	પ્રોપેન્-1- એમાઈન	1°	322 K
(4)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	આઈસો પ્રોપાઈલ એમાઈન	પ્રોપેન્-2- એમાઈન	1°	306 K
(5)	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$	ડાયમિથાઈલ એમાઈન	N- મિથાઈલ મિથેનેમાઈન	2°	280 K
(6)	$\text{CH}_3 \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 \text{CH}_3$	ડાયઈથાઈલ એમાઈન	N- ઈથાઈલ ઈથેનેમાઈન	2°	329 K
(7)	$\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_3$	ડાયપ્રોપાઈલ એમાઈન	N-પ્રોપાઈલ પ્રોપેન્-1-એમાઈન	2°	383 K
(8)	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 \text{CH}_3$	ઈથાઈલ મિથાઈલ એમાઈન	N- મિથાઈલ ઈથેનેમાઈન	2°	309 K
(9)	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_3$	મિથાઈલ પ્રોપાઈલ એમાઈન	N- મિથાઈલ પ્રોપેન્-1એમાઈન	2°	335 K
(10)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	ટ્રાયમિથાઈલ એમાઈન	N-N-ડાયમિથાઈલ મિથેનેમાઈન	3°	276 K
(11)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \text{CH}_2 - \text{N} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \text{CH}_3 \end{array}$	ટ્રાયઈથાઈલ એમાઈન	N, N-ડાયઈથાઈલ ઈથેનેમાઈન	3°	363 K
(12)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \text{CH}_2 - \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	ઈથાઈલ ડાયમિથાઈલ એમાઈન	N-N-ડાયમિથાઈલ ઈથેનેમાઈન	3°	310 K
(13)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \text{CH}_3 \end{array}$	ડાયઈથાઈલ મિથાઈલ એમાઈન	N-ઈથાઈલ-N-મિથાઈલ ઈથેનેમાઈન	3°	339 K
(14)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_3 \end{array}$	ઈથાઈલ મિથાઈલ પ્રોપાઈલ એમાઈન	N-ઈથાઈલN-મિથાઈલ પ્રોપેન્-1-એમાઈન	3°	367 K
(15)		એનિલિન	બેન્ઝિનેમાઈન અથવા એનિલિન	1°	457 K
(16)		N-મિથાઈલ એનિલિન	N-મિથાઈલ બેન્ઝિનેમાઈન	2°	469 K
(17)		N-N- ડાયમિથાઈલ એનિલિન	N, N-ડાયમિથાઈલ બેન્ઝિનેમાઈન	3°	467 K


- $$\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{CH}_3 - \text{N} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$$
1. $\text{CH}_3 - \text{N} - \text{C} - \text{CH}_3$ સંયોજનનું IUPAC નામ કયું છે ?
 (A) N-એસિટાઈલ - N- મિથાઈલ ઇથેનેમાઈડ (B) N- ઇથાઈલ - N- મિથાઈલ ઇથેનેમાઈડ
 (C) N-એસિટાઈલ - N- ઇથાઈલ ઇથેનેમાઈડ (D) એસિટાઈલ ઇથાઈલ મિથાઈલ એમાઈડ
 2. નીચે પૈકી કયું બંધારણ નાઈટ્રોલિકએસિડનું છે ?
 (A) $\text{R}_2\text{C} = \text{N} \cdot \text{OH}$ (B) $\text{R}_2\text{C} - \text{NO}_2$ (C) $\text{R} - \text{C} = \text{N} \cdot \text{OH}$ (D) $\text{R}_2\text{N} - \text{N} = \text{O}$

$$\begin{array}{cc} | & | \\ \text{NO}_2 & \text{NO}_2 \end{array}$$
 3. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ સંયોજનમાં N-પરમાણુનું સંકરણ અને તેની આસપાસ મિથાઈલ સમૂહની અવકાશીય ગોઠવણીનો આકાર જણાવો.
 (A) sp^3 , પિરામિડલ (B) sp^3 , સમચતુષ્ફલકીય
 (C) sp^2 , સમતલીય ત્રિકોણ (D) sp^3 , સમતલીય ત્રિકોણ
 4. નીચે પૈકી કયા સંયોજનમાં આંતરઆણ્વીય હાઈડ્રોજનબંધની પ્રબળતા વધુ હોય છે ?
 (A) મિથાઈલ એમાઈડ (B) ફિનોલ (C) મિથેનાલ (D) મિથેનોલ
 5. ટ્રાય મિથાઈલ એનિલીનમાં C-N-C બંધકોણ કેટલો હોય છે ?
 (A) $109^\circ 28'$ (B) 107° (C) 108° (D) 108.5°
 6. નીચે પૈકી કોણ 2° એમાઈડ છે ?
 (A) 1-મિથાઈલ સાયકલો હેક્ઝાઈલ એમાઈડ
 (B) ટ્રાય ઇથાઈલ એમાઈડ
 (C) તૃતીયક બ્યુટાઈલ એમાઈડ
 (D) N-મિથાઈલ એનિલિન
 7. $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ અણુસૂત્ર ધરાવતા શક્ય પ્રાથમિક એમાઈડની સંખ્યા કેટલી હશે ?
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
 8. $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ અણુસૂત્ર ધરાવતા શક્ય પ્રાથમિક એમાઈડની સંખ્યા કેટલી હશે ?
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
 9. $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનમાં કેટલા એમાઈડ સમઘટકો શક્ય છે ?
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
 10. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ નું સાચું IUPAC નામ જણાવો.
 (A) એલાઈલ મિથાઈલ એમાઈડ (B) 2 - એમિનો - 4 - પેન્ટેન
 (C) 4 - એમિનો પેન્ટ - 1 - ઈન (D) N - મિથાઈલ પ્રોપ - 2 ઈન - 1 - એમાઈડ

11. નીચે પૈકી કયું સંયોજન નાઈટ્રોજન ઇન્વર્ઝન (વિસ્થાપન)ને અંતે પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા ગુમાવે છે ?



12. નીચેનાનું IUPAC નામ જણાવો :







- (A) 5-એમિનો-હેપ્ટ-2-ઇનોઇકએસિડ
 (B) 3-એમિનો-હેપ્ટ-5-ઇનોઇકએસિડ
 (C) 5-એમિનો-હેક્ટ-2-ઇન્-કાર્બોક્સિલિક એસિડ
 (D) β-એમિનો-હેપ્ટ-6-ઇનોઇકએસિડ

13. નીચે પૈકી કોણ સૌથી વધુ બેઝિક છે ?

- (A) એનિલિન
 (B) o-નાઈટ્રો એનિલિન
 (C) p-નાઈટ્રો એનિલિન
 (D) m-નાઈટ્રો એનિલિન

14. નીચે પૈકી કોણ સૌથી વધુ બેઝિક છે ?



15. $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$ અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનના એક બેન્ઝિન વલય ધરાવતા શક્ય સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી થાય ?


- (A) 3
 (B) 4
 (C) 5
 (D) 6

જવાબો : 1. (B), 2. (C), 3. (A), 4. (D), 5. (C), 6. (D), 7. (B), 8. (D), 9. (D), 10. (D), 11. (C), 12. (B),
 13. (A), 14. (D), 15. (C),

● પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમાઈનનું અલગીકરણ

● હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયા :

● 1°, 2°, 3° આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ એમાઈનના મિશ્રણનું અલગીકરણ ‘હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયક’ દ્વારા કરી શકાય છે.



નામ : બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ (હિન્સબર્ગનો પ્રક્રિયક)


- CC1=CC=C(S(=O)(=O)Cl)C=C1

P-ટોલ્યુઇન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ

(i) $R-NH_2 + ClSO_2-C_6H_5 \xrightarrow{-HCl} R-NH-SO_2-C_6H_5 \xrightarrow[-H_2O]{\text{જલીય KOH}} \dots$

પ્રાથમિક એમાઈન **દ્વિતીયક સલ્ફોનએમાઈડ**

$R-NH_2 \xleftarrow[\text{તટસ્થીકરણ}]{\text{HCl દ્વારા}} R-N^+ SO_2-C_6H_5 K^- \longleftarrow$




● સ્થાન સમઘટકતા

- પ્રાથમિક એલિફેટિક એમાઈન સંયોજનોમાં જોવા મળે છે.


ઉદાહરણ : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{NH}_2$
પ્રોપેન્-1- એમાઈન

અને



● ક્રિયાશીલ સમૂહ સમઘટકતા

- સમાન અણુસૂત્ર ધરાવતા 1° , 2° , 3° એમાઈન સંયોજનોમાં જોવા મળે છે.



● એમાઈન સંયોજનોના ભૌતિક ગુણધર્મો


- રંગ અને વાસ :

- શુદ્ધ એમાઈન રંગવિહીન હોય છે. પણ હવામાં લાંબો સમય રાખવાથી ઓક્સિડેશન થઈ ઘેરા લાલ રંગનો બને છે.
- ઓછા C વાળા એલિફેટિક એમાઈન વાયુ રૂપે છે અને એમોનિયા જેવી વાસ ધરાવે છે.
- ત્રણથી વધુ C વાળા એમાઈન પ્રવાહીરૂપે અને માછલી જેવી વાસ ધરાવે છે.

- ઉત્કલબિંદુ :

આલ્કેન	<	એમાઈન	<	આલ્કોહૉલ
ઉદાહરણ : ઇથેન	<	ઇથેનેમાઈન	<	ઇથેનોલ
(184 K)		(290 K)		(351 K)
↓		↓		↓
અધ્રુવીય		$\text{N}^{\delta-} - \text{H}^{\delta+}$ બંધ ઓછો ધ્રુવીય		$\text{O}^{\delta-} - \text{H}^{\delta+}$ બંધ વધુ ધ્રુવીય

- સમાન આણ્વિક સૂત્ર ધરાવતા સમઘટકીય આલ્કાઈલ એમાઈનમાં પ્રાથમિકથી તૃતીયક તરફ જતાં ઉત્કલનબિંદુ ઘટે છે.



- 1° , 2° , 3° એલિફેટિક એમાઈન પાણી સાથે H-બંધ બનાવે છે. તેથી ઓછા આણ્વિક ધરાવતાં સંયોજનો પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે.
- મિથાઈલ એમાઈન અને ઈથાઈલ એમાઈન વાયુરૂપે છે, જે પાણીમાં ઝડપી ઓગળે છે. બજારમાં તેની 34 % સાંદતાવાળા જલીય દ્રાવણ વેચાય છે.

- કાર્બનની સંખ્યા છ કે તેથી વધુ હોય, તો દ્રાવ્યતા ખૂબ ઘટે છે.
- એલિફેટિક એમાઈન કાર્બનિક દ્રાવકો જેવાં કે બેન્ઝિન, આલ્કોહોલ, ઈથર વગેરેમાં અલ્પ દ્રાવ્ય છે.
- એરોમેટિક એમાઈન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. કારણ કે મોટો હાઈડ્રોકાર્બન ભાગ H-બંધ બનાવવાનું વલણ ધરાવતો નથી.

16. નીચે પૈકી કોને રંગક કસોટી દ્વારા જુદા પાડી શકાય ?

- (A) ઈથાઈલ એમાઈન અને એસિટેમાઈડ (B) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન
(C) યૂરિયા અને એસિટેમાઈડ (D) મિથાઈલ એમાઈન અને ઈથાઈલ એમાઈન





17. નીચે પૈકી હિન્સબર્ગનો પ્રક્રિયક કયો છે ?

- (A) બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ (B) બેન્ઝિન સલ્ફોનિક એસિડ
(C) ફિનાઈલ આઈસો સાયનાઈડ (D) બેન્ઝિન સલ્ફોનેમાઈડ

18. નીચે પૈકી કયો પદાર્થ બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ સાથે પ્રક્રિયા આપશે ?

- (A) N,N- ડાયમિથાઈલ ઈથેનેમાઈન (B) ટ્રાયમિથાઈલ એમાઈન
(C) મિથાઈલ ઈથાઈલ એમાઈન (D) ડાયમિથાઈલ ઈથાઈલ એમાઈન

19. નીચે પૈકી કયું બંધારણીય સૂત્ર હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયકનું છે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 

20. 1°, 2°, 3° એમાઈનના અલગીકરણ માટે હાલના સમયમાં વપરાતો પ્રક્રિયક કયો છે ?

- (A) P-ક્લોરોબેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ (B) P-ટોલ્યુઈન બેન્ઝિન સલ્ફોનિક એસિડ
(C) P-ટોલ્યુઈન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ (D) P-ક્લોરોટોલ્યુઈન સલ્ફોનિક એસિડ

21. નીચે પૈકી કયા પ્રકારનાં એમાઈન સંયોજનોમાં મેટામેરિઝમ સમઘટકતા જોવા મળે છે ?

- (A) 1° (B) 2° (C) 3° (D) આપેલ તમામ

22. પ્રોપેન-1 એમાઈન અને પ્રોપેન-2 એમાઈનમાં કયા પ્રકારની સમઘટકતા છે ?

- (A) મેટામેરિઝમ (B) સ્થાન (C) ક્રિયાશીલ સમૂહ (D) શૃંખલા

23. (i) C₂H₆ (ii) CH₃CH₂NH₂ (iii) C₂H₅OH આપેલાં ત્રણ સંયોજનો માટે ઉત્કલનબિંદુનો સાચો ચઢતો ક્રમ કયો છે ?

- (A) i < ii < iii (B) iii < i < ii (C) ii < iii < i (D) i < iii < ii

24. મિથાઈલ એમાઈન અને ઈથાઈલ એમાઈન બજારમાં તેની % સાંદ્રતાવાળા જલીયદ્રાવણરૂપે વેચાય છે.

- (A) 5 % (B) 20 % (C) 40 % (D) 34 %

25. સમઘટકીય અથવા સમાન અણુસૂત્ર ધરાવતા એમાઈન સંયોજનો માટે ઉત્કલનબિંદુનો ઊતરતો ક્રમ કયો સાચો છે ?

- (A) 3° > 2° > 1° (B) 2° > 3° > 1° (C) 1° > 2° > 3° (D) 3° > 1° > 2°


જવાબો : 16. (B), 17. (A), 18. (C), 19. (B), 20. (C), 21. (B), 22. (B), 23. (A), 24. (D), 25. (C)

● એમાઈન સંયોજનોની બનાવટ


● નાઈટ્રો સંયોજનોના રિડક્શનથી...

● ઉદ્દીપકીય રિડક્શન :


● નિકલ, પેલેડિયમ, પ્લેટિનમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડાયહાઈડ્રોજનવાયુ પસાર કરતાં એમાઈન બને છે.



● સક્રીય ધાતુ જેવી કે Fe, Sn, Znની સાંદ્ર HCl સાથેની પ્રક્રિયાથી



● LiAlH₄ કે NaBH₄ વડે રિડક્શનથી...



● હેલાઈડનું એમોનોલિસિસ (હોફમેન એમોનોલિસિસ)


● હવાયુસ્ત નળીમાં 373 K તાપમાને આલ્કાઈલ હેલાઈડની એમોનિયા સાથેની પ્રક્રિયાથી એમાઈન બને છે.

● ગેરફાયદો :


● પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક અને ચતુર્થક એમોનિયમ ક્ષારનું મિશ્રણ મળે છે.

● આ પ્રક્રિયાની મદદથી એરાઈલ એમાઈન બનતો નથી. કારણ કે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા માટે આલ્કાઈલ હેલાઈડ કરતાં એરાઈલ હેલાઈડ ઓછો સક્રિય હોય છે.

● સામાન્ય પ્રક્રિયા :



● હેલાઈડનો એમાઈન સાથે પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ....



● નાઈટ્રાઈલ અને આઈસોનાઈટ્રાઈલના રિડક્શનથી....

(સાયનાઈડ)

(આઈસોસાયનાઈડ)

● નાઈટ્રાઈલનું રિડક્શન : (1° એમાઈન બને.)

રિડક્શનકર્તા :


● LiAlH₄ (લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઈડ્રાઈડ)

● H₂ / રેનીનિકલ

● Na(Hg)/C₂H₅OH ” ”


↑ મેન્ડિસ રિડક્શનથી ઓળખાય છે.

સામાન્ય પ્રક્રિયા :




● સાંશ્લેષિત મહત્વ (Step-up પ્રક્રિયા)

- આલ્કાઈલ હેલાઈડમાંથી એક કાર્બન વધુ હોય, તો 1° એમાઈન બનાવવા ઉપયોગી છે.



- આઈસોસાયનાઈડના રિડક્શનથી : (2° એમાઈન બને.)




- મર્યાદા :

એવા 2° એમાઈનની બનાવટમાં ઉપયોગી છે, જેમાં એક મિથાઈલ (–CH₃) સમૂહ હોય.

- આઈસોસાઈનાઈડના જળવિભાજનથી (1° એમાઈન બને.)




(Step-Down પ્રક્રિયા)



આઈસોસાયનાઈડ કરતાં એક C ઓછો હોય તેવો 1° એમાઈન બને છે.



- એમાઈડના રિડક્શનથી

લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઈડ્રાઈડ વડે એમાઈડના રિડક્શનથી 1°, 2°, 3° એમાઈન બને છે.




● ગ્રાબિયલ પ્લેલિમાઈડ સંશ્લેષણ

[પ્રાથમિક એલિફેટિક એમાઈન અને પ્રાથમિક એરાઈલ આલ્કાઈલ એમાઈનની બનાવટ]




- આ પ્રક્રિયાથી બેન્ઝાઈલ એમાઈન બને છે.
- મર્યાદા : પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઈન (દા.ત. એનીલીન, ટોલ્યુડીન)નું સંશ્લેષણ આ પદ્ધતિથી થતું નથી. કારણ કે મંદ પરિસ્થિતિમાં એરાઈલહેલાઈડની પોટેશિયમ પ્લેલિમાઈડ સાથે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે.

● હોફમેન બ્રોમેમાઈડ પ્રક્રિયા : (હોફમેન ડીબ્રોડેશન) (1° એમાઈન બને છે.)





● એઝાઈડના રિડકશનથી





● ઓક્ઝાઈમના રિડકશનથી : (1° એમાઈન બને છે.)

- આલ્ડિહાઈડ અને કિટોનના ઓક્ઝાઈમની લિથીયમ એલ્યુમિનિયમ હાઈડ્રાઈડ/ઈથર અથવા સોડિયમ/ ઇથેનોલ વડે રિડકશન કરવાથી 1° એમાઈન બને છે.







● આલ્ડિહાઈડ અને કિટોનની એમિનેશન રિડકશન પ્રક્રિયાથી : (1°, 2°, 3° એમાઈન બને.)




● સ્મીટ પ્રક્રિયા : (1° એલિફેટિક તથા એરોમેટિક એમાઈન બને.)

- કાર્બોક્સિલિક એસિડની હાઈડ્રોજેન (N₃H) સાથે સાંદ્ર H₂SO₄ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતાં CO₂ અને N₂ વાયુ દૂર થઈ પ્રાથમિક એમાઈન (1° એમાઈન) બને છે.




- NaN₃ અને સાંદ્ર H₂SO₄ પણ વપરાય છે.

● એમાઈન સંયોજનોની બનાવટ અને એનિલિનનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન અને ઉપયોગો



● એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયાથી :



ભૌતિક ગુણધર્મો અને ઉપયોગો :

- શુદ્ધ એનિલિન ખરાબ વાસ ધરાવતો, રંગવિહીન પ્રવાહી છે.
- હવામાં ખુલ્લો રાખતાં ઓક્સિડેશન પામી ઘેરા લાલ રંગનો બને છે.

ઉપયોગ :

- રંગકો, ઔષધો, રેઝિન, વાર્નિશના ઉત્પાદનમાં
- દ્રાવક તરીકે
- રબરના વલ્કેનાઈઝેશનમાં

26. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા એમાઈન નીપજ આપતી નથી ?

- (A) $\text{R} - \text{X} + \text{NH}_3 \rightarrow$ (B) $\text{R} - \text{CH} = \text{N} \cdot \text{OH} + [\text{H}] \xrightarrow{\text{Na/C}_2\text{H}_5\text{OH}}$
 (C) $\text{R} - \text{CN} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+}$ (D) $\text{R} - \text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

27. નીચેનામાંથી કયો એમાઈડ હોફમેન બ્રોમેમાઈડ પ્રક્રિયા આપતા નથી ?

- (A) ઈથેનેમાઈડ (B) પ્રોપેનેમાઈડ (C) બેન્ઝિનેમાઈડ (D) એસિટેનિલાઈડ

28. નીચેનામાંથી કયો એમાઈન ગ્રાબિયલ થેલિમાઈડ પ્રક્રિયાથી બનાવી શકતો નથી ?

- (A) બેન્ઝાઈલ એમાઈન (B) ઈથાઈલ એમાઈન (C) એનિલિન (D) મિથાઈલ એમાઈન

29. બેન્ઝાઈલ એમાઈનની બનાવટ નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયાથી થઈ શકે ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4/\text{ઈથર}}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4/\text{ઈથર}}$
 (C) થેલેમાઈડ $\xrightarrow[\text{(iii) જલીય NaOH, } \Delta]{\text{(I) KOH (ii) C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}}$ (D) ઉપર્યુક્ત બધી જ રીતે

30. નીચે પૈકી કોની એનિલિન સાથેની પ્રક્રિયાથી બેન્ઝેનિલાઈડ નીપજ આપશે ?







- (A) એસિટિકએનહાઈડ્રાઈડ (B) બેન્ઝિનેમાઈડ (C) એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ (D) બેન્ઝોઈલ ક્લોરાઈડ

31. 1° એમાઈનને વધુ પ્રમાણમાં HgCl_2 ની હાજરીમાં CS_2 સાથે ગરમ કરતાં તે આઈસોસાયનેટ આપે છે. આ પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

- (A) હોફમેન બ્રોમેમાઈડ પ્રક્રિયા (B) પર્કિન પ્રક્રિયા
 (C) હોફમેન મસ્ટાર્ડ ઓઈલ પ્રક્રિયા (D) કાબાઈલ એમાઈન કસોટી

32. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા પ્રાથમિક એમાઈન આપશે નહિ ?

- (A) એસિટેમાઈડ $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{KOH}}$ (B) ઈથેન નાઈટ્રાઈલ $\xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
 (C) મિથાઈલ આઈસોસાયનાઈડ $\xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$ (D) એસિટામાઈડ $\xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

33. ગ્રાબિયલ પ્લેલિમાઈડ સંશ્લેષણ પદ્ધતિ કોની બનાવટ માટે ઉપયોગી છે ?
 (A) 1° એરોમેટિક એમાઈન (B) 1° એલિફેટિક એમાઈન
 (C) 2° એલિફેટિક એમાઈન (D) 2° એરોમેટિક એમાઈન
34. કયા એમાઈડના રિડક્શનથી  સંયોજન પ્રાપ્ત થાય ?
 (A) હેક્ઝેનેમાઈડ (B) પેન્ટેનેમાઈડ (C) હેપ્ટેનેમાઈડ (D) બ્યુટેનેમાઈડ
35. નીચે પૈકી કયા સંયોજનની બનાવટ માટે ગ્રાબિયલ પ્લેલિમાઈડ પ્રક્રિયા ઉપયોગી છે ?
 (A)  (B) 
 (C) $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$ (D) $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$
36. નીચે પૈકી કોની હોફમેન પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળતાથી થાય ?
 (A)  (B)  (C)  (D) 
37. નીચે પૈકીની કઈ પ્રક્રિયા ‘મેન્ડિસ રિડક્શન’ તરીકે ઓળખાય છે ?
 (A) $\text{R} - \text{C} \equiv \text{N} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{R} - \text{CH}_2 \cdot \text{NH}_2$
 (B) $\text{Ar} - \text{C} \equiv \text{N} \xrightarrow{\text{H}_2[\text{Ni}]} \text{Ar} - \text{CH}_2\text{NH}_2$
 (C) $\text{R} - \text{C} \equiv \text{N} \xrightarrow{\text{NaHg}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} \text{R} - \text{CH}_2\text{NH}_2$
 (D) આપેલ તમામ
38. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયાથી 2° એમાઈન નીપજ આપશે ?
 (A) નાઈટ્રાઈલનું રિડક્શનથી (B) આઈસોસાયનાઈડના રિડક્શનથી
 (C) આઈસો સાયનાઈડના જળવિભાજનથી (D) હોફમેન બ્રોમેમાઈડ પ્રક્રિયાથી
39. $\text{NaN}_3 + \xrightarrow[\text{-NaX}]{\text{(i) R-X}}$? આપેલ પ્રક્રિયામાં કઈ એમાઈન નીપજ બનશે ?
 (ii) LiAlH_4
 (A) 3° એમાઈન (B) 2° એમાઈન
 (C) 1° એમાઈન (D) (A) અને (B) બંને.
40. $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{NH}_2\text{OH} \xrightarrow{-\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{N} \cdot \text{OH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4/\text{ઈથર}}$ આપેલ પ્રક્રિયામાં X ને ઓળખો.
 (A) મિથેનેમાઈન (B) ઈથેનેમાઈન
 (C) ડાયમિથાઈલ એમાઈન (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ.

41. 1° એલિફેટિક તથા એરોમેટિકની બનાવટની સ્મીટ પ્રક્રિયાના પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક કયા છે ?
 (A) N_3H અને સાંદ્ર H_2SO_4 (B) Na ધાતુ અને C_2H_5OH
 (C) Ni ધાતુ અને H_2 (D) આપેલ તમામ
42. ઇમાઈનમાંથી 1° એમાઈનમાં પરિવર્તન કરવા ઉપયોગી રિડક્શનકર્તા કયો છે ?
 (A) $H_2[Ni]$ (B) $NaBH_3CN$ (C) N_3H /સાંદ્ર H_2SO_4 (D) (A) અને (B)
43. ક્લોરોબેન્ઝિનની એમોનોલિસિસ પ્રક્રિયાથી એનિલિનના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં વપરાતો ઉદ્દીપક કયો છે ?
 (A) KCN (B) Al_2O_3 (C) $K_2O + Al_2O_3$ (D) Cu_2O
44. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયાથી આઈસોપ્રોપાઈલ એમાઈન બનતો નથી ?
 (A) $(CH_3)_2CO + NH_2OH \xrightarrow{LiAlH_4}$
 (B) $(CH_3)_2CO + NH_3 \xrightarrow[\Delta]{H_2/Ni}$
 (C) $\begin{array}{c} CH_3 \\ \diagdown \\ CH - OH_{(g)} \\ \diagup \\ CH_3 \end{array} + NH_{3(g)} \xrightarrow{Al_2O_3, 633K}$
 (D) $\begin{array}{c} CH_3 \\ \diagdown \\ CH - Br \\ \diagup \\ CH_3 \end{array} + NaNH_2 \rightarrow$
45. એમોનોલિસિસની પ્રક્રિયામાં હેલાઈડનો એમાઈન સાથેનો પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?
 (A) $R - I > R - Br > R - Cl$ (B) $R - Cl > R - Br > R - I$
 (C) $R - Br > R - I > R - Cl$ (D) $R - I > R - Cl > R - Br$


જવાબો : 26. (C), 27. (D), 28. (C), 29. (D), 30. (D), 31. (C), 32. (C), 33. (B), 34. (A), 35. (B),
 36. (C), 37. (C), 38. (B), 39. (C), 40. (A), 41. (A), 42. (D), 43. (D), 44. (D), 45. (A)

● એમાઈન સંયોજનોની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ


● એમાઈન સંયોજનોનો બેઝિક ગુણધર્મ :

એમાઈન સંયોજનોમાંના નાઈટ્રોજન પરમાણુ પાસે અબંધકારક e^- યુગ્મ હોવાને કારણે તે લુઈસ બેઈઝ તરીકે વર્તે છે.

● એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા :



● પાણી સાથેની પ્રક્રિયા :



$$K = \frac{[R - \overset{+}{N}H_3][OH^-]}{[R - \ddot{N}H_2][H_2O]}$$

$$K [H_2O] = \frac{[R - \overset{+}{N}H_3][OH^-]}{[R - \ddot{N}H_2]}$$

$$K_b = \frac{[R - \overset{+}{N}H_3][OH^-]}{[R - \overset{+}{N}H_2]}$$

$$pK_b = -\log K_b$$

- એમાઈનની બેઈઝ તરીકેની પ્રબળતા K_b અથવા pK_b નાં મૂલ્યો પરથી નક્કી કરી શકાય છે.
- જેમ K_b નું મૂલ્ય ઊંચું (pK_b નું નીચું મૂલ્ય) તેમ એમાઈનની બેઝિકતા વધુ.
- એમોનિયા માટે pK_b નું મૂલ્ય 4.75 છે.
- એલિફેટિક એમાઈન માટે pK_b નાં મૂલ્યો 3 થી 4.22 વચ્ચે હોય છે.
- એરોમેટિક એમાઈન માટે pK_b નાં મૂલ્યો 4.22 કરતાં વધુ હોય છે.

ક્રમ	એમાઈનનું નામ	અણુસૂત્ર	K_b	pK_b
1.	મિથેનેમાઈન	CH_3NH_2	4.5×10^{-4}	3.38
2.	એમોનિયા	NH_3	1.8×10^{-5}	4.75
3.	N- મિથાઈલ મિથેનેમાઈન	$(CH_3) NH$	5.4×10^{-4}	3.27
4.	N, N- ડાયમિથાઈલ મિથેનેમાઈન	$(CH_3)_3N$	0.6×10^{-4}	4.22
5.	ઈથેનેમાઈન	$CH_3 CH_2NH_2$	5.1×10^{-4}	3.29
6.	N- ઈથાઈલ ઈથેનેમાઈન	$(CH_3CH_2)_2NH$	10.0×10^{-4}	3.00
7.	N,N-ડાયઈથાઈલ ઈથેનેમાઈન	$(CH_3CH_2)_3N$	5.6×10^{-4}	3.25
8.	બેન્ઝિનેમાઈન	$C_6H_5-NH_2$	4.2×10^{-10}	9.38
9.	ફિનાઈલ મિથેમાઈન	$C_6H_5 CH_2NH_2$	2.0×10^{-5}	4.70
10.	N- મિથાઈલ એનિલિન	$C_6H_5 NHCH_3$	5.0×10^{-10}	9.70
11.	N,N- ડાયમિથાઈલ એનિલિન	$C_6H_5 - N \begin{matrix} \swarrow CH_3 \\ \searrow CH_3 \end{matrix}$	11.5×10^{-10}	8.92

• એમાઈનની બેઝિકતા અને બંધારણ વચ્ચેનો સંબંધ

- એમાઈનની બેઝિકતા, એસિડ તરફથી પ્રોટોન પ્રાપ્ત કરી સરળતાથી ધન આયન બનવાની વૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે.
- એમાઈનનો અનુવર્તી ધન આયન વધુ સ્થાયી હોય, તો એમાઈન વધુ બેઝિક છે.

• એલિફેટિક એમાઈનની બેઝિકતા

(i) આલ્કાઈલ સમૂહની +I અસરને લીધે આલ્કેનેમાઈન એમોનિયા કરતાં પ્રબળ બેઈઝ છે.

(ii) પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક આલ્કેનેમાઈનની બેઝિકતાની સરખામણી :


- તૃતીયક એમાઈનથી પ્રાથમિક એમાઈન તરફ જતાં આલ્કાઈલ સમૂહની +I અસર ઘટે છે. તેથી વાયુમય અવસ્થામાં બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે :

(બિનજલીય દ્રાવક માટે)


તૃતીયક એમાઈન > દ્વિતીયક એમાઈન > પ્રાથમિક એમાઈન > એમોનિયા

- જલીય દ્રાવણમાં બેઈઝ તરીકેની પ્રબળતા નક્કી કરવા +I અસર, સોલ્વેશન અસર અને આલ્કાઈલસમૂહની અવકાશીય અવરોધકતા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.
જલીય દ્રાવણ માટે બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે :
એમોનિયા > 1° એમાઈન > 2° એમાઈન > 3° એમાઈન

- મિથાઈલ વિસ્થાપિત એમાઈન માટે બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે :




- ઈથાઈલ વિસ્થાપિત એમાઈન માટે બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે :



● એરોમેટિક એમાઈન (એરાઈલ એમાઈન)ની બેઝિકતા


- એરાઈલ એમાઈનની બેઝિકતા એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. કારણ કે એનિલિનમાં સંસ્પંદન થવાને લીધે N પરના અબંધકારક e^- યુગ્મ બેન્ઝિનવલય પર વિસ્થાનીકૃત થાય છે. માટે N પર પ્રોટોનેશન માટે અબંધકારક e^- યુગ્મ સરળતાથી પ્રાપ્ત થતા નથી.
- એમાઈન સંયોજનોની બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે.
 3° એમાઈન > 2° એમાઈન > 1° એમાઈન > NH_3 > એનિલિન
- વિસ્થાપિત એનિલિન માટે
 - જો e^- દાતા સમૂહ જેવાં કે $-CH_3$, $-OCH_3$, $-NH_2$ વગેરે દાખલ થયા હોય, તો બેઈઝ તરીકેની પ્રબળતા વધે છે.
 - જો e^- આકર્ષક સમૂહ જેવા કે $-NO_2$, $-SO_3H$, $-COOH$, $-X$, $-CN$ વગેરેની હાજરી હોય, તો બેઈઝ તરીકેની પ્રબળતા ઘટે છે.
- જો e^- દાતા સમૂહ p સ્થાન પર હોય, તો તેની બેઝિકતા m-સ્થાન કરતાં વધું હોય છે.



p-ટોલ્યુડિન, $pK_b = 9.21$


m-ટોલ્યુડિન, $pK_b = 9.34$

- જો e^- આકર્ષકસમૂહ m-સ્થાન પર હોય, તો તેની બેઝિકતા p-સ્થાન કરતાં વધું હોય છે.



- ઓર્થો અસરને લીધે એમાઈનની બેઝિકતા ઘટે છે.
- કેટલાક અગત્યના વિસ્થાપિત એનિલિન વ્યુત્પન્નો માટે બેઝિકતાનો ક્રમ :

• ટોલ્યુડીન માટે :




P-ટોલ્યુડીન
(pK_b = 9.21)

m-ટોલ્યુડીન
(pK_b = 9.34)

એનીલીન
(pK_b = 9.38)

O-ટોલ્યુડીન
(pK_b = 9.58)

• એનિસિડીન માટે :




P-એનિસિડીન
pK_b = 8.71

O-એનિસિડીન
pK_b = 9.38

એનીલીન
pK_b = 9.51

m-એનિસિડીન
pK_b = 9.81

• એમિનો ફિનોલ માટે :




P-એમિનો ફિનોલ
pK_b = 8.50

O-એમિનો ફિનોલ
pK_b = 9.28

એનીલીન
pK_b = 9.38

m-એમિનો ફિનોલ
pK_b = 9.80

• ફિનાઈલીનડાયએમાઈન માટે :




p - ફિનાઈલ
ડાય એમાઈન
pK_b = 7.86

m - ફિનાઈલ
ડાયએમાઈન
9.00

એનિલિન
9.38

O - ફિનાઈલ ડાય
એમાઈન
9.52

• નાઈટ્રો એનિલિન માટે :




એનિલિન
pK_b=9.38

m-નાઈટ્રો એનિલિન
12.64

p-નાઈટ્રો એનિલિન
13.0

O-નાઈટ્રો એનિલિન
13.22

• ક્લોરો એનિલિન માટે :



એનિલિન

p-ક્લોરો એનિલિન m-ક્લોરો એનિલિન

o-ક્લોરો એનિલિન

pK(B), = 9.38





10.0

11.52




13.30

46. નીચે કેટલાક બેઈઝ માટેના pKbનાં મૂલ્યો આપેલાં છે. તેના આધારે સૌથી ઓછો બેઝિક પસંદ કરો :
- (A) 4.40 (B) 4.32 (C) 2.85 (D) 10.68
47. નીચેના માટે જલીય દ્રાવણના બેઝિકતાનો ચઢતો ક્રમ કયો સાચો છે ?
- (A) $\text{NH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$
 (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{NH}_3 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$
 (D) ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહિ.
48. નીચેનાં એમાઈન સંયોજનો માટે બાષ્પ-અવસ્થા (બિનજલીય દ્રાવણ)માં બેઝિક પ્રબળતાનો ક્રમ સાચો પસંદ કરો :
- (A) $\text{CH}_3\text{NH}_2 > (\text{CH}_3)_3\text{N} > (\text{CH}_3)_2\text{NH}$ (B) $(\text{CH}_3)_3\text{N} > (\text{CH}_3)_2\text{NH} > \text{CH}_3\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3\text{NH}_2 > (\text{CH}_3)_2\text{NH} > (\text{CH}_3)_3\text{N}$ (D) $(\text{CH}_3)_3\text{N} > \text{CH}_3\text{NH}_2 > (\text{CH}_3)_2\text{NH}$
49. આપેલા એમાઈનને બેઝિકતાના ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવો. n-પેન્ટાઈલ એમાઈન (I), sec-પેન્ટાઈલ એમાઈન (II), iso-પેન્ટાઈલ એમાઈન (III) ter-પેન્ટાઈલ એમાઈન (IV)
- (A) $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$ (B) $\text{II} < \text{III} < \text{I} < \text{IV}$ (C) $\text{IV} < \text{III} < \text{II} < \text{I}$ (D) $\text{III} < \text{IV} < \text{I} < \text{II}$
50. વિભાગ-Iની વિગતને વિભાગ-IIની બંધબેસતી વિગત સાથે જોડી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :
- | વિભાગ-I (એમાઈન) | વિભાગ-II (p^{Ka} નું મૂલ્ય) |
|--|--|
| (P) બેન્ઝિનેમાઈન | (T) 11.0 |
| (Q) N-મિથાઈલ એનિલિન | (U) 5.08 |
| (R) N-N-ડાયમિથાઈલ એનિલિન | (V) 4.30 |
| (S) N-ઇથાઈલ ઇથેનેમાઈન | (W) 4.62 |
| (A) (P)-(V), (Q)-(T), (R)-(W), (S)-(U) | (B) (P)-(T), (Q)-(W), (R)-(V), (S)-(U) |
| (C) (P)-(U), (Q)-(V), (R)-(T), (S)-(W) | (D) (P)-(W), (Q)-(V), (R)-(U), (S)-(T) |
51. નીચે આપેલાં વિધાનો પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?
- (A) P-નાઈટ્રોએનિલિન એ એનિલિન કરતાં વધુ બેઝિક છે.
 (B) એનિલિન એ O-મિથોક્સિ એનિલિન કરતાં નિર્બળ બેઝિક છે.
 (C) P-મિથોક્સિ એનિલિન એ એનિલિન કરતાં નિર્બળ બેઝિક છે.
 (D) એનિલિન એ ઇથાઈલ એમાઈન કરતાં નિર્બળ બેઝિક છે.




52. NH_3 , CH_3NH_2 અને $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ માટે બેઝિકતાનો ઊતરતો ક્રમ જણાવો.







53. નીચે પૈકી કોના માટે વિયોજન અચળાંકનું મૂલ્ય મહત્તમ હશે ?







54. જલીય દ્રાવણમાં નીચે પૈકી કોણ પ્રબળ બેઝિક છે ?




55. નીચે પૈકી કોણ સૌથી વધુ બેઝિક છે ?







56. નીચે પૈકી કોણ સૌથી વધુ બેઝિક છે ?







57. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન સૌથી વધુ બેઝિક છે ?







58. નીચે પૈકી કયો પ્રબળ બેઝિક છે ?






59. નીચેનામાંથી કયો પ્રબળ બેઝિક છે ?







60. નીચે પૈકી કયું સંયોજન સૌથી ઓછું બેઝિક છે ?







61. નીચે પૈકી કોનું K_b નું મૂલ્ય સૌથી વધુ હશે ? $R = \text{CH}_3$



62. NH_3 માટે pK_b નું મૂલ્ય છે.



63. ઈથાઈલ વિસ્થાપિત એમાઈન માટે બેઝિકતાનો ક્રમ નીચે પૈકી કયો સાચો છે ?




64. નીચે પૈકી કોણ સૌથી ઓછો બેઝિક છે ?
 (A) p-ટોલ્યુડિન (B) m-ટોલ્યુડિન (C) એનિલિન (D) o-ટોલ્યુડિન
65. નીચે પૈકી કયું p^{kb}નું મૂલ્ય સૌથી વધુ છે ?
 (A) p-એનિસિડિન (B) એનિલિન (C) o-એનિસિડિન (D) m-એનિસિડિન
66. o, m અને p એમિનો ફિનોલ માટે તેની બેઝિકતાનો ઉત્તરતો ક્રમ કયો સાચો છે ?
 (A) p > o < m (B) o > p > m (C) m > o > P (D) m > p > o
67. o, m, p ફીનાઈલીન ડાયએમાઈન માટે તેની બેઝિકતાનો ઉત્તરતો ક્રમ કયો છે ?
 (A) p < m < o (B) o < m < p (C) o < p < m (D) m < p < o
68. o, m, p ફિનાઈલ ડાયએમાઈન માટે તેની બેઝિકતાનો ઉત્તરતો ક્રમ કયો છે ?
 (A) m > p > o (B) p > m > o (C) o > p > m (D) m > p > o
69. o, m, અને p ક્લોરો એનિલિન માટે તેની બેઝિકતાનો ઉત્તરતો ક્રમ કયો છે ?
 (A) p > m > o (B) m > p > o (C) m > o > p (D) o > m > p
70. નીચે આપેલી પ્રક્રિયાઓમાં કઈ પ્રક્રિયામાં ઓમાઈન એસિડ તરીકે વર્તે છે ?
 (A) $(C_2H_5)_3N + BF_3 \rightarrow$ (B) $CH_3NH_2 + H_2O \rightarrow$
 (C) $(C_2H_5)_2NH + H_2PtCl_6 \rightarrow$ (D) $[(CH_3)_2CH]_2NH + n-C_4H_9Li \rightarrow$

જવાબો : 46. (C), 47. (C), 48. (B), 49. (C), 50. (D), 51. (D), 52. (B), 53. (B), 54. (D), 55. (A),
 56. (A), 57. (B), 58. (D), 59. (C), 60. (C), 61. (A), 62. (B), 63. (A), 64. (D), 65. (D),
 66. (A), 67. (B), 68. (A), 69. (A), 70. (D),

● ઓમાઈનની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ

● આલ્કાઈલેશન :

એલિફેટિક અને એરોમેટિક પ્રાથમિક (1°) ઓમાઈનની આલ્કાઈલ હેલાઈડ સાથે ક્રમશઃ પ્રક્રિયા કરતાં 2° એમાઈન, 3° એમાઈન અને અંતે ચતુર્થક એમોનિયમ ક્ષાર મળે છે.



ઇથેનેમાઈન

N-ઇથાઈલ

N-N-ડાયથાઈલ

ચતુર્થક ઇથાઈલ

ઇથેનેમાઈન

ઇથેનેમાઈન

એમોનિયમ આયોડાઈડ (ક્ષાર)

● એસાઈલેશન :

એલિફેટિક અને એરોમેટિક પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક એમાઈનની એસિડ-ક્લોરાઈડ અથવા એસિડ એન-હાઈડ્રાઈડ સાથે પ્રક્રિયક થઈ એમાઈડ નીપજ આપે છે.

આ પ્રક્રિયા પ્રબળ બેઈઝ પિરિડિનની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે.


● પ્રક્રિયકો

● એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ / પિરિડિન અથવા સાંદ્ર H_2SO_4 અથવા CH_3COOH CH_3COCl



● એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ / સાંદ્ર H_2SO_4 અથવા CH_3COOH $(CH_3CO)_2O$

● બેન્ઝોઈલ ક્લોરાઈડ / જલીય NaOH

$C_6H_5COCl \rightarrow$ ‘સ્કોટન બાઉમેન’ નામે પ્રક્રિયા ઓળખાય છે.






● ‘સ્ફોટન-બાઉમેન’ પ્રક્રિયા



● આલ્ડિહાઇડ અને કિટોન સાથેની પ્રક્રિયા

પ્રાથમિક એલિફેટિક અને એરોમેટિક એમાઇનની આલ્ડિહાઇડ જ કિટોનની સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતાં ‘એઝોમિથીન’ બને છે. જે ‘સ્કીફનો બેઇઝ’ અથવા ‘એનીલ’ તરીકે ઓળખાય છે.



● કાર્બાઇલ એમાઇન પ્રક્રિયા (આઇસો સાયનાઇડ પરખ)




ફક્ત પ્રાથમિક એલિફેટિક અથવા એરોમેટિક એમાઇન જ આ કસોટી આપે છે.

પ્રયોગશાળામાં પ્રાથમિક એમાઇનની પરખ માટે કરવામાં આવે છે.

1° એમાઇનને ક્લોરોફોર્મ (CHCl₃) અને આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ-હાઇડ્રોક્સાઇડ (KOH) સાથે ગરમ કરતાં ખરાબ વાસ ધરાવતો ઝેરીઆઇસો સાયનાઇડ બને છે.

દ્વિતીયક કે તૃતીયક એમાઇન આ કસોટી આપતા નથી.


● સામાન્ય પ્રક્રિયા



● નાઇટ્રસ એસિડ (HNO₂) સાથેની પ્રક્રિયા


(A) પ્રાથમિક એલિફેટિક એમાઇનની HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયા :

1^o એલિફેટિક એમાઇનની HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયાની આલ્કાઇલ-ડાયએઝોનિયમ ક્ષાર બનાવે છે. જે અસ્થાયી હોવાથી આ ક્ષાર N₂ વાયુમુક્ત કરી આલ્કોહોલમાં ફેરવાય છે.




(B) પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઇનની HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયા :

નીચા તાપમાને (273 – 278 K) પ્રક્રિયાથી બેન્ઝિનડાયએઝોનિયમ ક્ષાર બનાવે છે.




● કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ CS₂ સાથેની પ્રક્રિયા

(A) 1^o એલિફેટિક એમાઇન સાથેની પ્રક્રિયા (હોફમેન મસ્ટર્ડ ઓઇલ પ્રક્રિયા) :




(B) 1^o એરોમેટિક એમાઇનની પ્રક્રિયા :



● ફોસ્જન (કાર્બોનિક ક્લોરાઇડ) [COCl₂] સાથેની પ્રક્રિયા

(A) એલિફેટિક એમાઇનની પ્રક્રિયા :




(B) એરોમેટિક એમાઇનની પ્રક્રિયા :





● ઓક્સિડેશન

એમાઇનના ઓક્સિડેશનથી મળતી નીપજનો આધાર એમાઇનના પ્રકાર ઓક્સિડેશનકર્તા પર રહેલો છે.

(A) પ્રાથમિક એમાઇન :




(B) દ્વિતીયક એમાઇન :




N-હાઇડ્રોક્સિ ડાયઆલ્કાઇલ એમાઇન

(C) તૃતીયક એમાઇનનું KMnO₄ વડે ઓક્સિડેશન થતું નથી. પરંતુ ઓઝોન, H₂O₂ કે કેરોઝ એસિડ H₂SO₅ વડે કરતાં એમાઇન-N-ઓક્સાઇડ બને છે.



(D) એરોમેટિક એમાઇનનું Oxidation K₂Cr₂O₇ + H₂SO₄ વડે થાય છે.




● હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા


- પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક એમાઇન બેન્ઝિન સલ્ફોનાઇલ ક્લોરાઇડ (હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયક) સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફોનેમાઇડ નીપજ આપે છે. જ્યારે તૃતીયક એમાઇનમાં N સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલ ન હોવાથી આ પ્રક્રિયા થતી નથી.

● ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન-પ્રક્રિયા


(A) બ્રોમિનેશન :



(B) નાઇટ્રોજન :



(C) સલ્ફોનેશન :



71. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયાથી ફિનાઇલ આઇસો સાયનાઇડ બનશે ?


(A) હોફમેન પ્રક્રિયા

(B) કાર્બાઇલ એમાઇન-પ્રક્રિયા

(C) રિમર-ટિમાન-પ્રક્રિયા

(D) વુર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા

72. નીચેની ક્રમશઃ પ્રક્રિયામાં અંતિમ નીપજ Y શું છે ?




- (A) n-બ્યુટાઈલ એમાઈન (B) પ્રોપાઈલ આઈસો સાયનાઈડ
(C) n-બ્યુટાઈલ સાયનાઈડ (D) n-પ્રોપાઈલ એમાઈન

73. નીચે આપેલ પ્રક્રિયામાં ને ઓળખો :



- (A) ClCH_2NO_2 (B) Cl_2CHNO_2 (C) CHCl_3 (D) Cl_3CNO_2

74. p-ટોલ્યુડિન $\xrightarrow{\text{AC}_2\text{O}}$ X $\xrightarrow[\text{CH}_3\text{COOH}]{\text{Br}_2}$ Y $\xrightarrow[\text{H}^+]{\text{H}_2\text{O}}$ Z આપેલ પ્રક્રિયામાં Z નીચે પૈકી શું હશે ?



75. જ્યારે પ્રાથમિક ઓમાઈન ઇથેનોલિક KOH અને ક્લોરોફોર્મ સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે નીપજ તરીકે મળે છે.


- (A) આઈસો સાયનાઈડ (B) આલ્ડિહાઈડ (C) સાયનાઈડ (D) આલ્કોહોલ

76. એક કાર્બનિક સંયોજન X ની રિડક્શન-પ્રક્રિયાથી સંયોજન Y બને છે. જેની આલ્કોહોલિક KOH ની હાજરીમાં CHCl_3 સાથેની પ્રક્રિયાથી Z-સંયોજન બને છે. જેની ઉદ્દીપકીય રિડક્શન પ્રક્રિયાથી N-મિથાઈલ એનિલિન મળે છે, તો સંયોજન X છે.

- (A) મિથાઈલ એમાઈન (B) એનિલિન (C) નાઈટ્રો બેન્ઝિન (D) નાઈટ્રોમિથેન

77. $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+ \text{OH}^-$ ને ગરમ કરવાથી કઈ નીપજ પ્રાપ્ત થશે ?

- (A) CH_3NH_2 (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ (C) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (D) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$

78.  $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{COCl}}$ X $\xrightarrow[\text{[સાંદ્ર H}_2\text{SO}_4\text{]}]{\text{સાંદ્ર HNO}_3}$ Y $\xrightarrow{\text{જળવિભાજન}}$ Z આપેલ પ્રક્રિયામાં એનિલિન Z ને ઓળખો.



- (A) એસિટેનિલાઈડ (B) p-નાઈટ્રો એસિટેનિલાઈડ (C) p-નાઈટ્રો એનિલિન (D) સલ્ફાનિલિક એસિડ

79. નીચેનાં વિધાનોની સત્યાર્થતા જણાવો :

- (i) એનિલિનની સાંદ્ર H_2SO_4 સાથેની સલ્ફોનેશન પ્રક્રિયા 455-475 K તાપમાન કરતાં સલ્ફાનિલિક એસિડ બને છે.
(ii) સલ્ફાનિલિક એસિડ ઝિવટર આયન તરીકે વર્તે છે અને તે ઉભયગુણધર્મી છે.
(iii) સલ્ફાનિલિક એસિડ ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવે છે અને પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે.

- (A) T F T (B) T F F (C) F T F (D) T T T

80. નીચે આપેલ પ્રક્રિયા માટે X અને Y વિશે અનુમાન કરો :



81. ઈથાઈલ એમાઈનની Na-ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા દરમિયાન કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે ?

- (A) N_2 (B) H_2 (C) C_2H_2 (D) CO_2

82. 1° એમાઈનને વધુ પ્રમાણમાં $HgCl_2$ ની હાજરીમાં CS_2 સાથે ગરમ કરતાં તે આઈસો સાયનેટ આપે છે. આ પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

- (A) હોફમેન બ્રોમેમાઈડ પ્રક્રિયા (B) પર્કિન પ્રક્રિયા
(C) હોફમેન મસ્ટાર્ડ ઓઈલ પ્રક્રિયા (D) કાર્બાઈલ એમાઈન પ્રક્રિયા


83. નીચે આપેલ પૈકી કઈ પ્રક્રિયા એમાઈન સંયોજનોની બનાવટ કે એમાઈન સંયોજનોની અલગીકરણમાં ઉપયોગી નથી ?

- (A) હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયા (B) કાર્બાઈલ એમાઈન પ્રક્રિયા
(C) હોફમેન પ્રક્રિયા (D) વુર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા


84. નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

- (A) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન બંને $-NH_2$ સમૂહ ધરાવે છે.
(B) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન બંને HCl માં ઓગળે છે.
(C) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન બંને HNO_2 સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઈડ્રોક્સિ સંયોજનો બનાવે છે.
(D) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન બંને $CHCl_3$ અને KOH સાથેની પ્રક્રિયાથી ખરાબ વાસ ધરાવતું સંયોજન આપે છે.

85. આપેલી પ્રક્રિયામાં Z ને ઓળખો.



86. એનિલિનની $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ અને H_2SO_4 વડે Oxidation કરવાથી કઈ નીપજ મળશે ?
 (A) બેન્ઝોઈક એસિડ (B) m-એમિનો બેન્ઝોઈક એસિડ
 (C) p-બેન્ઝોક્વિનોન (D) સ્કિફનો બેઈઝ
87. નીચેના પરિવર્તન માટે કયા પ્રક્રિયકો ઉપયોગી છે ? બેન્ઝોનેમાઈડ $\rightarrow$ એસિટેનિલાઈડ
 (A) NaOH/Br_2 , LiAlH_4 (B) NaOH/Br_2 , CH_3COCl
 (C) HONO , Cu_2Cl_2 , $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ (D) NaOH/Br_2 , $\text{Ni}[\text{H}_2]$, CH_3COCl
88. નીચે પૈકી કયો એમાઈન એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી ?
 (A) CH_3NH_2 (B) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$
 (C) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
89. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaCN}} \text{X} \xrightarrow{\text{Ni}/\text{H}_2} \text{Y} \xrightarrow{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}} \text{Z}$ ઉપરની પ્રક્રિયા માટે Zને ઓળખો.
 (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONHCH}_3$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONHCOCH}_3$
90. નીચેની પ્રક્રિયા માટે નીપજ જણાવો :




- (A) (B) (C) (D)




91. p-ટોલ્યુડિન $\xrightarrow[\Delta]{\text{CHCl}_3, \text{આલ્કોહોલિક KOH}}$? આપેલ પ્રક્રિયામાં નીપજ જણાવો.

- (A) (B)
 (C) (D)

92. નીચેની પ્રક્રિયા માટે નીપજનું અનુમાન કરો :




- (A) (B) +
 (C) (D)




- (A) કાર્બોનિયમ આયન (B) કાર્બેએનાયન (C) કાર્બિન (D) મુક્ત મુલક

95. નીચેની પ્રક્રિયામાં Z ને ઓળખો :



- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_3$
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

96. નીચે પૈકી કોની હોફમેન પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળતાથી થાય ?



97. નીચે પૈકી કયા પ્રક્રિયકની હાજરીમાં થતી એસાઇલેશન પ્રક્રિયા 'સ્કોટન બાઉમેન' તરીકે ઓળખાય છે ?

- (A) CH_3COCl /પિરિડિન (B) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ /સાંદ્ર H_2SO_4
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ જલીય NaOH (D) CH_3COCl / CH_3COOH

98. 1° એલિફેટિક એમાઇનની આલ્ડિહાઇડ અથવા કિટોનની સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતાં બને છે.

- (A) એઝો મિથેન (B) સ્કિફનો બેઇઝ (C) એનિલિન (D) આપેલ તમામ

99. રબરના વાલ્કેનાઇઝેશન દરમિયાન પ્રક્રિયા ઉત્તેજક તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

- (A) NN-ડાયફિનાઇલ થાયો યૂરિયા (B) N-મિથાઇલ એનિલિન
(C) NN-ડાયમિથાઇલ એનિલિન (D) ટેટ્રો આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજીન

100. એનિલિનની કોની સાથેની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજને ગરમ કરતાં ફિનાઇલ આઇસો સાયનેટ બને છે ?

- (A) ફોસ્ફિન (B) ફોસ્જિન (C) હાઇડ્રોક્સિલ એમાઇન (D) પાટેશિયમ સાયનાઇડ

101. 3° એમાઈનનું ઓક્સિડેશન કોના વડે થઈ શકતું નથી ?

- (A) O_3 (B) H_2O_2 (C) H_2SO_5 (D) $KMnO_4$

102. એનિલિનનું સાંદ્ર HNO_3 / સાંદ્ર H_2SO_4 વડે 288k તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા મળતી નીપજમાં p, m, o સમઘટકનું ટકાવાર પ્રમાણ અનુક્રમે કેટલું છે ?

- (A) 51 %, 47 %, 2 % (B) 47 %, 51 %, 2 % (C) 2 %, 51 %, 47 % (D) 2 %, 47 %, 51 %


103. m-DNBનું કોની સાથે રિડક્શન કરવાથી નીપજ તરીકે m-નાઈટ્રો એનિલિન મળે ?

- (A) $(NH_4)_2S$ (B) Na_2S (C) Ni/H_2 (D) (A) અને (B) બંને

જવાબો : 71. (C), 72. (A), 73. (D), 74. (C), 75. (A), 76. (C), 77. (C), 78. (C), 79. (D), 80. (B), 81. (B), 82. (C), 83. (D), 84. (C), 85. (D), 86. (C), 87. (B), 88. (C), 89. (A), 90. (C), 91. (C), 92. (D), 93. (C), 94. (C), 95. (B), 96. (C), 97. (C), 98. (D), 99. (A), 100. (B), 101. (D), 102. (A), 103. (D),


● ડાયેઝોનિયમ ક્ષાર

સામાન્ય સૂત્ર : $Ar \cdot N_2^+ X^-$ (જ્યાં $X^- = Cl^-, Br^-, HSO_4^-, BF_4^-$)



- બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરો બોરેટ (પાણીમાં અદ્રાવ્ય)
- ઓરડાના તાપમાને સ્થાયી


● બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડ ક્ષારની બનાવટ અને ભૌતિક ગુણધર્મો




● ભૌતિક ગુણધર્મો

- રંગવિહીન, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ
- પાણીમાં દ્રાવ્ય
- નીચા તાપમાને સ્થાયી
- શુષ્ક અવસ્થામાં બહાર કાઢી શકાતો નથી તે વિસ્ફોટક છે.
- તેની પ્રક્રિયાઓ ત્વરિત જ કરવામાં આવે છે.

● બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્ષારની વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ



● બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષારની એઝોસંયુગ્મન પ્રક્રિયા



● એમાઇનની કસોટીઓ

(i) કાર્બાઇલ એમાઇન કસોટી

એલિફેટિક અને એરોમેટિક બંને પ્રકારના પ્રાથમિક એમાઇન આપે.

(ii) એઝોરંગક કસોટી :

પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઇન આપે છે.

(iii) લિબરમેન કસોટી


દ્વિતીયક એમાઇન (એલિફેટિક અને એરોમેટિક બંને આપે છે.)

2° એમાઇન HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી N-નાઇટ્રોસો એમાઇન બનાવે.

(પીળું તૈલી પ્રવાહી) —————





લાલ રંગનું ← મંદ કરતા વાદળી રંગનું ← NaOH લીલા રંગનું ← ફિનોલ + સાંદ્ર H₂SO₄ ગરમ કરતાં
 દ્રાવણ દ્રાવણ ઉમેરતા દ્રાવણ બને.

104. નીચે આપેલી પ્રક્રિયામાં Z ને ઓળખો :







- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$ (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$




105. નીચે પૈકી કયા એરાઈલ એમાઈનની ડાયએઝોટાઈઝેશન પ્રક્રિયા મુશ્કેલ હશે ?






106. બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડની 'ડી-એમિનેશન' પ્રક્રિયા માટે નીચે પૈકી કોણ ઉપયોગી છે ?



107. નીચે પૈકી કયો ડાયેઝોનિયમ ક્ષારને મંદ H_2SO_4 સાથે ગરમ કરતાં અનુવર્તી ફિનોલ મુશ્કેલીથી આપશે ?







108. નીચે આપેલી પ્રક્રિયા માટે જો $\boxed{\text{Z}}$ 1-ફિનાઈલ પ્રોપેન-1-એમાઈન હોય, તો $\boxed{\text{W}}$ અને $\boxed{\text{X}}$ માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે ?



(D) (A) અને (C) બંને

109. એરાઈલ ડાયેઝોનિયમ ક્ષારની નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા સાચી નથી ?



110. એલિફેટિક પ્રાથમિક એમાઈનની નાઈટ્રસ એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી કઈ નીપજ મળે છે ?

(A) 2° એમાઈન

(B) નાઈટ્રો આલ્કેન

(C) આલ્કોહોલ

(D) આલ્કાઈલ નાઈટ્રાઈટ

111. જેમાંથી એરોમેટિક સંયોજનોનું સંશ્લેષણ સરળતાથી થઈ શકે તેવું સંયોજન કયું છે ?


(A) બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડ

(B) નાઈટ્રોબેન્ઝિન

(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$

(D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$

112. આપેલી પ્રક્રિયામાં W, X, Y, Z ને ઓળખો.



(A) W = એનિલિન

(B) w = બેન્ઝિન

X = 2, 4, 6-ટ્રાય બ્રોમો એનિલિન

X = 2, 4, 6-ટ્રાય બ્રોમો બેન્ઝિન

Y = 2, 4, 6-ટ્રાયબ્રોમો બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઇડ

Y = 2, 4, 6-ટ્રાય ક્લોરો બેન્ઝિન

Z = 1, 3, 5-ટ્રાય બ્રોમો બેન્ઝિન

Z = 2, 4, 6-ટ્રાય ક્લોરો ફિનોલ

(C) W = એનિલિન

(D) w = એનિલિન

X = p-બ્રોમો એનિલિન

X = p-બ્રોમો એનિલિન


Y = p-બ્રોમો બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઇડ

Y = p-બ્રોમો બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઇડ

Z = p-બ્રોમો ફિનોલ

Z = બ્રોમો બેન્ઝિન

113. નીચેની પ્રક્રિયામાં [W], [X] અને [Z] ને ઓળખો :



(A) W = CH₃CHO,

X = CH₃Cl,

Z = CH₃CH₂NH₂

(B) W = CH₃CH₂OH,

X = CH₃CH₂Cl,

Z = CH₃CH₂CH₂NH₂

(C) W = CH₃CH₂CH₂OH,

X = CH₃CH₂Cl,

Z = CH₃CH₂CH₂CH₂NH₂

(D) W = CH₃CHO,

X = CH₃CH₂Cl,

Z = CH₃CH₂CH₂NH₂

114. C₅H₁₁N પ્રકાશક્રિયાશીલ સંયોજન છે. તેની HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી C₅H₁₁OH બને છે, તો તે સંયોજન કયું હશે ?

(A) N-મિથાઇલ બ્યુટેનેમાઇન

(B) 1-એમિનો પેન્ટેન

(C) 2-એમિનો પેન્ટેન

(D) N,N-ડાયમિથાઇલ પ્રોપેનમાઇન

115. ક્લોરોઇથેન $\xrightarrow{\text{NaCN}}$ W $\xrightarrow{\text{Ni/H}_2}$ X $\xrightarrow{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}}$ Y આપેલ પ્રક્રિયા માટે Y શું છે ?





(A) CH₃CH₂CH₂NHCOCH₃

(B) CH₃CH₂CH₂NH₂

(C) CH₃CH₂CH₂CONHCH₃

(D) CH₃CH₂CH₂CH₂CONHCOCH₃

116. એનિલિનની નીચા તાપમાને ડાયેઝોટાઇઝેશનની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજની એનિલિન સાથેની પ્રક્રિયાથી રંગીન સંયોજન પ્રાપ્ત થાય તેવું બંધારણ નીચે પૈકી કયું છે ?







117. 3, 4, 5-ટ્રાય બ્રોમોએનિલિન $\xrightarrow[\text{(ii) H}_3\text{PO}_2]{\text{(i) ડાયએઝોટાઈઝેશન}}$? (નીપજ)

- (A) 3, 4, 5-ટ્રાય બ્રોમો બેન્ઝિન (B) 3, 4, 5-ટ્રાય બ્રોમો ફિનોલ
(C) 1, 2, 3-ટ્રાય બ્રોમો બેન્ઝિન (D) 1, 2, 6-ટ્રાય બ્રોમો ફિનોલ

118. એરોમેટિક નાઈટ્રાઈલ (ArCN) નીચેની કઈ પ્રક્રિયાથી બનાવી શકાતો નથી ?

- (A) $\text{ArX} + \text{KCN}$ (B) $\text{ArCONH}_2 + \text{P}_2\text{O}_5$
(C) $\text{Ar N}^+\text{Cl}^- + \text{CuCN}$ (D) $\text{ArCONH}_2 + \text{SOCl}_2$


119. આણ્વિકસૂત્ર $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}$ [X] કે જે પ્રકાશક્રિયાશીલ છે અને તે જલીય HClમાં દ્રાવ્ય થાય છે અને HNO_2 સાથેની પ્રક્રિયાથી N_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. તેનું બંધારણીય સૂત્ર સૂચવો.



120. બેન્ઝિન ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઈડની હાઈપો ફોસ્ફરસ એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી કઈ ઓક્સિડાઈઝ નીપજ મળે ?


- (A) H_3PO_4 (B) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$
(C) H_3PO_3 (D) એક પણ નહિ

121. નીચેની પ્રક્રિયા માટે [U]ને ઓળખો :



- (A) બેન્ઝિન (B) 1, 2-ડાય-બ્રોમો બેન્ઝિન
(C) બ્રોમો બેન્ઝિન (D) 1, 2-ડાય બ્રોમો બેન્ઝોઈક એસિડ

122. આપેલ પ્રક્રિયામાં નીપજ W અને Zના IUPAC નામ અનુક્રમે જણાવો.




(A) બેન્ઝિન, એસિટેનિલાઈડ

(B) ફ્લોરોબેન્ઝિન, એસિટેનિલાઈડ

(C) ટોલ્યુઈન, N-એસિટાઈલ બેન્ઝિનેમાઈડ

(D) ફ્લોરોબેન્ઝિન, N-ફિનાઈલ ઇથેનેમાઈડ

123. નીચે આપેલી પ્રક્રિયામાં કઈ બે નીપજો સમાન થશે ?



(A) P અને V

(B) Q અને W

(C) R અને V

(D) (A) અને (B) બંને.


124. બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડની વિભાગ-I સાથેની પ્રક્રિયાથી રંગીન નીપજ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમનાં નામ વિભાગ-IIમાં આપેલાં છે. તે પરથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :

વિભાગ-I

વિભાગ-II

(P)  OH/NOOH


(T) P-એમિનો એઝો બેન્ઝિન

(Q)  / NaOH

(U) P-N,N-ડાયમિથાઈલ એમિનો એઝો બેન્ઝિન

(R)  NH₂/HCl

(V) P-હાઈડ્રોક્સિ એઝો બેન્ઝિન

(S)  / HCl

(W) β-નેપ્થાઈલ એઝો બેન્ઝિન

(A) (P)-(U), (Q)-(V), (R)-(W), (S)-(T)

(B) (P)-(V), (Q)-(W), (R)-(T), (S)-(U)


(C) (P)-(T), (Q)-(U), (R)-(V), (S)-(W)










(D) (P)-(W), (Q)-(T), (R)-(U), (S)-(V)

125. નીચે પૈકી કયું સંયોજન સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાથી બનતું નથી ?

- (A) ક્લોરો બેન્ઝિન (B) બ્રોમો બેન્ઝિન (C) બેન્ઝિન નાઇટ્રાઇલ (D) આયોડો બેન્ઝિન

126. X, Y, Z નીચેની પ્રક્રિયામાં ઓળખો :



- (A) X =  (B) X =  (C) X =  (D) X = 
- y =  Y =  Y =  Y = 
- Z =  Z =  Z =  Z = 





127. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા ‘બાલ્ઝ સ્કિમાન પ્રક્રિયા’ તરીકે ઓળખાય છે ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{CHCl}_3 + 3 \text{KOH}} \text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}^+ \equiv \text{C}^-$
- (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{Cl}^- \xrightarrow[\text{HX}]{\text{Cu પાઉડર}} \text{C}_6\text{H}_5 - \text{X} + \text{N}_2 + \text{CuCl}$
- (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Br}_2 + 4\text{NaOH}} \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{NaBr} + 2\text{H}_2\text{O}$
- (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{Cl}^- + \text{HBrF}_4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{BF}_4^- \xrightarrow{\Delta} \text{C}_6\text{H}_5\text{F}$

128. નીચે પૈકી કયો ડાયેઝોનિયમ ક્ષાર ઓરડાના તાપમાને સ્થાયી છે ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{Cl}^-$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{HSO}_4^-$ (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{BF}_4^-$ (D) B અને C બંને.

129. બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઇડ (ક્ષાર)ની ગોમ્બર્ગ પ્રક્રિયાથી કઈ નીપજ મળે છે ?

- (A)  (B)  (C)  (D) 

130. નીચે પૈકી કયો એમાઈન લિબરમેન કસોટી આપે છે ?

- (A) 1° એમાઈન (B) 2° એમાઈન (C) 3° એમાઈન (D) આપેલ તમામ

131. 2° એમાઈનની HNO₂ સાથેની પ્રક્રિયાથી રંગનું તૈલીપ્રવાહી બને છે જેને ફિનોલ અને સાંદ્ર H₂SO₄ સાથે ગરમ કરતાં રંગનું દ્રાવણ બને. જેમાં NaOH ઉમેરતાં રંગનું દ્રાવણ થાય. જેને મંદ કરતાં રંગનું દ્રાવણ બને છે.

- (A) પીળું, લીલા, વાદળી, લાલ (B) લીલા, પીળું, વાદળી, લાલ
(C) વાદળી, લાલ, પીળું, લીલા (D) લાલ, પીળું, વાદળી, લીલો

132. બેન્ઝિન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઈડની NaOHની હાજરીમાં બ્રોમોબેન્ઝિન સાથેની પ્રક્રિયાથી કઈ નીપજ મળશે ?

- (A) ડાયફિનાઈલ (B) p-બ્રોમો ડાયફિનાઈલ
(C) P, P'-ડાય બ્રોમો ડાયફિનાઈલ (D) p-બ્રોમો એઝો બેન્ઝિન

જવાબો : 104. (C), 105. (A), 106. (D), 107. (A), 108. (D), 109. (C), 110. (C), 111. (A), 112. (A), 113. (C), 114. (B), 115. (A), 116. (B), 117. (C), 118. (A), 119. (D), 120. (B), 121. (C), 122. (D), 123. (D), 124. (B), 125. (D), 126. (A), 127. (D), 128. (C), 129. (A), 130. (B), 131. (A), 132. (B)

● સાયનાઈડ અથવા નાઈટ્રાઈલ સંયોજનો

● ઇલેક્ટ્રોનિક બંધારણ :

– C ≡ N સમૂહમાં એક σ અને બે π બંધ.

C અને Nનું સંકરણ SP

R – C – N બંધકોણ 180°

● ભૌતિક ગુણધર્મો :

તેના ઉત્કલનબિંદુ અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ કરતાં નીચા હોય છે.

ખૂબ જ સુગંધીદાર સુવાસ ધરાવતા, બિનવિષાલુ

ખૂબ જ નિર્બળ બેઈઝ સંયોજનો

● IUPAC(A),(C), નામકરણ :

નાઈટ્રાઈલ સમૂહના કાર્બન સહિત હાઈડ્રોકાર્બન મૂળની દીર્ઘતમ કાર્બન-શૃંખલા નક્કી કર્યા પછી હાઈડ્રોકાર્બન નામને અંતે ‘નાઈટ્રાઈલ’ શબ્દ જોડવામાં આવે છે.


જો – CN સમૂહ ચક્રીય પ્રણાલી સાથે જોડાયેલ હોય, તો તેને માટે ‘કાર્બો નાઈટ્રાઈલ’ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે.

● સામાન્ય નામકરણ :


હાઈડ્રોકાર્બન સમૂહના નામને અંતે ‘સાઈનાઈડ’ શબ્દ મૂકવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ : (1) CH₃ – C ≡ N

IUPAC • ઇથેન નાઈટ્રાઈલ
સામાન્ય • મિથાઈલ સાયનાઈડ
• એસિટો નાઈટ્રાઈલ


ઉદાહરણ : (2) 

I → બેન્ઝિન કાર્બો નાઈટ્રાઈલ
સામાન્ય → ફિનાઈલ સાયનાઈડ


ક્રમ	બંધારણીય સૂત્ર	સામાન્ય નામ	IUP(A),(C), નામ	ઉત્કલનબિંદુ
1.	$\text{CH}_3 - \text{CN}$	મિથાઈલ સાયનાઈડ	ઈથેનનાઈટ્રાઈલ	355 K
2.	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CN}$	ઈથાઈલ સાયનાઈડ	પ્રોપેનનાઈટ્રાઈલ	370 K
3.	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$	વિનાઈલ સાયનાઈડ (એકિલો નાઈટ્રાઈલ)	પ્રોપ-2-ઈનનાઈટ્રાઈલ	351 K
4.	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CN}$	પ્રોપાઈલ સાયનાઈડ	બ્યુટેનનાઈટ્રાઈલ	391 K
5.	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CN} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	આઈસો પ્રોપાઈલ સાયનાઈડ	2-મિથાઈલ પ્રોપેનાઈલટ્રાઈલ	377 K
6.		ફિનાઈલ સાયનાઈડ (બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ)	બેન્ઝિન કાર્બોનાઈટ્રાઈલ અથવા બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ	464 K

● રાસાયણિક ગુણધર્મો


- (i) સાયનાઈડ સંયોજનોની H_2SO_4 ની હાજરીમાં જળવિભાજનની પ્રક્રિયા કરતાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે છે અને એમોનિયા વાયુ છૂટો પડે છે.



- (ii) ઈથેન નાઈટ્રાઈલ અને ઈથેનોલને સાંદ્ર H_2SO_4 ની હાજરીમાં ગરમ કરતાં ઈથાઈલ ઈથેનોએટ બને છે.



- (iii) સાયનાઈડ સંયોજનનો સાથે ગ્રિન્નાર્ડ પ્રક્રિયકની યોગશીલ પ્રક્રિયાથી મળતા મધ્યસ્થી નીપજનું જલીય એસિડ સાથે જળવિભાજન કરવાથી કિટોન મળે છે.



● આઈસો સાયનાઈડ સંયોજનો

સામાન્ય સૂત્ર : $R - N^+ \equiv C^-$ $R =$ આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ

● ભૌતિક ગુણધર્મો :

ખૂબ જ ખરાબ વાસ ધરાવતાં, ખૂબ જ વિષાણુ, પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય છે. તેમના ઉત્કલનબિંદુ અલ્કાઈલ સાયનાઈડ કરતાં નીચા હોય છે.

● IUP(A),(C), નામકરણ :

સાયનાઈડ સંયોજનોના નામની પહેલાં ‘આઈસો’ પૂર્વગ મૂકવામાં આવે છે.



નામના અંતે ‘કાર્બાઈલ એમાઈન’ શબ્દ મૂકવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ : CH_3NC

મિથાઈલ આઈસો સાયનાઈડ અથવા મિથાઈલ કાર્બાઈલ એમાઈન અથવા ઈથેન આઈસો નાઈટ્રાઈલ.

● આઈસો સાયનાઈડનું રિડકશન

- આઈસો સાયનાઈડ સંયોજનનું $LiAlH_4$ વડે રિડકશન કરતાં દ્વિતીયક એમાઈન નીપજ તરીકે મળે છે.



● નાઈટ્રો સંયોજનો

સામાન્ય સૂત્ર : $R-NO_2$ જ્યાં $R =$ આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ

IUP(A),(C), નામકરણ : આલ્કેન મૂળની દીર્ઘતમ કાર્બન શૃંખલા નક્કી કર્યા પછી આલ્કેન નામની આગળ નાઈટ્રો પૂર્વગ તરીકે જોડવામાં આવે છે.


● ભૌતિક ગુણધર્મો :

રંગવિહીન, તટસ્થ, પાણીમાં અલ્પદ્રાવ્ય.

આલ્કાઈલ નાઈટ્રો સંયોજનોના સંસ્પંદન થવાથી બાકી બધા જ ક્રિયાશીલ સમૂહ કરતાં નાઈટ્રો સમૂહ સૌથી વધુ ધ્રુવીય છે.


● બનાવટ :

આલ્કેન હાઈડ્રોકાર્બનને ફ્ર્યુમિંગ નાઈટ્રિક એસિડ સાથે બાષ્પ સ્થિતિમાં 673 K તાપમાને ગરમ કરતાં આલ્કાઈલ નાઈટ્રો સંયોજનોનું મિશ્રણ મળે છે.



● નાઈટ્રો સંયોજનોનું રિડક્શન

નાઈટ્રો આલ્કેનનું રિડક્શન LiAlH_4 અથવા નિકલ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડાયહાઈડ્રોજન વડે કરતાં પ્રાથમિક આલ્કાઈલ એમાઈન મળે છે.



133. નીચેનામાંથી કયો ઝેરી વાયુ 1984ની ભોપાલ દુર્ઘટના માટે જવાબદાર હતો ?

- (A) $\text{CH}_3 - \text{N} = \text{C} = \text{O}$ (B) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{N} = \text{S}$
(C) $\text{CH}_3 - \text{N} = \text{C} = \text{S}$ (D) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{N} \equiv \text{S}$


134. ભૌતિક ગુણધર્મોને આધારે નીચે આપેલ વિધાન માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :





- (i) આલ્કાઈલ આઈસો સાયનાઈડ ખરાબ વાસ ધરાવે છે, જ્યારે આલ્કાઈલ સાયનાઈડ સુગંધીદાર વાસ ધરાવે છે.
(ii) આલ્કાઈલ સાયનાઈડ ઝેરી સંયોજનો છે.
(iii) આલ્કાઈલ સાયનાઈડનું ઉત્કલનબિંદુ તેના સમઘટકીય આલ્કાઈલ આઈસો સાયનાઈડ કરતાં નીચું છે.
(iv) એસિટો નાઈટ્રાઈલ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. જ્યારે મિથાઈલ કાર્બાઈલ એમાઈન પાણીમાં દ્રાવ્ય નથી.

- (A) T T T F (B) T F T F (C) T F F F (D) T F F T


135. બ્યુટેન નાઈટ્રાઈલની ઇથાઈલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઈડ સાથેની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજનું જળવિભાજન કરવાથી નીચે પૈકી કઈ નીપજ ઉત્પન્ન થશે ?

- (A) ઇથાઈલ-n-પ્રોપાઈલ ઇથર (B) ઇથોક્સિ પ્રોપોન
(C) ઇથાઈલ પ્રોપેનોએટ (D) હેકઝેન-3-ઓન



- (A)  (B)  (C)  (D) 

137. નીચેની પ્રક્રિયામાં Xને ઓળખો :



- (A) ટોલ્યુઈન (B) બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ
(C) બેન્ઝાલ્ડિહાઈડ (D) બેન્ઝિન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઈડ

138. એલાઇલ આઇસો સાયનાઇડમાં σ અને π બંધની સંખ્યા અને છે.

- (A) 9 σ અને 3 π (B) 3 σ અને 4 π (C) 9 σ અને 9 π (D) 5 σ અને 7 π


139. $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{CN}$ માટે નીચે પૈકી કયું નામ સાચું છે ?

- (A) એકીલોનાઇટ્રાઇલ (B) વિનાઇલ સાયનાઇડ
(C) પ્રોપ-2-ઇન-નાઇટ્રાઇલ (D) ઉપર્યુક્ત બધાં જ સાચાં છે.

140. CH_3NC નું સાચું IUPAC નામ કયું છે ?

- (A) મિથાઇલ આઇસો નાઇટ્રાઇલ (B) ઇથેન આઇસો નાઇટ્રાઇલ
(C) મિથાઇલ કાર્બાઇલ એમાઇન (D) B અને C બંને

141. આપેલ પ્રક્રિયા માટે X, Y, Z ને ઓળખો.



- (A) X = ઇથેનોલ, Y = ઇથેનાલ, Z = ઇથેનોઇક એસિડ
(B) X = ઇથાઇલ એમાઇન, Y = ઇથેનોલ, Z = ઇથેનાલ
(C) X = ઇથેનેમાઇડ, Y = ઇથેનોલ, Z = ઇથેનાલ
(D) X = ઇથેનોઇક એસિડ, Y = ઇથેનોલ, Z = ઇથેનાલ

142. $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NO}_2 \xrightarrow[\text{NH}_4\text{Cl}]{\text{Zn પાઉડર}} \text{X} \xrightarrow[\text{સાંદ્ર HCl}]{\text{ઠંડો}} \text{Y}$ આપેલ પ્રક્રિયામાં X અને Y અનુક્રમે અને છે.

- (A) , 
(B) , 
(C) , 
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહિ

● નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં બે વિધાનો આપેલાં છે. તેમાં એક વિધાન (A) અને બીજું કારણ (R) છે. વિધાનનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચે આપેલી સૂચના મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

- (A) વિધાન (A) સાચું છે, કારણ (R) સાચું છે.
કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) વિધાન (A) સાચું છે, કારણ (R) સાચું છે.
કારણ (R) એ વિધાન (A)ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન (A) સાચું છે, કારણ (R) ખોટું છે.
(D) વિધાન (A) ખોટું છે, કારણ (R) સાચું છે.

143. વિધાન (A) : એનિલીન એ p-ટોલ્યુડીન કરતાં ઓછો બેઝિક છે.

કારણ (R) : p-ટોલ્યુડીન એ એનિલીન કરતાં વધુ બેઝિક છે કારણ કે તેમાં $-CH_3$ સમૂહ e^- દાતા સમૂહ આવેલો છે.

144. વિધાન (A) : પ્રાથમિક એલિફેટિક એમાઈન સૌથી સ્થાયી આલ્કાઈલ ડાયેઝોનિયમ ક્ષાર બનાવે છે.

કારણ (R) : બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડ એ સરળતાથી પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે. જ્યારે બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ફ્લોરો બોરેટ એ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે.

145. વિધાન (A) : એનિલિન એ એમોનિયા કરતાં નિર્બળ બેઝિક છે.

કારણ (R) : એનિલિન એ સંસ્પંદનને કારણે વધુ સ્થાયી છે.

146. વિધાન (A) : p-નાઈટ્રોએનિલિન એ p-ટોલ્યુડીન કરતાં નિર્બળ બેઝિક છે.

કારણ (R) : p-નાઈટ્રો એનિલિનમાં $-NO_2$ સમૂહ e^- આકર્ષણ સમૂહ હોવાથી તે p-નાઈટ્રો એનિલિનને વધુ પ્રબળ બેઝિક બનાવે છે.

147. વિધાન (A) : બેન્ઝિનની કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન-પ્રક્રિયા દ્વારા બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ બનાવી શકાતો નથી.

કારણ (R) : ડાયેઝોનિયમ ક્ષારમાંથી બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ સરળતાથી બનાવી શકાય છે.

● એક અથવા એક કરતાં વધારે સાચા જવાબો ધરાવતા પ્રશ્નો :

148. m-ડાયનાઈટ્રોબેન્ઝિનનું m-નાઈટ્રો એનિલિનમાં રૂપાંતર કોના વડે થઈ શકે છે ?

(A) $(NH_4)_2S$ (B) $Zn/NaOH$ (C) $Sn + HCl$ (D) $Zn + NH_4Cl$

149. બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ ત્યારે મળે છે, જ્યારે...

(A) બ્રોમો બેન્ઝિનની આલ્કોહોલીક KCN સાથે ગરમ કરતાં
(B) બેન્ઝિન ડાયેઝોનિયમ ક્લોરાઈડને Cu પાઉડરની હાજરીમાં KCN સાથે ગરમ કરતાં
(C) સોડિયમ બેન્ઝિન સલ્ફોનેટને NaCN સાથે પિગલન કરતાં
(D) બેન્ઝાલ્ડોક્ઝાઈમને એસિટિક એનહાઈડ્રાઈડ સાથે ગરમ કરતાં

150. $C_4H_{11}N$ અણુસૂત્ર ધરાવતા X સંયોજનની HNO_2 સાથેની પ્રક્રિયાથી $C_4H_{10}O$ અણુસૂત્ર ધરાવતો તૃતીયક આલ્કોહોલ બને છે, તો સંયોજન X નીચેની કઈ પ્રક્રિયા આપશે ?

(A) કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી
(B) હોફમેન મસ્ટર્ડ ઓઈલ પ્રક્રિયા
(C) HNO_2 સાથેની પ્રક્રિયાથી ડાયેઝોનિયમ ક્ષાર
(D) $KMnO_4$ વડે ઓક્સિડેશન કરતાં 2-મિથાઈલ-2-નાઈટ્રો પ્રોપેન આપે.

151. p-ક્લોરો એનિલિન અને એનિલીનિયમ હાઈડ્રો ક્લોરાઈડને કઈ પ્રક્રિયાથી અલગ કરી શકાય ?

(A) સેન્ડમેયર (B) $NaHCO_3$
(C) $AgNO_3$ (D) કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી

● મિશ્ર પ્રકારના પ્રશ્નો :





152. X-નામનું સંયોજન કે જેનું અણુસૂત્ર C_2H_3N છે. જેનું રિડક્શન થતા સંયોજન Y મળે છે. જેની HNO_2 સાથેની પ્રક્રિયાથી ઈથેનોલ મળે છે. ક્લોરોફોર્મ અને આલ્કોહોલિક KOH સાથે ગરમ કરતાં વિશિષ્ટ વાસ ધરાવતું સંયોજન [Z] મળે છે, તો સંયોજન Z છે.

(A) $CH_3CH_2NH_2$ (B) $CH_3CH_2N \equiv C$ (C) $CH_3 - C \equiv N$ (D) CH_3CH_2OH





153. સલ્ફાનિલિક એસિડના ડાયેઝોનિયમ ક્ષારની N, N-ડાયમિથાઈલ એનિલિન સાથેની પ્રક્રિયાથી કયો સૂચક બને છે ?

- (A) મિથાઈલ રેડ (B) મિથાઈલ ઓરેન્જ (C) ઇન્ડિગો (D) ફિનોલ્ફથેલિન





154. $\text{F}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 \xrightarrow[\text{DMF}, \Delta]{(\text{CH}_3)_2\text{NH}} \text{X} \xrightarrow{\text{H}_2 / \text{Ni}} \text{Y}$ અહીં Y છે.







155. p-ટોલ્યુડીનની ક્લોરોફોર્મ અને આલ્કોહોલિક KOH સાથેની પ્રક્રિયાથી શું મળે છે ?



156. નીચે પૈકી પ્રબળ બેઈઝ કોણ છે ?



157. નીચે પૈકી પ્રબળ બેઈઝ કોણ છે ?



158. બેન્ઝામાઈડની POCl_3 સાથેની પ્રક્રિયાથી બને છે.

(A) એનિલિન

(B) બેન્ઝોનાઈટ્રાઈલ

(C) ક્લોરોબેન્ઝિન

(D) બેન્ઝાઈલ એમાઈન

159. નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા એમાઈનના સંશ્લેષણ કે અલગીકરણ માટે ઉપયોગી નથી ?






(A) હિન્સબર્ગ પદ્ધતિ

(B) હોફમેન પદ્ધતિ


(C) વુર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા

(D) કટિયસ પ્રક્રિયા





160. નીચેની પ્રક્રિયાથી કઈ નીપજ મળશે ?



161. નીચે પૈકી કયો એમાઈન નાઈટ્રસ એસિડ સાથે ગરમ કરતાં N_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરતો નથી ?
 (A) ટ્રાય મિથાઈલ એમાઈન (B) ઈથાઈલ એમાઈન
 (C) દ્વિતીયક બ્યુટાઈલ એમાઈન (D) આઈસો પ્રોપાઈલ એમાઈન



- (A) Na_2S (B) Sn/HCl (C) $LiAlH_4$ (D) આપેલ તમામ
163. નીચે પૈકી કોણ નાઈટ્રસ એસિડ સાથે પીગું તૈલી પ્રવાહી આપે છે ?
 (A) મિથાઈલ એમાઈન (B) એનિલિન (C) ડાયમિથાઈલ એમાઈન (D) ટ્રાયમિથાઈલ એમાઈન
164. નીચે પૈકી કોણ $NaOH$ માં દ્રાવ્ય થશે ?



165. એસિટાલ્ડોક્ઝાઈમની P_2O_5 સાથેની પ્રક્રિયા કરતાં શું મળે ?
 (A) મિથાઈલ સાયનાઈડ (B) મિથાઈલ સાયનેટ
 (C) ઈથાઈલ સાયનાઈડ (D) એક પણ નહિ

જવાબો : 133. (A), 134. (D), 135. (D), 136. (C), 137. (B), 138. (A), 139. (D), 140. (D), 141. (B),
 142. (A), 143. (A), 144. (D), 145. (B), 146. (C), 147. (B), 148. (A), 149. (B), (C), (D),
 150. (A), (B), (C), (D), 151. (A), (B), (C), 152. (C), 153. (B), 154. (A), 155. (A), 156. (C),
 157. (D), 158. (B), 159. (C), 160. (C), 161. (A), 162. (A), 163. (C), 164. (A), 165. (A),